

【一覧】 海外で注意しなければいけない感染症(平成29年7月)

| 主な感染源 | 注意すべき病気 | 主な発生地域 | 滞在地域 | | | | 予防方法 | | 主な症状 | | | |
|----------|-----------------|--|-------------|---------|------------|---------|---|---------------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | リゾート 観光地 | 都市部 | 地方の 町や村 | 森林・原野 | その他 | 予防接種 | 発熱 | 下痢 | その他 | |
| 食べ物 水 | ★ E型肝炎 | 世界各地 | ● | ● | ● | ● | 十分火の通った食べ物を食べる 生肉は食べない | | ● | | 倦怠感、黄疸（体の皮膚や 白目が黄色になる） | |
| | ★ A型肝炎 | 世界各地（特に、水道設備が 整っていない地域） | ● | ● | ● | | | ● | ● | 倦怠感、黄疸（体の皮膚や 白目が黄色になる） | | |
| | ★ 赤痢 | 世界各地（特に、水道設備が 整っていない地域） | ● | ● | ● | | 十分火の通った食べ物を食べる 生水は飲まないようにする | | ● | ● | 激しい腹痛 ときに血便 | |
| | ★ 腸チフス | 世界各地（特に、水道設備が 整っていない地域） | ● | ● | ● | | | | ● | ● | 倦怠感、比較的徐脈 （高熱なのに比較的脈が遅い） | |
| | ★ コレラ | 世界各地（特に、水道設備が 整っていない地域） | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | 嘔吐 下痢による脱水 |
| | ★ ノロウイルス | 世界各地 | ● | ● | ● | | 十分火の通った食べ物を食べる 二次感染に注意する | | ● | ● | 激しい嘔吐 | |
| | ★ 消化管寄生虫症 | 世界各地 | | ○ | ● | | こまめな手洗い 十分火の通った食べ物を食べる | | ● | ○ | | |
| 事故・ケガ | ★ 破傷風 | 世界各地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 転倒やケガに注意する | ● | | | 飲み込みにくい、しゃべりにくい、 全身けいれん | |
| 蚊 | ★ マラリア | 熱帯・亜熱帯地域（アジア、ア フリカ、中南米） | ○ | ○ | ● 夜間 | ● 夜間 | 夜間外出を控える 蚊帳の使用虫除けローションの使用 長袖・長ズボンの着用 | ● 予防薬（飲み薬） | ● | ○ | 悪寒、冷汗 頭痛、筋肉痛 意識障害 | |
| | ★ デング熱 | 熱帯・亜熱帯地域（アジア、オ セアニア、アフリカ、中南米、 中東） | ● 昼間 | ● 昼間 | ○ 昼間 | | | | ● | ○ | 目の奥の痛み 筋肉・関節痛、発疹 | |
| | ■ チクングニア熱 | 東南アジア、南アジア、アフリ カ、中南米 | ● 昼間 | ● 昼間 | ● 昼間 | ● | | | ● | | 頭痛、筋肉痛、倦怠感、発疹、関節 痛、関節のはれ | |
| | ■ ジカウイルス感染 症 | アフリカ、東南アジア、南アジ ア、カリブ海諸国、アメリカ大 陸、太平洋島諸国 | ● 昼間 | ● 昼間 | ○ 昼間 | | 虫除けローションの使用 長袖・長ズボンの着用 室内での蚊取り線香の使用など | | ● | | 発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦 怠感、頭痛 | |
| | ■ 黄熱 | アフリカ、中南米 | | | ● 昼間 | ● 昼間 | | ● 発生地域では必須 | ● | | 頭痛、筋肉痛 悪寒、嘔吐 | |
| | ■ ウエストナイル熱 | 北アメリカ ヨーロッパ南部 アフリカ、中東、アジア | ● | ● | ● | ● | | | ● | | 頭痛、筋肉痛、倦怠感 | |
| | ■ 日本脳炎 | アジア | | ● | ● | | | ● | ● | | 昏睡（痛みや刺激に反応しない）、 意識障害、頭痛 | |
| 動物 | ■ 狂犬病 | 世界各地 （特にアジア、アフリカ） | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | むやみに動物に触らない 予め狂犬病ワクチン接種を受ける 犬等からの咬傷後、ワクチン等によ る治療 | ● | ● | | 治癒した受傷部の痛み 知覚過敏 恐水・恐風症状 | |
| | ■ 鳥インフルエンザ | アジア、アフリカ | | | ● | | 農家、市場、動物園などの鳥類との 接触を避ける。手洗い、うがい | | ● | ○ | 呼吸器症状 | |
| | ■ MERS | 中東 | ◆ | ○ | ○ | | 動物との接触を避ける | | ● | ○ | 呼吸器症状 | |
| 人 | ★ 麻しん | 世界各地 （特にアジア・アフリカ・欧州） | ● | ● | ● | | | ●（MRワクチン） | ● | ○ 乳幼児では多い | 咳、鼻水、結膜充血、発疹 | |
| | ★ 風しん | 世界各地 （特にアジア・アフリカ） | ● | ● | ● | | | ●（MRワクチン） | ● | | 発疹、リンパ節腫脹 | |
| | ■ ポリオ | 中東・アフリカなど | | ○ | ○ | | 手洗いの実施 | ● | ● | ○ | 麻痺 | |
| 沼や湖河川 | ■ レプトスピラ症 | 世界各地 | | | ● | | | | ● | | 悪寒、頭痛、筋痛 腹痛、結膜充血 | |
| | ■ 住血吸虫症 | アジア、アフリカ、中南米など | | | ○ | ○ | 淡水（川や湖）での水浴びを控える | | ○ | ○ | 下痢（血性）、肝臓、脾臓の腫れ | |

★：最も注意をしなければいけない病気

■：渡航先、活動内容によって注意しなければいけない病気

●：感染する機会が多いので十分に注意

○：感染する機会は少ないが注意が必要

◆：動物と接触する機会の多い場合には十分に注意

●：ワクチンにより予防できる
※予防接種は、渡航期間、地域、
活動内容により、医師と相談の上
考慮する。

●：よくみられる症状

○：ときにみられる症状