

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課
 感染症対策係 長田、金子
 内線 3387・3385
 直通 092-643-3597

保育施設における嘔吐下痢症の集団発生について

令和2年12月11日、粕屋保健福祉事務所管内の保育施設（糟屋郡内：園児144名、職員28名）から、複数の園児及び職員が嘔吐、下痢の症状を呈しているとの報告がありましたのでお知らせします。

1 発生状況

- ① 初発患者の発症日 : 12月7日（1歳、女性）
- ② 12月11日までの発症者数
- | | | |
|---|----|----------------|
| ┌ | 園児 | 18名（内訳は下表のとおり） |
| | 職員 | 3名（20歳代、女性） |

内訳	0歳	1歳	2歳	5歳	計
男性	2	7	0	0	9
女性	3	3	1	2	9

- ③ 主な症状 : 嘔吐、下痢。入院患者はいない。

発症日	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11
新規発症者数	1	0	0	6	14

2 現在の有症状者数（12月11日現在）

20名（園児17名、職員3名）

3 原因

現在調査中

4 行政対応

粕屋保健福祉事務所が当該施設に対して、健康調査及び疫学調査を実施の上、まん延防止の指導を行っている。

お 願 い

※ 報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

◆県民の皆様へ◆

嘔吐下痢症について

- 細菌やウイルスなどの感染による嘔吐、下痢を主症状とする病気です。
- ロタウイルスやノロウイルスなどのウイルスによる感染を原因とするものが多く、毎年秋から冬にかけて流行します。
- 乳幼児に好発し、1歳以下の乳児は症状の進行が早いため、注意が必要です。

《症状》

- 病原体により異なりますが、1～3日程度の症状のない期間の後に症状が出現します。
- 主な症状は嘔吐と下痢です。37～38℃の発熱がみられることもあります。
- 原因となる細菌やウイルスなどにより、発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛など異なる症状が見られ、症状の程度にも個人差が見られます。
- 感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります。

《感染予防のポイント》

- 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。
- 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
- 患者の便や吐物は適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。
- 病原体に汚染されている可能性がある食品は、中心部までしっかり加熱して食べましょう。また、調理器具等は十分に洗浄、消毒しましょう。