

(正)

第23表の3 血清総コレステロール値の分布 - 血清総コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

Table with 18 columns: Age group, Total count, and percentage for each age group (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+). Includes sub-headers for '人数' and '割合'.

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。注2) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第23表の3 血清総コレステロール値の分布 - 血清総コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

Table with 18 columns: Age group, Total count, and percentage for each age group (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+). Includes sub-headers for '人数' and '割合'.

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。注2) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第23表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	198.0	30.2	194	181.6	29.0	395	200.0	29.4	562	206.5	29.7	518	206.3	27.8	1,032	203.0	28.5	1,243	189.7	30.7	2,961	201.5	29.5	1,081	200.4	29.7	786	184.3	29.6
女性	5,422	209.8	31.7	268	184.4	28.5	690	187.3	29.4	920	200.3	28.6	861	223.7	27.9	1,316	223.6	30.4	1,367	212.9	29.0	3,996	216.0	30.3	1,229	220.5	29.5	879	210.5	28.6

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第23表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	198.1	30.2	195	181.6	29.0	395	200.0	29.4	562	206.5	29.7	520	206.6	27.9	1,032	203.0	28.5	1,243	189.7	30.7	2,963	201.5	29.6	1,081	200.4	29.7	786	184.3	29.6
女性	5,432	209.7	31.7	269	184.4	28.4	692	187.3	29.3	922	200.3	28.6	862	223.6	27.9	1,318	223.6	30.4	1,369	212.9	29.0	4,002	215.9	30.3	1,232	220.5	29.5	880	210.4	28.6

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第24表の3 血清HDLコレステロール値の分布 - 血清HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 21 columns: Gender, HDL Cholesterol Level, Age Group, Total Count, and Percentage. Rows include Male and Female, each with a total row and HDL level categories (30mg/dl未満, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, 100mg/dl以上).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第24表の3 血清HDLコレステロール値の分布 - 血清HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 21 columns: Gender, HDL Cholesterol Level, Age Group, Total Count, and Percentage. Rows include Male and Female, each with a total row and HDL level categories (30mg/dl未満, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, 100mg/dl以上).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第24表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	56.9	14.0	194	54.3	11.8	395	55.4	11.6	562	58.5	14.3	518	58.3	14.7	1032	57.7	14.9	1243	56.0	13.8	2,961	57.5	14.6	1081	57.1	14.7	786	55.4	13.6
女性	5,422	68.2	14.4	268	67.6	13.5	690	67.6	12.9	920	70.5	14.0	861	72.6	15.5	1316	67.8	14.5	1367	64.2	14.1	3,996	68.9	14.7	1229	66.5	14.0	879	63.3	14.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第24表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	57.0	14.0	195	54.3	11.8	395	55.4	11.6	562	58.5	14.3	520	58.4	14.8	1032	57.7	14.9	1243	56.0	13.8	2,963	57.5	14.6	1081	57.1	14.7	786	55.4	13.6
女性	5,432	68.2	14.4	269	67.6	13.5	692	67.6	12.9	922	70.5	14.0	862	72.6	15.5	1318	67.8	14.5	1369	64.2	14.1	4,002	68.9	14.7	1232	66.5	14.0	880	63.3	14.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第25の3表 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布 - 血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 19 columns: 総数, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上, (再掲)40-79歳, (再掲)65-74歳, (再掲)75歳以上. Rows include age groups (40mg/dL未満 to 210-219) and cholesterol levels (220mg/dL以上, (再掲)160mg/dL未満, (再掲)160mg/dL以上).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第25の3表 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布 - 血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 19 columns: 総数, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上, (再掲)40-79歳, (再掲)65-74歳, (再掲)75歳以上. Rows include age groups (40mg/dL未満 to 210-219) and cholesterol levels (220mg/dL以上, (再掲)160mg/dL未満, (再掲)160mg/dL以上).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第25表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除ク

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	117.4	26.6	194	110.4	27.9	395	123.0	25.4	562	124.2	26.1	518	122.3	25.2	1,032	119.3	26.1	1,243	110.9	26.5	2,961	119.2	26.4	1,081	118.2	26.9	786	106.8	25.0
女性	5,422	122.7	27.8	268	104.8	24.3	690	107.1	26.6	920	115.7	26.6	861	132.4	25.6	1,316	133.5	27.7	1,367	124.1	25.4	3,996	127.0	27.2	1,229	130.4	27.0	879	123.1	25.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第25表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除ク

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	117.4	26.6	195	110.4	27.8	395	123.0	25.4	562	124.2	26.1	520	122.5	25.3	1032	119.3	26.1	1243	110.9	26.5	2,963	119.2	26.4	1,081	118.2	26.9	786	106.8	25.0
女性	5,432	122.6	27.8	269	104.8	24.2	692	107.0	26.6	922	115.7	26.6	862	132.3	25.6	1318	133.4	27.7	1369	124.1	25.4	4,002	127.0	27.2	1,232	130.4	27.0	880	123.1	25.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)

注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第26表の3 血清non HDLコレステロール値の分布 - 血清non HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 19 columns: Age group, Total count, and percentages for each age group (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+). Rows include gender (Male/Female) and cholesterol levels (70mg/dl to 220mg/dl+).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

non HDL コレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL)

(誤)

第26表の3 血清non HDLコレステロール値の分布 - 血清non HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

Table with 19 columns: Age group, Total count, and percentages for each age group (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+). Rows include gender (Male/Female) and cholesterol levels (70mg/dl to 220mg/dl+).

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

non HDL コレステロール(mg/dL) = 総コレステロール(mg/dL) - HDLコレステロール(mg/dL)

(正)

第26表の4 血清non LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	141.1	30.8	194	127.3	31.9	395	144.6	31.5	562	148.0	32.4	518	148.0	29.4	1032	145.2	29.0	1243	133.7	29.9	2,961	144.0	30.3	1081	143.3	29.5	786	128.9	28.8
女性	5,422	141.6	31.3	268	116.8	26.6	690	119.7	27.9	920	129.8	28.9	861	151.1	27.8	1316	155.8	30.2	1367	148.7	28.5	3,996	147.0	30.3	1229	154.0	29.2	879	147.2	28.2

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第26表の4 血清non LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	141.1	30.8	195	127.3	31.9	395	144.6	31.5	562	148.0	32.4	520	148.2	29.4	1032	145.2	29.0	1243	133.7	29.9	2,963	144.0	30.3	1081	143.3	29.5	786	128.9	28.8
女性	5,432	141.6	31.3	269	116.7	26.5	692	119.6	27.9	922	129.7	28.9	862	151.0	27.8	1318	155.8	30.2	1369	148.6	28.4	4,002	147.0	30.3	1232	154.0	29.2	880	147.2	28.2

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。

注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第47表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

Table with 15 columns: 総数, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include total and gender-specific data for those who drink to increase risk vs. those who do not.

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)生活習慣調査票の間8(飲酒の頻度)、および間8で月に1〜3回以上飲酒すると回答した場合は間8-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性:「毎日×2合以上」+「週5〜6日×2合以上」+「週3〜4日×3合以上」+「週1〜2日×5合以上」+「月1〜3日×5合以上」
②女性:「毎日×1合以上」+「週5〜6日×1合以上」+「週3〜4日×1合以上」+「週1〜2日×3合以上」+「月1〜3日×5合以上」

(参考表) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男性・女性、20歳以上

Table with 17 columns: 22年, 23年, 24年, 26年, 27年, 28年, P値. Rows include total and gender-specific data for each age group.

注)平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(誤)

第47表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

Table with 15 columns: 総数, 20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上. Rows include total and gender-specific data for those who drink to increase risk vs. those who do not.

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)生活習慣調査票の間8(飲酒の頻度)、および間8で月に1〜3回以上飲酒すると回答した場合は間8-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性:「毎日×2合以上」+「週5〜6日×2合以上」+「週3〜4日×3合以上」+「週1〜2日×5合以上」+「月1〜3日×5合以上」
②女性:「毎日×1合以上」+「週5〜6日×1合以上」+「週3〜4日×1合以上」+「週1〜2日×3合以上」+「月1〜3日×5合以上」

(参考表) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男性・女性、20歳以上

Table with 17 columns: 22年, 23年, 24年, 26年, 27年, 28年, P値. Rows include total and gender-specific data for each age group.

注)平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(正)

第48表 歯の本数の分布 - 歯の本数の区分、年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	25,398	100.0	1,846	100.0	3,043	100.0	4,090	100.0	3,793	100.0	5,628	100.0	6,998	100.0
0本	1,591	5.1	1	0.0	3	0.1	12	0.3	40	1.1	233	3.5	1,302	15.5
1-9本	1,913	6.9	0	0.0	6	0.2	22	0.6	96	2.2	474	7.5	1,315	18.2
10-19本	3,277	12.3	6	0.4	37	1.2	130	3.3	373	8.7	1,124	19.3	1,607	23.4
20-27本	9,486	37.8	281	15.0	730	23.3	1,527	36.8	1,978	52.7	2,814	51.1	2,156	32.9
28本以上	9,131	37.9	1,558	84.6	2,267	75.3	2,399	59.0	1,306	35.4	983	18.6	618	10.0
(再掲)20本以上	18,617	75.7	1,839	99.6	2,997	98.6	3,926	95.8	3,284	88.1	3,797	69.8	2,774	42.9
(再掲)24本以上	15,807	64.9	1,824	98.4	2,923	96.4	3,678	89.8	2,760	75.1	2,775	52.0	1,847	29.1
総数	11,690	100.0	880	100.0	1,456	100.0	1,920	100.0	1,758	100.0	2,643	100.0	3,033	100.0
0本	729	5.3	1	0.0	2	0.1	9	0.4	27	1.3	141	4.9	549	15.7
1-9本	902	7.1	0	0.0	6	0.3	14	0.7	59	2.9	250	8.2	573	19.0
10-19本	1,467	11.8	4	0.8	25	1.8	76	3.9	180	9.0	522	19.2	660	20.9
20-27本	4,345	37.8	125	15.3	358	23.1	698	35.7	909	52.7	1,291	50.6	964	33.9
28本以上	4,247	38.0	750	83.9	1,065	74.7	1,123	59.2	583	34.2	439	17.1	287	10.5
(再掲)20本以上	8,592	75.8	875	99.2	1,423	97.8	1,821	94.9	1,492	86.9	1,730	67.7	1,251	44.3
(再掲)24本以上	7,227	64.3	870	98.5	1,382	95.2	1,688	87.9	1,225	72.4	1,244	49.5	818	29.4
総数	13,708	100.0	966	100.0	1,587	100.0	2,170	100.0	2,035	100.0	2,985	100.0	3,965	100.0
0本	862	4.9	0	0.0	1	0.0	3	0.2	13	0.9	92	2.2	753	15.3
1-9本	1,011	6.6	0	0.0	0	0.0	8	0.4	37	1.6	224	6.8	742	17.6
10-19本	1,810	12.8	2	0.1	12	0.7	54	2.7	193	8.4	602	19.4	947	25.2
20-27本	5,141	37.8	156	14.7	372	23.5	829	37.8	1,069	52.7	1,523	51.7	1,192	32.2
28本以上	4,884	37.8	808	85.2	1,202	75.8	1,276	58.8	723	36.4	544	19.9	331	9.6
(再掲)20本以上	10,025	75.6	964	99.9	1,574	99.3	2,105	96.6	1,792	89.1	2,067	71.6	1,523	41.8
(再掲)24本以上	8,580	65.5	954	98.4	1,541	97.4	1,990	91.3	1,535	77.5	1,531	54.2	1,029	28.9

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
 注2) 生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

問4: 自分の歯は何本ありますか。
 ※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まれません。さし歯は含みます。
 親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かたり少なかったりすることもあります。
 0本の場合は0と書いて下さい。

(誤)

第48表 歯の本数の分布 - 歯の本数の区分、年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	25,398	100.0	1,846	100.0	3,043	100.0	4,090	100.0	3,793	100.0	5,628	100.0	6,998	100.0
0本	1,591	5.1	1	0.0	3	0.1	12	0.3	40	1.1	233	3.5	1,302	15.5
1-9本	1,913	6.9	0	0.0	6	0.2	22	0.6	96	2.2	474	7.5	1,315	18.2
10-19本	3,277	12.3	6	0.4	37	1.2	130	3.3	373	8.7	1,124	19.3	1,607	23.4
20-27本	9,486	37.8	281	15.0	730	23.3	1,527	36.8	1,978	52.7	2,814	51.1	2,156	32.9
28本以上	9,131	37.9	1,558	84.6	2,267	75.3	2,399	59.0	1,306	35.4	983	18.6	618	10.0
(再掲)20本以上	18,617	75.7	1,839	99.6	2,997	98.6	3,926	95.8	3,284	88.1	3,797	69.8	2,774	42.9
(再掲)24本以上	9,591	35.1	22	1.6	120	3.6	412	10.2	1,033	24.9	2,853	48.0	5,151	70.9
総数	11,690	100.0	880	100.0	1,456	100.0	1,920	100.0	1,758	100.0	2,643	100.0	3,033	100.0
0本	729	5.3	1	0.0	2	0.1	9	0.4	27	1.3	141	4.9	549	15.7
1-9本	902	7.1	0	0.0	6	0.3	14	0.7	59	2.9	250	8.2	573	19.0
10-19本	1,467	11.8	4	0.8	25	1.8	76	3.9	180	9.0	522	19.2	660	20.9
20-27本	4,345	37.8	125	15.3	358	23.1	698	35.7	909	52.7	1,291	50.6	964	33.9
28本以上	4,247	38.0	750	83.9	1,065	74.7	1,123	59.2	583	34.2	439	17.1	287	10.5
(再掲)20本以上	8,592	75.8	875	99.2	1,423	97.8	1,821	94.9	1,492	86.9	1,730	67.7	1,251	44.3
(再掲)24本以上	4,463	35.7	10	1.5	74	4.8	232	12.1	533	27.6	1,399	50.5	2,215	70.6
総数	13,708	100.0	966	100.0	1,587	100.0	2,170	100.0	2,035	100.0	2,985	100.0	3,965	100.0
0本	862	4.9	0	0.0	1	0.0	3	0.2	13	0.9	92	2.2	753	15.3
1-9本	1,011	6.6	0	0.0	0	0.0	8	0.4	37	1.6	224	6.8	742	17.6
10-19本	1,810	12.8	2	0.1	12	0.7	54	2.7	193	8.4	602	19.4	947	25.2
20-27本	5,141	37.8	156	14.7	372	23.5	829	37.8	1,069	52.7	1,523	51.7	1,192	32.2
28本以上	4,884	37.8	808	85.2	1,202	75.8	1,276	58.8	723	36.4	544	19.9	331	9.6
(再掲)20本以上	10,025	75.6	964	99.9	1,574	99.3	2,105	96.6	1,792	89.1	2,067	71.6	1,523	41.8
(再掲)24本以上	8,580	65.5	954	98.4	1,541	97.4	1,990	91.3	1,535	77.5	1,531	54.2	1,029	28.9

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
 注2) 生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

問4: 自分の歯は何本ありますか。
 ※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まれません。さし歯は含みます。
 親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かたり少なかったりすることもあります。
 0本の場合は0と書いて下さい。

(正)

第50表 睡眠の質の状況 - 睡眠の質の状況、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

Table with 14 columns: Age Group (Total, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), Gender (Total, Male, Female), and Sleep Quality (Total, Sufficient, Not Sufficient, Not at all). Rows show counts and percentages for each category.

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

問5:ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

(参考表) 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男女計、20歳以上

Table comparing the percentage of people who do not get sufficient rest from sleep across years (21, 24, 26, 28) and age groups (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+).

注) 平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(誤)

第50表 睡眠の質の状況 - 睡眠の質の状況、年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

Table with 14 columns: Age Group (Total, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), Gender (Total, Male, Female), and Sleep Quality (Total, Sufficient, Not Sufficient, Not at all). Rows show counts and percentages for each category.

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

問5:ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

(参考表) 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男女計、20歳以上

Table comparing the percentage of people who do not get sufficient rest from sleep across years (21, 24, 26, 28) and age groups (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+).

注) 平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。