

資料 1-1

シペルメトリン（案）

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しを含め、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

1. 概要

(1) 品目名：シペルメトリン[Cypermethrin (ISO)]

(2) 用途：殺虫剤

ピレスロイド系の殺虫剤である。昆虫の神経細胞膜のナトリウムチャネルに作用して持続的に脱分極を生じさせ、神経機能を攪乱することにより殺虫作用を示すと考えられている。

国内では、動物用医薬品として承認されていない。


海外では、シペルメトリン、alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンが、外部寄生虫の駆除を目的とした製剤（耳標剤、噴霧剤、薬浴剤等）として、牛、豚、羊、山羊、鶏、さけ科魚類等に使用されている。

(3) 化学名及びCAS番号

(RS)- α -Cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)

Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (CAS : No. 52315-07-8)

(4) 構造式及び物性



分子式 C₂₂H₁₉Cl₂N₀₃

分子量 416.29

水溶解度 1.24 × 10⁻⁵ g/L (20°C)

分配係数 log₁₀Pow = 6.33 (25°C)

シペルメトリンは3種の不斉炭素を有しており、以下の8種の光学異性体から構成されている。各異性体の組成は、A、C、F及びHが各14%、B、D、E及びGが各11%である。

また、異性体比の異なるalpha-シペルメトリンは、D及びGから構成されており、組成は各50%である。zeta-シペルメトリンは、A、C、E及びGが各3%、B、D、F及びHが各22%である。

<p>【A】 (1<i>R</i>, <i>trans</i>) (α <i>R</i>) (<i>R</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>R</i>)-<i>trans</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>	<p>【B】 (1<i>R</i>, <i>trans</i>) (α <i>S</i>) (<i>S</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>R</i>)-<i>trans</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>
<p>【C】 (1<i>R</i>, <i>cis</i>) (α <i>R</i>) (<i>R</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>R</i>)-<i>cis</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>	<p>【D】 (1<i>R</i>, <i>cis</i>) (α <i>S</i>) (<i>S</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>R</i>)-<i>cis</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>
<p>【E】 (1<i>S</i>, <i>trans</i>) (α <i>R</i>) (<i>R</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>S</i>)-<i>trans</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>	<p>【F】 (1<i>S</i>, <i>trans</i>) (α <i>S</i>) (<i>S</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>S</i>)-<i>trans</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>
<p>【G】 (1<i>S</i>, <i>cis</i>) (α <i>R</i>) (<i>R</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>S</i>)-<i>cis</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>	<p>【H】 (1<i>S</i>, <i>cis</i>) (α <i>S</i>) (<i>S</i>)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1<i>S</i>)-<i>cis</i>-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</p>

2. 適用の範囲及び使用方法

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。

農薬の項目で作物名、使用時期となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。

(1) 農薬としての国内での使用方法

① 9.0%シペルメトリン水和剤

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
てんさい	ヨトウムシ	750倍	25 L/10 a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カメコハムシ テンサイトイビハムシ	2000～3000倍	100～300 L/10 a				
ばれいしょ	アブラムシ類	3000倍	60～150 L/10 a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ナストビハムシ			収穫前日まで			
やまのいも	アブラムシ類	3000倍	60～150 L/10 a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
麦類							
とうもろこし	アブラムシ類 アワヨトウ アワノメイガ カメムシ類	3000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
豆類 (種実、ただし、だいizu、あづきを除く)	アブラムシ類						
だいizu	アブラムシ類 マジンクイガ	3000倍	100～300 L/10 a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
あづき	アブラムシ類 ノメイガ類 マメホリクチゾウムシ						
たまねぎ	アザミウマ類	2000～3000倍	100～300 L/10 a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	アブラムシ類						
かぼちゃ	アブラムシ類 ヨトウムシ	3000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
からしな (種子)	ヨトウムシ						
えだまめ	アブラムシ類 マジンクイガ	3000倍	100～300 L/10 a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
にんじん	アブラムシ類 ヨトウムシ						
ごぼう	アブラムシ類	3000倍	100～300 L/10 a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内
キャベツ	アオムシ						
アスパラガス	ヨトウムシ	100～500 L/10 a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内

① 9.0%シペルメトリン水和剤（つづき）

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
りんご	カメリ類 シクイムシ類 ハマキムシ類 キモモンホリガ アブラムシ類 キンモンハモグリガ ヨモギエダシャク キリガ類 モモチョッキリゾウムシ	1500倍	200～700 L/10 a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
なし	カメリ類 シクイムシ類				3回以内		5回以内
もも	カメリ類 シクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ アザミウマ類				2回以内		2回以内
ネクタリン	シクイムシ類				5回以内		
すもも	アザミウマ類						
あんず	アメリカシロヒトリ						
ぶどう	アザミウマ類 コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ クビアカスカシバ		収穫21日前 まで	5回以内	5回以内		

② 6.0%シペルメトリン乳剤

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数			
かんきつ	チャノキロアザミウマ ミカンハモグリガ アブラムシ類	1000～ 2000倍	200～700 L/10 a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
	コアオハナムグリ ケシキスイ類 カメリ類	2000倍								
キウイフルーツ	キイロマイガ	1000～ 2000倍	60～150 L/10 a	収穫21日前 まで						
	キウ化メヨコバイ カメリ類	2000倍								
麦類	アブラムシ類	2000倍								
とうもろこし	アワノメイガ	1000～ 2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内			
	アワヨトウ	1000倍								
	アブラムシ類	2000倍								

② 6.0%シペルメトリン乳剤 (つづき)

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいす	マメシングイカ カメムシ類 フタスジヒメハムン シヤガイモヒゲナガ アブラムシ			収穫7日前 まで	3回以内		
えだまめ	マメシングイカ カメムシ類 フタスジヒメハムン	2000倍					3回以内
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類						
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ						
未成熟ささげ	アブラムシ類						
きゅうり	アブラムシ類 オシンヅコナジラミ	1000倍					
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ						
すいか	アブラムシ類	2000倍					
	ミナミキイロアザミウマ	1000～ 2000倍					
メロン	アブラムシ類	2000倍					
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000倍					
かぼちゃ	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000倍					
トマト	アブラムシ類 オシンヅコナジラミ						
なす	ミナミキイロアザミウマ	1000倍					
ピーマン いちご	ア布拉ムシ類	2000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍					
	アブラムシ類 ネギコガ ネギハモグリバエ	2000倍					
わけぎ	アザミウマ類	1000倍					
	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ						
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	2000倍					
	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	48倍	2.4 L/10 a	収穫7日前 まで	5回以内	無人ヘリ コプターによる 散布	5回以内

② 6.0%シペルメトリン乳剤 (つづき)

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
にんじん	ヨトウムシ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
にら	ズキアザミウマ ヨトウムシ類 ズキコガ ハモグリバエ類		100～300 L/10 a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
にら（花茎）		2000倍	100～500 L/10 a	収穫14日前まで			
アスパラガス	ヨトウムシ			収穫7日前まで	5回以内		5回以内
ごぼう	アブラムシ類						
ほうれんそう	ヨトウムシ アブラムシ類 ナミキイロアザミウマ	1000倍					
チンゲンサイ	アオムシ アブラムシ類			収穫前日まで	2回以内		2回以内
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類					散布	
レタス				収穫7日前まで	5回以内		5回以内
非結球レタス					2回以内		2回以内
葉にんにく	ズキアザミウマ	2000倍	100～300 L/10 a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
らっきょう				収穫3日前まで	5回以内		5回以内
エンサイ	ハスモンヨトウ				2回以内		2回以内
べぽかぼちや (種子)	ヨトウムシ						
しそ科葉菜類 (しそ、バジルを除く)	アブラムシ類			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
しそ	ヒシモンヨコハイ アブラムシ類				1回		1回
しそ（花穂） バジル	ア布拉ムシ類				2回以内		2回以内
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1500倍		収穫3日前まで	1回		1回

② 6.0%シペルメトリン乳剤（つづき）

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
食用ブリムラ、食用金魚草 食用エザカム、食用カーネーション 食用せんにちこう、食用トレニア 食用なでしこ、食用パンジー	アブラムシ類	1500倍	100～300 L/10 a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内

③ 6.0%シペルメトリン水和剤

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000倍		収穫7日前 まで	3回以内		3回以内
りんご	アブラムシ類 キンモンハモグリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10 a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	キンモンホリガ シンクイムシ類						
なし	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ モモチョッキリゾウムシ	1000倍	200～700 L/10 a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	ナシビニガ アブラゼミ						
もも	シンクイムシ類 カメムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類	1000～ 2000倍	200～700 L/10 a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
	モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類						
かき	アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ カメムシ類	2000倍	200～700 L/10 a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	カキノヘタムシガ アザミウマ類						
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ	1000～ 3000倍	200～700 L/10 a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
	チャノキイロアザミウマ						
くり	コガネムシ類	2000倍	200～700 L/10 a	収穫21日前 まで	5回以内	散布	5回以内
	クリタマバチ						
くり	クリシギゾウムシ	1500～ 3000倍	200～700 L/10 a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内

③ 6.0%シペルメトリン水和剤（つづき）

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
とうとう	ショウジョウバエ類 オホトウハマダラミバエ	1000倍	200～700 L/10 a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
うめ	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
くるみ	アメリカシロヒトリ			収穫前日まで				
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
	アザミウマ類	1000倍		収穫前日まで				
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
	アザミウマ類	1000倍		収穫3日前まで				
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000～2000倍	200～700 L/10 a	収穫7日前まで	1回	散布	1回	
はつかだいこん				収穫3日前まで				
なばな	アブラムシ類	1000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	
レタス		2000倍		収穫3日前まで	5回以内			
非結球レタス			200～700 L/10 a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	
ピーマン	アブラムシ類 タバコガ			収穫3日前まで	5回以内			
すもも	シシクイムシ類 カメムシ類	1000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ネクタリン	シシクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ	1000～2000倍		収穫3日前まで	5回以内			
	カメムシ類	2000倍		収穫7日前まで	5回以内			
きゅうり なす	オシシコナジラミ アブラムシ類 ナキイロアザミウマ	1000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
トマト	オシシコナジラミ ア布拉ムシ類	1000～2000倍		収穫7日前まで	5回以内			
ミニトマト		2000倍		収穫3日前まで	5回以内			
すいか メロン	ア布拉ムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	
たまねぎ	アザミウマ類			収穫7日前まで	5回以内			

③ 6.0%シペルメトリン水和剤(つづき)

作物名	適用	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
みょうが (花穂)	アサミウマ類 ハスモンヨトウ	1000倍	1000~300 L/10 a	収穫前日まで	5回以内	散布 ただし、花穂の発生期にはマチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	5回以内
みょうが (茎葉)				みょうが (花穂)の収穫前日まで ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで			
ばれいしょ	アブラムシ類	1000~ 2000倍	1000~300 L/10 a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
てんさい	ヨトウムシ			収穫14日前まで			
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ	1000倍	1000~300 L/10 a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	イモガ エビガラスズメ コナジラミ類 ネギアサミウマ ヨトウムシ						
	アブラムシ類						
かんしょ (茎葉)	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ	1000~ 2000倍	200~400 L/10 a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	イモガ エビガラスズメ コナジラミ類 ネギアサミウマ ヨトウムシ ハムシ類	1000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホリガ チャハマキ	1000倍	200~400 L/10 a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	ヨモギエダシャク チャバドリヒメヨコバディ チャノキロアサミウマ	1000~ 2000倍					

(2) 農薬としての海外での使用方法

① 17.1%zeta-シペルメトリン乳剤 (米国)

作物名	適用	1回当たり 使用量	使用方法	使用 時期	作期当たり 総使用量
米	ツマジロクサヨウ、ヨトウムシ Armyworm、Yellow Striped バッタ類、ベニミドリアブラン ヨコバイ類、Mexican Rice Borer ニカメイガ、イネミズゾウムシ (成虫) サトウキビボーラー、チェリーオータムアブラムシ ヒメコガネカゲカムシ、イヌイムシ	3.4~4.3 fl oz/acre (0.04~0.05 1b ai/acre)	散布 濃厚少量 噴霧には 使用しない	収穫 14日前 まで	17.2 fl oz/acre (0.2 1b ai/acre)
だいこん にんじん	ヨトウムシ	1.4~4.3 fl oz/acre (0.016~0.05 1b ai/acre)	散布	収穫 1日前 まで	25.8 fl oz/acre (0.3 1b ai/acre)
	オウレットガ、キョウリカブトムシ ヨーロッパアワノメイガ、ハミビヨロイム類 ヨコバイ類、ヤサイゾウムシ Southern Corn Rootworm (成虫) シロヘリケチブゾウムシ (成虫)	1.9~4.3 fl oz/acre (0.022~0.05 1b ai/acre)			
	アブラムシ類、ビートアワヨトウ、ヨトウムシ コロナトハムシ、バッタ類、モンシロチョウ ジヤガイモヨコバイ、サビイロメクラガメ	3.4~4.3 fl oz/acre (0.04~0.05 1b ai/acre)			
たまねぎ	ツマジロクサヨウ、ヨトウムシ 潜葉性昆虫 (成虫) タマズバエ、カムシ類、アブラムシ類	2.4~4.3 fl oz/acre (0.028~0.05 1b ai/acre)	散布	収穫 7日前 まで	21.5 fl oz/acre (0.25 1b ai/acre)
	アザミウマ類	3.2~4.3 fl oz/acre (0.0375~0.05 1b ai/acre)			
りんご なし びわ マルメロ	リンゴミバエ、コドリンガ、マメコガネ シマカラスヨトウ、マメコガネ、コカイカラムシ ハマキガ、ナシメンシンクイ、スジトビハマキ フタホシナシキジラ、ミヅウムシ、ジヤガイモヨコバイ Redbanded Leafroller バライロリンゴアブラムシ、ワタアブラムシ キンモンホソガ、カムシ類、サビイロメクラガメ Tufted Apple Bud Moth バリアゲイテドリーフローラー White Apple Leafhopper	1.4~4.3 fl oz/acre (0.016~0.05 1b ai/acre)	散布 濃厚少量 噴霧には 使用しない 家畜 放牧地で 使用しない	収穫 14日前 まで	25.8 fl oz/acre (0.3 1b ai/acre)
ベリー類 ブルーベリー クランベリー	ハマキガ類 Orange Tortrix Root Wheevils	4.3 fl oz/acre (0.05 1b ai/acre)	散布	収穫 1日前 まで	

ai : active ingredient (有効成分)

1b : ポンド (1 lb = 0.45359237 kg)

f1 oz : 液量オンス (米液量オンス 1 f1 oz = 0.0000295735 m³)

acre : エーカー (1 acre = 約 4,047 m²)

② 100 g ai/L alpha-シペルメトリン乳剤（豪州）

作物名	適用	1回当たり 使用量	使用方法	使用時期	使用 回数
パセリ	Vegitable weevil Redless earth mite Heliothis、Looper、Thrips	10~40 g ai/ha	散布	収穫5日前 まで	2回

(3) 動物用医薬品としての海外での使用方法

医薬品	対象動物及び使用方法		使用国	休薬期間
シペルメトリンを有効成分とする耳標剤	牛	1頭当たり935 mg/tagの耳標を付ける。	EU	0日 (乳：0日)
シペルメトリンを有効成分とする噴霧剤及び薬浴剤	牛	150 mg/水1L (ダニ、シラミ) 又は500 mg/水1L (ハエ) に希釈し、体全体に噴霧する。ただし、乳用には使用しない。	スペイン	11日
	羊	25 g/Lの製剤を250倍希釈して、噴霧又は薬浴する。ただし、乳牛及び生後42日以内の子牛には使用しない。	豪州	8日
シペルメトリンを有効成分とするポアオン剤	羊	50 mg/水1 L (シラミ) に希釈し、1頭あたり10 mLの量を体全体に噴霧する。ただし、乳用には使用しない。	スペイン	11日
シペルメトリンを有効成分とする噴霧剤	鶏	25 g/Lの製剤を体重10 kgあたり2 mLの用量で、頭部から尾部まで背に沿ってポアオン投与する。ただし、乳用には使用しない。	豪州	0日
シペルメトリンを有効成分とする薬浴剤	大西洋 サケ	50 mg/L (ダニ) の製剤を体全体に噴霧する。	EU	8日
		10 mg/mLの製剤0.5 mLを海水1Lで希釈 (0.005 mg/L) し、最大1時間薬浴する。	EU	10日

3. 代謝試験

(1) 植物代謝試験

植物代謝試験が、キャベツ、りんご、きゅうり、とうもろこし、わた、レタス、てんさい及び小麦で実施されており、主な残留物はシペルメトリン、alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンであり、可食部で10%TRR^{注)}以上認められた代謝物は、M15抱合体、M22、M23、M24抱合体及びM28（抱合体を含む）であった。M23はわた種子でのみ認められた。

注) %TRR : 総放射性残留物 (TRR : Total Radioactive Residues) 濃度に対する比率(%)

(2) 家畜代謝試験

家畜代謝試験が牛、羊及び産卵鶏で実施されており、可食部で10%TRR以上認められた代謝物は、M03、M22（抱合体を含む）、M24及びM28であった。

【代謝物略称一覧】

略称	化学名
M03	(RS)- α -シアノ-3-(4-ヒドロキシフェノキシ)ベンジル(1S,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボン酸塩
M15	3-フェノキシベンジルアルコール
M22	3-フェノキシ安息香酸
M23	3-(2-ヒドロキシフェノキシ)安息香酸
M24	3-(4-ヒドロキシフェノキシ)安息香酸
M28	(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボン酸

4. 作物残留試験

(1) 分析の概要

① 分析対象物質

- ・シペルメトリン

② 分析法の概要

i) シペルメトリン

試料からアセトン、n-ヘキサン・アセトン混液又はアセトン・水混液で抽出し、n-ヘキサン又はジクロロメタンに転溶する。シリカゲルカラム、C₁₈カラム、多孔性ケイソウ土カラム、グラファイトカーボンカラム及びフロリジルカラム等を用いて精製した後、電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ(GC-ECD)又はガスクロマトグラフ・タンデム型質量分析計(GC-MS/MS)で定量する。

または、試料からアセトニトリルで抽出する。塩析した後、グラファイトカーボン/PSA積層カラムを用いて精製し、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC-MS/MS)で定量する。

または、試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶後、アセトニトリル/ヘキサン分配を行う。フロリジルカラムを用いて精製しGC-ECDで定量する。

または、試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶後、凝固処理を行う。再度ヘキサン転溶し、フロリジルカラムを用いて精製しGC-ECDで定量する。

定量限界：0.004～0.5 mg/kg

(2) 作物残留試験結果

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-1、海外で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-2及び1-3を参照。

5. 畜産物における推定残留濃度

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定されることから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。

(1) 分析の概要

① 分析対象物質

- ・シペルメトリン

② 分析法の概要

試料からアセトニトリルで抽出し、*n*-ヘキサンに転溶する。シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-ECD又はガスクロマトグラフ・質量分析計(GC-MS)で定量する。

定量限界：0.01～0.05 mg/kg

(2) 家畜残留試験(動物飼養試験)

① 乳牛(ホルスタイン種、3頭/群)に対して、飼料中濃度として4、12及び40 ppmに相当する量のalpha-シペルメトリンを含むカプセルを28日間にわたり強制経口投与し、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した(分析法の詳細不明)。乳については、投与開始1、2、3、6、8、10、13、15、17、20、22、24及び27日後に採取した乳に含まれるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した(分析法の詳細不明)。結果は表1を参照。

表1. 乳牛の試料中の残留濃度 (mg/kg)

	4 ppm投与群	12 ppm投与群	40 ppm投与群
筋肉	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	0.064 (最大) 0.057 (平均)	0.18 (最大) 0.16 (平均)	1.01 (最大) 0.77 (平均)
脂肪	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	0.064 (最大) 0.057 (平均)	0.18 (最大) 0.16 (平均)	1.01 (最大) 0.77 (平均)
肝臓	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
	0.064 (最大) 0.057 (平均)	0.18 (最大) 0.16 (平均)	1.01 (最大) 0.77 (平均)
腎臓	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
乳 ^{注)}	<0.01 (平均)	0.016 (平均)	0.063 (平均)

定量限界：筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓 0.05 mg/kg、乳 0.01 mg/kg

注) 投与期間中に採取した乳中の濃度を1頭ずつ別々に算出し、その平均値を求めた。

上記の結果に関連して、JMPRは、乳牛及び肉牛のMDB^{注1)}をそれぞれ21.6及び31.4 ppm、STMR dietary burden^{注2)}をそれぞれ8.47及び11.3 ppmと評価している。

注1) 最大飼料由来負荷 (Maximum Dietary Burden : MDB) : 飼料として用いられる全ての飼料品目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露される最大濃度。飼料中濃度として表示される。

注2) 平均的飼料由来負荷 (STMR dietary burden又はmean dietary burden) : 飼料として用いられる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得られた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露される最大濃度。飼料中濃度として表示される。

② 産卵鶏（品種不明、雌12～20羽/群）に対して、飼料中濃度として1.6、7.2及び15 ppmに相当するalpha-シベルメトリンを含むカプセルを28日間にわたり強制経口投与し、筋肉、脂肪及び肝臓に含まれるシベルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。卵については、投与開始1、3、6、9、12、15、18、21、24及び28日後に採取した卵に含まれるシベルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。結果は表2を参照。

表2. 産卵鶏の試料中の残留濃度 (mg/kg)

	1.6 ppm投与群	7.2 ppm投与群	15 ppm投与群
筋肉	-	-	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
脂肪	<0.05 (最大) <0.05 (平均)	0.088 (最大) 0.085 (平均)	0.26 (最大) 0.24 (平均)
肝臓	-	-	<0.05 (最大) <0.05 (平均)
卵	<0.01 (最大) <0.01 (平均)	0.013 (最大) 0.012 (平均)	0.035 (最大) 0.025 (平均)

定量限界：筋肉、脂肪及び肝臓 0.05 mg/kg、卵 0.01 mg/kg - : 分析せず

上記の結果に関連して、JMPRは、鶏のMDBを3.10 ppm、STMR dietary burdenを2.74 ppmと評価している。

(3) 推定残留濃度

牛及び鶏について、MDB又はSTMR dietary burdenと家畜残留試験結果から、畜産物中の推定残留濃度を算出した。結果は表3-1及び3-2を参照。

表3-1. 畜産物中の推定残留濃度：牛 (mg/kg)

	筋肉	脂肪	肝臓	腎臓	乳
乳牛	0.027 (0.011)	0.465 (0.115)	0.027 (0.011)	0.027 (0.011)	0.032 (0.011)
肉牛	0.039 (0.014)	0.755 (0.151)	0.039 (0.014)	0.039 (0.014)	

上段：最大残留濃度

下段括弧内：平均的な残留濃度

表3-2. 畜産物中の推定残留濃度：鶏 (mg/kg)

	筋肉	脂肪	肝臓	卵
産卵鶏	0.022 (0.019)	0.038 (0.032)	0.022 (0.019)	0.006 (0.0038)

上段：最大残留濃度

下段括弧内：平均的な残留濃度

6. 動物用医薬品の対象動物における残留試験

(1) 分析の概要

① 分析対象物質

- ・シペルメトリン

② 分析法の概要

試料からアセトニトリル又はクロロホルムで抽出し、*n*-ヘキサンで洗浄する。フロリジルカラムを用いて精製した後、GC-ECDで定量する。

定量限界：0.002～0.05 mg/kg

(2) 家畜残留試験

① 子牛（体重125 kg、5頭/時点）にシペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（0.5 g/頭（約41 mg/kg 体重））し、投与3、7及び14日後に採取した筋肉、皮下脂肪、腹膜脂肪、肝臓及び腎臓におけるシペルメトリン濃度を測定した（分析法の詳細不明）。結果は表4を参照。（JECFA, 1997）

表4. 子牛にシペルメトリンを単回ポアオン投与後の試料中のシペルメトリン濃度 (mg/kg)

試料	投与後日数		
	3	7	14
筋肉	0.02(5)	<0.01(5)	<0.01(5)
皮下脂肪	0.47(5)	0.26(5)	0.14(5)
腹膜脂肪	0.84(5)	0.67(5)	0.33(5)
肝臓	<0.01(5)	<0.01(5)	<0.01(5)
腎臓	0.05(5)	0.07(5)	0.04(5)

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.01 mg/kg

② 牛（5頭/時点）にシペルメトリンを有効成分とする薬浴剤を単回又は2回浸漬投与（7日間隔、0.075 g/L）し、1回目投与1、3、4及び7日後並びに2回目投与7日後に採取した筋肉、大網脂肪、腎周囲脂肪、肝臓及び腎臓におけるシペルメトリン濃度を測定した（分析法の詳細不明）。筋肉、肝臓及び腎臓中の濃度は、全て定量限界未満（定量限界：0.01 mg/kg）であり、大網脂肪及び腎周囲脂肪では、それぞれ<0.01～

0.02 mg/kg及び0.01~0.05 mg/kgであった。(JECFA, 2000)

- ③ 牛(3頭/時点)にシペルメトリンを有効成分とする噴霧剤を背側正中線に沿って単回又は2回噴霧投与(0.1又は0.2%液、200 mL/頭)し、投与1、3、8及び15日後に採取した筋肉、肝臓及び腎臓におけるシペルメトリン濃度をGCで測定した(分析法の詳細不明)。筋肉、肝臓及び腎臓中の濃度は、単回投与では全て定量限界未満(定量限界:0.01 mg/kg)であり、2回投与では0.01~0.05 mg/kgであった。(JECFA, 2000)
- ④ 泌乳牛(5頭/群)にシペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与(0.5又は1.0 g/頭(1.25又は2.5 mg/kg 体重))し、投与1、2及び7日後に採取した乳におけるシペルメトリン濃度をGCで測定した(分析法の詳細不明)。結果は表5を参照。(JECFA, 1997)

表5. 泌乳牛にシペルメトリンを単回ポアオン投与後の試料中のシペルメトリン濃度 (mg/kg)

投与量 (mg/kg 体重)	投与後日数		
	1	2	7
1.25	0.025(5)	0.048(5)	0.007(5)
2.5	0.063(5)	0.099(5)	0.013(5)

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界: 0.002 mg/kg

- ⑤ 子牛(4~5か月齢、5頭/時点)にalpha-シペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与(0.15 g/頭)し、投与3、7及び14日後に採取した筋肉、皮下脂肪、腎周囲脂肪、肝臓及び腎臓におけるalpha-シペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した。結果は表6を参照。(JECFA, 1997)

表6. 子牛にalpha-シペルメトリンを単回ポアオン投与後の試料中のalpha-シペルメトリン濃度 (mg/kg)

試料	投与後日数		
	3	7	14
筋肉	<0.01(5)	<0.01(5)	<0.01(5)
皮下脂肪	0.07(5)	0.08(5)	0.01(5)
腎周囲脂肪	0.25(5)	0.27(5)	0.09(5)
肝臓	<0.01(5)	<0.01(5)	<0.01(5)
腎臓	0.01(5)	0.02(5)	0.01(5)

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界: 0.01 mg/kg

- ⑥ 泌乳牛(5頭/群)にalpha-シペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与(0.1、0.15及び0.2 g/頭)し、投与1、2、3、4、7、14及び21日後に採取し

た乳におけるalpha-シペルメトリン濃度を測定した（分析法の詳細不明）。最大残留濃度（0.005 mg/kg）は、投与2～5日後の間にみられ、全ての試料において投与21日後までに定量限界未満（定量限界：0.002 mg/kg）となった。（JECFA, 1997）

- ⑦ 牛（ヘレフォード種及びヘレフォード/アンガス交雑種、1歳齢、体重252～334 kg、去勢雄及び雌、3又は5頭/時点）にzeta-シペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を3回ポアオン投与（3週間間隔、2.5又は5 mg/kg 体重）し、最終投与5、10、21、28及び34日後（2.5 mg/kg 体重投与群）又は最終投与10、21及び42日後（5 mg/kg 体重投与群）に採取した筋肉、背脂肪、腎周囲脂肪、肝臓及び腎臓におけるzeta-シペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。結果は表7及び8を参照。
- （APVMA, 2009）

表7. 牛にzeta-シペルメトリンを3回ポアオン投与（2.5 mg/kg 体重）後の試料中のzeta-シペルメトリン濃度（mg/kg）

試料	最終投与後日数				
	5	10	21	28	34
筋肉	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)
背脂肪	0.061±0.015(5)	0.090±0.031(5)	0.052±0.002(5)	<0.05(5)	<0.05(5)
腎周囲脂肪	0.113±0.021(5)	0.152±0.031(5)	0.058±0.011(5)	0.055±0.010(5)	0.054±0.007(5)
肝臓	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)
腎臓	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)	<0.05(5)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.05 mg/kg

表8. 牛にzeta-シペルメトリンを3回ポアオン投与（5 mg/kg 体重）後の試料中のzeta-シペルメトリン濃度（mg/kg）

試料	最終投与後日数		
	5	10	21
筋肉	<0.05(3)	<0.05(3)	<0.05(3)
背脂肪	0.092±0.072(3)	0.052±0.003(3)	0.052±0.004(3)
腎周囲脂肪	0.219±0.209(3)	0.110±0.021(3)	0.074±0.029(3)
肝臓	<0.05(3)	<0.05(3)	<0.05(3)
腎臓	<0.05(3)	<0.05(3)	<0.05(3)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.05 mg/kg

- ⑧ 豚（2頭/時点）にシペルメトリンを有効成分とする塗布剤を3回経皮投与（72時間間隔、100 mg/kg 体重）し、最終投与1、3、7及び14日後に採取した脂肪等におけるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。脂肪中の濃度は、最

終投与3及び7日後にそれぞれ0.016及び0.033 mg/kgであった。他の組織中の濃度はほとんど定量限界未満（定量限界：0.01 mg/kg）であった。（EMEA, 2003）

- ⑨ 羊（メリノ種、雌）にシペルメトリンを有効成分とするポアオン剤を肩から骨盤前部までの背側正中線に沿ってポアオン投与（15～25 cm幅、2.5%液、15又は30 mL/頭）し、投与1、3、7、14及び28日後に採取した筋肉、大網脂肪、腎周囲脂肪、肝臓及び腎臓におけるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。筋肉、肝臓及び腎臓中の濃度は、全ての試料で0.02 mg/kg未満であった。脂肪中の濃度は、投与7日後に最大値を示し、15 mL投与群で0.04 mg/kg、30 mL投与群で0.07 mg/kg（大網脂肪）及び0.08 mg/kg（腎周囲脂肪）であった。（JECFA, 2002）
- ⑩ 羊（去勢雄、24頭）にシペルメトリンを有効成分とする薬浴剤を単回浸漬投与（0.01%液）し、投与直後から投与14日後に採取した筋肉、大網脂肪、腎周囲脂肪、肝臓及び腎臓におけるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。濃度の範囲は、投与直後の0.01 mg/kg未満（筋肉、大網脂肪及び腎周囲脂肪）から投与14日後の0.17 mg/kg（腎周囲脂肪）であった。肝臓及び腎臓からは検出されなかった。（JECFA, 2002）
- ⑪ 産卵鶏（雌3羽/時点）にシペルメトリンを有効成分とする噴霧剤を単回噴霧投与（0.05又は0.1%液、10又は20 mg/羽）し、投与1から14日の間に採取した筋肉、脂肪、皮膚、肝臓及び腎臓並びに投与後3日間隔で採取した卵におけるシペルメトリン濃度をGC-ECDで測定した（分析法の詳細不明）。結果は表9を参照。（JECFA, 1997）

表9. 産卵鶏にシペルメトリンを単回噴霧投与後の試料中のシペルメトリン濃度 (mg/kg)

試料	投与量 (mg/羽)	
	10	20
筋肉	0.01～0.02(3)	<0.01～0.03(3)
脂肪	0.03～0.08(3)	0.025～0.14(3)
皮膚	0.08～0.4(3)	0.17～1.3(3)
肝臓	<0.01(3)	<0.01(3)
腎臓	<0.01(3)	<0.01～0.02(3)
卵	<0.01(3)	<0.01(3)

数値は分析値又は分析値の範囲を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.01 mg/kg

- ⑫ さけ（各10尾/時点）にシペルメトリンを有効成分とする薬浴剤（cis体：trans体=40：60）を1時間薬浴投与（7.88 µg/L（水温5.7～6.0°C）又は11.1 µg/L（水温10.0～11.9°C））し、投与終了1、20、27及び48時間後に採取した筋肉、皮膚及び肝臓におけるシペルメトリン濃度をGCで測定した（分析法の詳細不明）。筋肉及び皮膚中の濃

度は、全ての試料において定量限界未満（定量限界：筋肉及び肝臓 0.023 mg/kg、皮膚 0.027 mg/kg）であった。肝臓中の濃度は、投与終了1時間後は0.032～0.098 mg/kg (7.88 µg/L群) 又は定量限界未満～0.068 mg/kg (11.1 µg/L群) の範囲であったが、投与終了20時間後には定量限界未満となった。（EMEA, 2001, 2003）

7. ADI及びARfDの評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び第2項の規定に基づき、食品安全委員会あて意見を求めたシペルメトリンに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されている。

（1）ADI

無毒性量：2.25 mg/kg 体重/day

（動物種） イヌ

（投与方法） 混餌

（試験の種類） 亜急性毒性試験 (alpha-シペルメトリン)

（期間） 13週間

安全係数：100

ADI^{*} : 0.022 mg/kg 体重/day

※alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む。

シペルメトリンの各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた52週間慢性毒性試験の1 mg/kg 体重/日であったが、本試験についてEPAは一日摂取許容量（ADI）の設定根拠とはしておらず、食品安全委員会は、カプセル経口投与された本試験での最小毒性量5 mg/kg 体重/日で認められた所見は胃腸に対する影響のみであること、混餌投与されたイヌを用いた12か月慢性毒性試験及び2年間慢性毒性試験では高用量でも同様の所見は認められないことを考慮して、EPAの判断を支持した。本試験を除いた無毒性量のうちの最小値は、ラットを用いた3世代繁殖試験②の3.8 mg/kg 体重/日であった。

一方、alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンにおける無毒性量の最小値はalpha-シペルメトリンのイヌを用いた52週間慢性毒性試験の1.5 mg/kg 体重/日であったが、本試験についてJMPRはADIの設定根拠とはしておらず、食品安全委員会は、本試験の最小毒性量で認められた所見が皮膚への影響のみであることを考慮して、JMPRの判断を支持した。本試験を除いた無毒性量のうちの最小値は、alpha-シペルメトリンのイヌを用いた13週間亜急性毒性試験の2.25 mg/kg 体重/日であった。

したがって、食品安全委員会は、シペルメトリン (alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む) の無毒性量は2.25 mg/kg 体重/日を根拠とするのが適当であると判断し、これを安全係数100で除した0.022 mg/kg 体重/日をシペルメトリン (alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む) のADIと設定した。

(2) ARfD

無毒性量 : 4 mg/kg 体重

(動物種) ラット

(投与方法) 強制経口

(試験の種類) 急性神経毒性試験 (alpha-シペルメトリン)

安全係数 : 100

ARfD^{*} : 0.04 mg/kg 体重

※alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む。

シペルメトリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、幼若雌ラットを用いた子宮肥大試験で認められた神経症状をエンドポイントとして得られた無毒性量12.5 mg/kg 体重/日であった。

一方、alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量のうち最小値は、alpha-シペルメトリンのラットを用いた急性神経毒性試験の4 mg/kg 体重であったことから、食品安全委員会は、シペルメトリン (alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む) の単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量の最小値は、4 mg/kg 体重とすることが適当であると判断した。

したがって、alpha-シペルメトリンのラットを用いた急性神経毒性試験の4 mg/kg 体重を根拠として、安全係数100で除した0.04 mg/kg 体重をシペルメトリン (alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む) の急性参考用量 (ARfD) と設定した。

8. 諸外国における状況

JMPRにおける毒性評価が行われ、2006年にADI及びARfDが設定されている。国際基準はキャベツ、りんご等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてばかりいしょ、たまねぎ、乳等に、カナダにおいてとうもろこし、トマト、豚等に、EUにおいて小麦、だいこん、牛等に、豪州において大麦、レタス、卵等に、ニュージーランドにおいてキャベツ、ブロッコリー等に基準値が設定されている。

9. 基準値案

(1) 残留の規制対象

シペルメトリン (各異性体の和である。alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む。) とする。

農産物及び畜産物とともにシペルメトリンが主要な残留物であることから、シペルメトリンの使用状況を確認するには親化合物のみで十分と考え、農産物及び畜産物の残留の規制対象をシペルメトリンとする。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

(3) 暴露評価対象

シペルメトリン（各異性体の和である。alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む。）とする。

農産物及び畜産物とともにシペルメトリンが主要な残留物であること、欧州食品安全機関(EFSA)の評価において代謝物の毒性は親化合物に比べて高くないとされていること、JMPRにおいて暴露評価対象をシペルメトリンとしていることから、農産物及び畜産物の暴露評価対象をシペルメトリンとする。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物及び畜産物中の暴露評価対象物質をシペルメトリン（親化合物のみ：alpha-シペルメトリン及びzeta-シペルメトリンを含む）としている。

(4) 暴露評価

① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。

	EDI／ADI(%) ^{注)}
国民全体（1歳以上）	25.1
幼小児（1～6歳）	58.1
妊婦	25.8
高齢者（65歳以上）	26.1

注) 各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

② 短期暴露評価

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を推定したところ、国民全体（1歳以上）及び幼小児（1～6歳）のそれにおける摂取量は急性参考用量（ARfD）を超えていない^{注)}。詳細な暴露評価は別紙4-1及び4-2参照。

注) 基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTIを推定した。

(5) 本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。

シペルメトリンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
小麦 (玄麦)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 150 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.020 圃場B:0.04
大麦 (脱穀した種子)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 150 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.18 圃場B:0.15
未成熟とうもろこし (種子)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 300 L/10 a	3	7, 14 7, 13	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01
とうもろこし (乾燥子実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 300 L/10 a	3	7, 14 8, 14	圃場A:0.05 圃場B:<0.01 (3回, 8日)
だいす (乾燥子実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14	圃場A:<0.01 (3回, 7日) (#) 圃場B:<0.01 (3回, 7日) (#)
あづき (乾燥子実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.01 (3回, 7日) (#) 圃場B:<0.01 (3回, 7日) (#)
いんげんまめ (乾燥子実)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	3	6, 13, 20 7, 14, 21	圃場A:<0.01 (3回, 6日) 圃場B:<0.01
らっかせい (子実)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 176, 178 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A:<0.01 (3回, 7日) (#) 圃場B:<0.01 (3回, 7日) (#)
ばれいしょ (塊茎)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 150, 400 L/10 a	2, 4	7, 14	圃場A:<0.005 (4回, 7日) (#) 圃場B:<0.005 (4回, 7日) (#)
かんしょ (塊根)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	5	7, 14	圃場A:<0.01 (5回, 7日) (#) 圃場B:<0.01 (5回, 7日) (#)
やまのいも (塊茎)	3	6.0%乳剤	2000倍散布 189~242 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A:<0.01 (3回, 1日) (#) 圃場B:<0.01 (3回, 1日) (#) 圃場C:<0.01 (3回, 1日) (#)
てんさい (根部)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 100 L/10 a	4	14, 21 14, 20	圃場A:0.024 (4回, 14日) (#) 圃場B:0.038 (4回, 14日) (#)
	2	6.0%乳剤	1000倍散布 100 L/10 a	4	14, 21 7, 14	圃場A:0.01 (4回, 14日) (#) 圃場B:0.01 (4回, 14日) (#)
	2	9.0%水和剤	500倍散布 25 L/10 a	4	7, 14, 21	圃場A:<0.01 (4回, 14日) (#) 圃場B:0.02 (4回, 14日) (#)
てんさい (葉部)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 100 L/10 a	4	14, 21 14, 20	圃場A:0.474 (4回, 14日) (#) 圃場B:0.866 (4回, 14日) (#)
だいこん (根部)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 136~200, 150 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A:0.010 (5回, 7日) (#) 圃場B:<0.005 (5回, 7日) (#)
だいこん (葉部)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 136~200, 150 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A:1.10 (5回, 7日) (#) 圃場B:2.12 (5回, 7日) (#)
はつかだいこん (根部)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 150 L/10 a	1	1, 3, 7	圃場A:0.012 圃場B:0.012
はつかだいこん (葉部)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 150 L/10 a	1	1, 3, 7	圃場A:2.89 圃場B:2.36
はくさい (茎葉)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 200, 300~400 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A:0.308 (5回, 7日) (#) 圃場B:0.388 (5回, 1日) (#)
キャベツ (葉球)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 62.5~390, 200 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A:0.006 (5回, 7日) (#) 圃場B:0.029 (3回, 7日) (#)
こまつな (茎葉)	4	6.0%乳剤	2000倍散布 180~210 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A:1.51 (2回, 3日) 圃場B:2.84 圃場C:1.62 圃場D:2.00
チングンサイ (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A:1.98 圃場B:1.79
さぬきな (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	1, 3, 7, 14 1, 3, 7	圃場A:1.10 圃場B:1.90
なばな (花茎)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 200 L/10 a	1, 3	7, 14, 21	圃場A:1.45 圃場B:0.596

シペルメトリンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
みずな (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 190, 200 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A: 0.54 圃場B: 1.80 (2回, 3日)
ごぼう (根部)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	5	7, 14	圃場A: <0.01 (5回, 14日) (#) 圃場B: 0.14 (5回, 14日) (#)
レタス (茎葉)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	3, 5	7, 14	圃場A: 0.270 (5回, 7日) (#) 圃場B: 0.250 (3回, 7日) (#)
リーフレタス (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	7, 14, 21 6, 13, 21	圃場A: 0.90 圃場B: 0.55 (2回, 6日)
サラダ菜 (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 179~180, 200 L/10 a	2	3, 7, 14, 21	圃場A: 0.88 圃場B: 0.34
食用ざく (花器全体)	2	6.0%乳剤	1500倍散布 200 L/10 a	1	3, 7, 14	圃場A: 2.01 圃場B: 1.64
たまねぎ (鱗茎)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	5	7, 14	圃場A: <0.01 (5回, 7日) (#) 圃場B: <0.01 (5回, 7日) (#)
	2		48倍散布 2.4 L/10 a	5	3, 7, 14	圃場A: <0.01 圃場B: <0.01
ねぎ (茎葉)	4	6.0%乳剤	1000倍散布 180~200 L/10 a	5	7, 14	圃場A: 0.71 圃場B: 1.72
					7, 14, 21, 28, 42	圃場C: 0.56 圃場D: 0.36
にら (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A: 0.20 圃場B: 1.06
アスパラガス (茎)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 500 L/10 a	3	1, 3, 7, 14	圃場A: 0.07 圃場B: 0.08
わけぎ (茎葉)	1	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	5	7, 14, 21	圃場A: 0.237 (5回, 7日) (#)
	2		1000倍散布 100 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 0.48 圃場B: 0.44 (2回, 7日)
にら (花茎)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 0.20 圃場B: 0.26
葉にんにく (葉及び鱗茎)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 100 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 1.65 圃場B: 0.81
らっきょう (鱗茎)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 150 L/10 a	5	3, 7, 14	圃場A: <0.05 圃場B: <0.1
にんじん (根部)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	7, 14, 21	圃場A: 0.010 (2回, 14日) 圃場B: <0.005
トマト (果実)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 250 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 0.970 (5回, 7日) (#) 圃場B: 0.444 (5回, 1日) (#)
	4	6.0%乳剤	1000倍散布 199~283 L/10 a	5	1, 3, 7, 14	圃場A: 0.15 (5回, 7日) (#) 圃場B: 0.10 (5回, 1日) (#)
						圃場C: 0.17 (5回, 1日) (#) 圃場D: 0.30 (5回, 1日) (#)
ミニトマト (果実)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A: 0.21 圃場B: 0.24
ピーマン (果実)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 0.26
					1, 4, 7	圃場B: 0.91
なす (果実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 250 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 0.18 圃場B: 0.10
きゅうり (果実)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 250 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 0.090 (5回, 1日) (#) 圃場B: 0.130 (5回, 1日) (#)
かぼちゃ (果実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	5	1, 3	圃場A: 0.06 (5回, 1日) (#) 圃場B: 0.04 (5回, 1日) (#)

シペルメトリンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}	
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
すいか (果肉)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 150 L/10 a	5	1, 3	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01	
			1000倍散布 200~289 L/10 a	5	1, 3, 7	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01 圃場C:<0.01	
			1000倍散布 200~289 L/10 a	5	1, 3, 7	圃場A:0.06 圃場B:0.12 圃場C:0.07	
	3		1000倍散布 250 L/10 a	5	1, 3	圃場A:<0.005 圃場B:<0.005	
			1000倍散布 221, 280 L/10 a	5	1	圃場A:0.079 圃場B:<0.001	
			1000倍散布 278~283 L/10 a	5	1, 3, 7	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01 圃場C:<0.01	
メロン (果肉)	2		1000倍散布 221, 280 L/10 a	5	1	圃場A:0.364 圃場B:0.162	
			1000倍散布 278~283 L/10 a	5	1, 3, 7	圃場A:0.22 圃場B:0.34 (5回, 3日) 圃場C:0.18	
			1000倍散布 278~283 L/10 a	5	1	圃場A:1.62 圃場B:1.36 圃場C:2.32 圃場D:1.09	
	3		1000倍散布 100~222 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A:1.42 (3回, 7日) (#) 圃場B:0.856 (3回, 7日) (#)	
			1000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.2 圃場B:0.4	
			1000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14	圃場A:1.4 圃場B:1.1	
ほうれんそう (茎葉)	4	6.0%乳剤	1000倍散布 100~222 L/10 a	5	1, 3, 7, 14, 21	圃場A:0.74 圃場B:1.88	
さやいんげん (さや)	2		2000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.6 圃場B:0.6	
えだまめ (さや)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	3	7, 14	圃場A:0.263 ^{注2)} 圃場B:0.268 ^{注2)}	
未成熟ささげ (さや)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 250 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A:0.263 ^{注2)} 圃場B:0.268 ^{注2)}	
エンサイ (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A:0.263 ^{注2)} 圃場B:0.268 ^{注2)}	
かんしょ (茎葉)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 174~289, 294 L/10 a	2	7, 14, 21, 28	圃場A:0.6 圃場B:0.6	
食用なでしこ (花)	2	6.0%乳剤	1500倍散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A:0.263 ^{注2)} 圃場B:0.268 ^{注2)}	
みかん (果肉)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 50 L/樹, 400 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A:<0.005 圃場B:<0.005	
みかん (果皮)	2		1000倍散布 50 L/樹, 400 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A:1.62 圃場B:1.88	
みかん (果実全体)	2		1000倍散布 50 L/樹, 400 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A:0.24 (5回, 6日) (#) 圃場B:0.88 (5回, 14日) (#)	
なつみかん (果実全体)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 400 L/10 a	5	6, 13, 20	圃場A:0.60 圃場B:0.12 (3回, 42日)	
			1000倍散布 600 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.46	
かぼす (果実全体)	1	6.0%乳剤	1000倍散布 617 L/10 a	3	7, 14, 28, 42	圃場A:0.77	
すだち (果実全体)	1	6.0%乳剤	1000倍散布 520 L/10 a	3	7, 14, 28, 42	圃場A:0.77	

シペルメトリンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
りんご (果実)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 600, 800 L/10 a	3, 5	14, 21, 28	圃場A: 0.431 (3回, 21日) (#) 圃場B: 0.16 (3回, 28日) (#)
	2	9.0%水和剤	1500倍散布 500 L/10 a	2	1, 7, 14, 28, 42	圃場A: 0.37 (2回, 7日) 圃場B: 0.40
日本なし (果実)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 300, 400 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A: 0.612 (3回, 7日) (#) 圃場B: 0.666 (3回, 7日) (#)
	4	6.0%乳剤	1000倍散布 300~500 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 0.46 (3回, 3日) (#) 圃場B: 0.83 (3回, 3日) (#)
					1, 3, 7, 14, 21	圃場C: 0.42 (3回, 3日) (#) 圃場D: 0.14 (3回, 1日) (#)
もも (果肉)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 400, 600 L/10 a	3, 5	7, 14	圃場A: 0.018 (5回, 7日) (#) 圃場B: <0.005 (5回, 7日) (#)
	2	9.0%水和剤	1500倍散布 313, 350 L/10 a	5	1, 3, 7, 14	圃場A: 0.08 圃場B: 0.02
もも (果皮)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 400, 600 L/10 a	3, 5	7, 14	圃場A: 5.38 (3回, 7日) (#) 圃場B: 3.99 (5回, 7日) (#)
	2	9.0%水和剤	1500倍散布 313, 350 L/10 a	5	1, 3, 7, 14	圃場A: 18.4 圃場B: 5.28
もも (果実全体)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 400, 600 L/10 a	3, 5	7, 14	圃場A: 0.813 (3回, 7日) ^{注2)} (#) 圃場B: 0.602 (5回, 7日) ^{注2)} (#)
	2	9.0%水和剤	1500倍散布 313, 350 L/10 a	5	1, 3, 7, 14	圃場A: 1.90 ^{注2)} 圃場B: 0.60 ^{注2)}
ネクタリン (果実)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 333, 400 L/10 a	2	1, 3, 7, 14, 21, 28	圃場A: 0.14 圃場B: 0.26 (2回, 7日)
あんず (果実)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 333, 356~357 L/10 a	2	1, 3, 7, 14, 21, 28	圃場A: 0.29 (2回, 1日) (#) 圃場B: 0.44 (2回, 1日) (#)
すもも (果実)	2	9.0%水和剤	1500倍散布 333, 400 L/10 a	2	1, 3, 7, 14, 21, 28	圃場A: 0.21 圃場B: 0.30 (2回, 14日)
うめ (果実)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 300 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A: 0.80 (3回, 7日) (#) 圃場B: 0.68 (3回, 7日) (#)
とうとう (果実)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 400 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 1.11 (3回, 3日) (#) 圃場B: 0.90 (3回, 3日) (#)
	2	6.0%乳剤	1000倍散布 400 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A: 0.73 (2回, 7日) (#) 圃場B: 0.92 (2回, 7日) (#)
いちご (果実)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 150 L/10 a	3, 5	1, 3, 7	圃場A: 0.251 (3回, 1日) (#) 圃場B: 0.421 (3回, 3日) (#)
ぶどう (果実)	4	6.0%乳剤	1000倍散布 200~500 L/10 a	3, 5	7, 14, 21	圃場A: 0.781 (5回, 21日) (#) 圃場B: 0.707 (5回, 21日) (#)
				5		圃場C: 1.19 (5回, 21日) (#) 圃場D: 1.24 (5回, 21日) (#)
	1	6.0%水和剤	1000倍散布 300 L/10 a	5	7, 14, 28, 42	圃場A: 0.52 (5回, 28日)
かき (果実)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 400 L/10 a	5	7, 14, 22	圃場A: 0.42 (5回, 14日) (#)
	5		7, 14, 21	圃場B: 0.32 (5回, 7日) (#)		
	2		1000倍散布 300 L/10 a	2, 3	1, 7, 14, 28	圃場A: 0.39 (3回, 28日) 圃場B: 0.38 (3回, 7日)

シペルメトリンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
キウイフルーツ (果肉)	2	6.0%乳剤	1000倍散布 300 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:<0.01
					8, 14, 21	圃場B:0.011 (3回, 14日)
			1000倍散布 348~360 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.01 圃場B:0.01 圃場C:0.02
	1		1000倍散布 375 L/10 a	3	7	圃場A:0.005
キウイフルーツ (果皮)	2		1000倍散布 300 L/10 a	3	7, 14, 21 8, 14, 21	圃場A:10.4 圃場B:7.97 (3回, 21日)
キウイフルーツ (果実全体)	2		1000倍散布 300 L/10 a		7, 14, 21 8, 14, 21	圃場A:1.37 ^{注2)} 圃場B:0.93 ^{注2)} (3回, 14日)
			1000倍散布 348~360 L/10 a	3	7, 14, 21	圃場A:0.83 ^{注2)} 圃場B:0.89 ^{注2)} 圃場C:1.28 ^{注2)}
	1		1000倍散布 375 L/10 a	3	7	圃場A:0.642 ^{注2)}
べばかぼちや (種子)	2		2000倍散布 100 L/10 a	4	7	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01
くり (種実)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 500 L/10 a	3, 5	7, 14	圃場A:<0.005 (5回, 7日) (#) 圃場B:<0.005 (5回, 7日) (#)
くるみ (果仁)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 500 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A:<0.006 圃場B:<0.006
茶 (荒茶)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	1, 2	7, 14	圃場A:12.3 (1回, 14日) (#) 圃場B:8.38 (1回, 14日) (#)
茶 (浸出液)	2	10.0%乳剤	1000倍散布 200 L/10 a	1, 2	7, 14	圃場A:0.078 (1回, 14日) (#) 圃場B:0.034 (1回, 14日) (#)
からしな (種子)	2	9.0%水和剤	3000倍散布 100~200 L/10 a	3	14, 21, 28, 35 14, 20, 27, 34	圃場A:<0.1 圃場B:<0.1
しそ (葉部)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 150 L/10 a		1, 3, 5, 7	圃場A:2.80 圃場B:0.44
しそ (花穂)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A:2.59 圃場B:1.82
バジル (茎葉)	2	6.0%乳剤	2000倍散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A:2.3 圃場B:2.4
みょうが (花穂)	2	6.0%水和剤	1000倍散布 200~300 L/10 a	5	1, 3, 7	圃場A:<0.05 圃場B:<0.05

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注1) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（ ）内に記載した。

注2) 果肉及び果皮の重量比から果実全体の残留濃度を算出した。

(別紙1-2)

zeta-シペルメトリンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
米	22	1.5EC乳剤 及び 1.5EW乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	4	16	圃場A: 0.079 ^{注2)}
					14	圃場B: 0.083 ^{注2)} 圃場C: 0.092 ^{注2)} 圃場D: 0.107 ^{注2)} 圃場E: 0.108 ^{注2)} 圃場F: 0.066 ^{注2)} 圃場G: 0.110 ^{注2)} 圃場H: 0.057 ^{注2)}
					17	圃場I: 0.022 ^{注2)}
					14	圃場J: 0.060 ^{注2)} 圃場K: 0.086 ^{注2)} 圃場L: 0.061 ^{注2)} 圃場M: 0.092 ^{注2)} 圃場N: 0.127 ^{注2)} 圃場O: 0.166 ^{注2)} 圃場P: 0.057 ^{注2)} 圃場Q: 0.072 ^{注2)} 圃場R: 0.082 ^{注2)} 圃場S: 0.058 ^{注2)} 圃場T: 0.086 ^{注2)} 圃場U: 0.083 ^{注2)} 圃場V: 0.089 ^{注2)}
だいこん (根部)	5	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	6	1	圃場A: 0.015
		1.5EW乳剤				圃場B: 0.030
		1.5EC乳剤				圃場C: 0.060
		1.5EC乳剤				圃場D: 0.030
		1.5EW乳剤				圃場E: 0.015
たまねぎ	2	1.5EW乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	5	7	圃場A: <0.010 圃場B: <0.010
葉たまねぎ	2	1.5EW乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	5	7	圃場A: 0.570 圃場B: 0.190
にんじん	6	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	1	1	圃場A: <0.025 圃場B: <0.025 圃場C: <0.025 圃場D: <0.025 圃場E: <0.025 圃場F: <0.020
		1.5EW乳剤				
		1.5EC乳剤				
		1.5EC乳剤				
		1.5EW乳剤				
		1.5EC乳剤				
りんご	12	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	6	14	圃場A: 0.13
		1.5EW乳剤			7, 14, 21, 28	圃場B: 0.14 (6回, 28日)
		1.5EC乳剤				圃場C: 0.15
		1.5EW乳剤				圃場D: 0.13
		1.5EC乳剤				圃場E: 0.25
		1.5EW乳剤				圃場F: 0.22
		1.5EC乳剤				圃場G: 0.12
		1.5EW乳剤		14		圃場H: 0.29
		1.5EC乳剤				圃場I: 0.11
		1.5EW乳剤				圃場J: 0.28
		1.5EC乳剤				圃場K: 0.20
		1.5EW乳剤				圃場L: 0.16
西洋なし	6	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	6	14	圃場A: 0.39
		1.5EW乳剤				圃場B: 0.07
		1.5EC乳剤				圃場C: 0.07 (6回, 28日)
		1.5EW乳剤		14		圃場D: 0.33
		1.5EC乳剤				圃場E: 0.43
		1.5EW乳剤				圃場F: 0.49

(別紙1-2)

zeta-シペルメトリンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
ブラックベリー	3	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	6	1, 3, 7, 14	圃場A: 0.195
		1.5EW乳剤			1	圃場B: 0.115
		1.5EC乳剤				圃場C: 0.170
ブルーベリー	6	1.5EC乳剤	散布 0.05 lb ai/acre	6	1	圃場A: 0.480
		1.5EW乳剤				圃場B: 0.340
		1.5EC乳剤				圃場C: 0.515
		1.5EW乳剤				圃場D: 0.345
		1.5EC乳剤				圃場E: 0.445
		1.5EW乳剤				圃場F: 0.260

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注1) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（ ）内に記載した。

注2) 当該農薬の作物残留成績は、粗米中の残留濃度に加工係数0.146を乗じて玄米中の残留濃度を計算した。なお加工係数(0.146)は、粗米(rice, grain)、白米(polished rice)及び糠(bran)でのシペルメトリン残留濃度(2.98、0.27及び1.78 mg/kg)及びそれぞれの重量比(100、66.4及び8.2)を基にして次式[$\{(0.27 \times 66.4 / (66.4 + 8.2)) + 1.78 \times 8.2 / (66.4 + 8.2)\} / 2.98 = 0.146$]により算出した。

(別紙1-3)

alpha-シペルメトリンの作物残留試験一覧表（豪州）

農作物	試験 圃場数	試験条件				残留濃度 (mg/kg) ^{注1)}
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
パセリ	2	100 g ai/L乳剤	散布 40 g ai/ha	2	0, 3, 5	圃場A:0.5 圃場B:0.5

注1) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（ ）内に記載した。

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
米（玄米をいう。）	0.3	0.9		1.5*	米国	【0.022～0.166(n=22)(米国)】
小麦	2	0.2	○	2		
大麦	2	0.5	○	2		
ライ麦	2	1.0	○	2		
とうもろこし	0.3	0.2	○	0.3		
そば	0.3	0.5		0.3		
その他の穀類	2	1.0	○	2		
大豆	0.05	0.05	○	0.05		
小豆類	0.05	0.5	○	0.05		
えんどう	0.05	1.0	○	0.05		
そら豆	0.05	0.05	○	0.05		
らっかせい	0.1	0.05	○	0.1		
その他の豆類	0.05	0.05	○	0.05		
ばかりしょ	0.02	0.05	○	0.01		<0.005, <0.005(#)(¥)
さといも類（やつがしらを含む。）	0.01	0.05		0.01		<0.01, <0.01(#)(¥)
かんしょ	0.05	0.05	○	0.01		
やまいも（長いもをいう。）	0.01	0.05	○	0.01		
こんにゃくいも	0.01	0.05		0.01		
その他のいも類	0.01	0.05		0.01		
てんさい	0.1	0.1	○	0.1		
さとうきび	0.2	0.3		0.2		
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.1	0.05	○	0.01	0.1	米国 【米国だいこんの根(0.015～0.060)(n=5), にんじん(<0.020～<0.025)(n=6)】 2.36, 2.89(¥)(はつかだいこん(葉部))
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	5	5.0	○	0.7		
かぶ類の根	0.01	0.05		0.01		
かぶ類の葉	0.7	1		0.7		
西洋わさび	0.01	0.05		0.01		
クレソン	0.7	5		0.7		
はくさい	1	5.0	○	1		(こまつな参照) 1.51～2.84(n=4)
キャベツ	1	1.0	○	1		0.54, 1.80(¥)(みずな)
芽キャベツ	1	1.0		1		1.79, 1.98(¥)
ケール	6	1.0	申	0.7		
こまつな	6	5.0	○	0.7		
きょうな	5	5	○	0.7		
チングンサイ	5	5.0	○	0.7		
カリフラワー	1	1.0		1		
プロッコリー	1	1.0		1		
その他のあぶらな科野菜	6	5.0	○	1		(こまつな参照)
ごぼう	0.3	0.5	○	0.01		<0.01, 0.07(¥)※1
サルシフィー	0.01	0.05		0.01		
アーティチョーク	0.1	1		0.1		
チヨリ	0.7	4		0.7		
エンダイブ	0.7	5		0.7		
しゅんぎく	0.7	5		0.7		
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	2	2.0	○	0.7		0.55, 0.90(リーフレタス), 0.34, 0.88(サラダ菜)
その他のきく科野菜	5	5.0	○	0.7		1.64, 2.01(¥)(食用ぎく)
たまねぎ	0.05	0.1	○	0.01		<0.01, <0.01(¥)
ねぎ（リーキを含む。）	4	5.0	○	0.05		0.36～1.72(n=4)
にんにく	0.06					
にら	3	6.0	○			0.20, 1.06(¥)
アスパラガス	0.4	0.5	○	0.4		
わけぎ	1	5.0	○			0.44, 0.48(¥)
その他のゆり科野菜	6	6.0	○	6.0	米国	【0.190, 0.570(葉たまねぎ)(米国)】

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
にんじん	0.1	0.05	○	0.01	0.1	米国 【米国だいこんの根、にんじん 参照】
パースニップ	0.01	0.05		0.01		
パセリ	1	6			1	豪州 【0.5, 0.5(豪州)】
セロリ		3				
みつば	0.7	1		0.7		
その他のせり科野菜	0.01	0.05		0.01		
トマト	0.7	2.0	○	0.2		0.21, 0.24(¥) (ミニトマト)
ピーマン	2	2.0	○	0.1		0.26, 0.91(¥)
なす	0.5	0.5	○	0.03		0.10, 0.18(¥)
その他のなす科野菜	2	0.5		2		
きゅうり (ガーキンを含む。)	0.3	0.5	○	0.07		0.054, 0.078(¥)※1
かぼちゃ (スカッッシュを含む。)	0.2	5.0	○	0.07		0.02, 0.03(¥)※1
しろうり	0.07	0.1		0.07		
すいか		2.0	○			
すいか (果皮を含む。)	0.3		○	0.07		0.06, 0.07, 0.12
メロン類果実		2.0	○			
メロン類果実 (果皮を含む。)	0.8		○	0.07		0.162～0.364(n=5)
まくわうり		0.1				
まくわうり (果皮を含む。)	0.07			0.07		
その他のうり科野菜	0.07	0.05		0.07		
ほうれんそう	5	2.0	○・申	0.7		1.09～2.32(n=4)
たけのこ		5.0				
オクラ	0.5	0.2		0.5		
しょうが	0.2	0.03		0.2		
未成熟えんどう	0.7	0.05		0.7		
未成熟いんげん	0.7	0.5	○	0.7		
えだまめ	2	5.0	○	0.7		0.428, 0.71(¥)※1
マッシュルーム		0.05				
しいたけ		0.03				
その他のきのこ類		0.5				
その他の野菜		5.0	○			
その他の野菜 (ずいき及びれんこんを除く。)	5		○	0.7		0.74, 1.88(¥) (かんしょ(茎葉))
みかん		2.0	○			
みかん (外果皮を含む。)	0.7		○	0.3		0.263, 0.268(¥)
なつみかんの果実全体	2	2.0	○	0.3		0.12, 0.60(¥)
レモン	2	2.0	○	0.3		(かぼす、すだち参照)
オレンジ (ネーブルオレンジを含む。)	2	2.0	○	0.3		(かぼす、すだち参照)
グレープフルーツ	2	2.0	○	0.5		(かぼす、すだち参照)
ライム	2	2.0	○	0.5		(かぼす、すだち参照)
その他のかんきつ類果実	2	2.0	○	0.5		0.46(かぼす), 0.77(すだち)(¥)
りんご	2	2.0	○	0.7	2	米国 【米国りんご(0.11～0.29)(n=12), 西洋なし(0.07～0.49)(n=6)】
日本なし	2	2.0	○	0.7	2	米国 【米国りんご、西洋なし参照】
西洋なし	2	2.0	○	0.7	2	米国 【米国りんご、西洋なし参照】
マルメロ	2	2.0		0.7	2	米国 【米国りんご、西洋なし参照】
びわ		2.0				
びわ (果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	2			0.7	2	米国 【米国りんご、西洋なし参照】
もも		2.0	○			
もも (果皮及び種子を含む。)	5		○		2	0.60, 1.90(¥)
ネクタリン	2	2.0	○		2	
あんず (アブリコットを含む。)	2	1.0	○		2	
すもも (ブルーンを含む。)	2	1.0	○		2	
うめ	2	2.0	○		2	
とうとう (チェリーを含む。)	2	2.0	○		2	0.73, 0.92(#)(¥)

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
いちご	0.7	2.0	○	0.07	0.8	0.126, 0.211(¥)※1
ラズベリー	0.8	0.5				【米国ブラックベリー、ブルーベリー参照】
ブラックベリー	0.8	0.5		0.8	米国	【米国ブラックベリー(0.115～0.195(n=3), ブルーベリー(0.260～0.515)(n=6)】
ブルーベリー	0.8	0.5		0.8	米国	【米国ブラックベリー、ブルーベリー参照】
クランベリー	0.8	0.5		0.8	米国	【米国ブラックベリー、ブルーベリー参照】
ハックルベリー	0.8	0.5		0.8	米国	【米国ブラックベリー、ブルーベリー参照】
その他のベリー類果実	0.8	0.5		0.8	米国	【米国ブラックベリー、ブルーベリー参照】
ぶどう	3	2.0	○	0.2		0.707～1.24(#)(n=4)
かき	1	2.0	○	0.7		0.38, 0.39(¥)
バナナ	0.03					
キウイ	2.0		○			
キウイ (果皮を含む。)	3		○			0.642～1.37(n=6)
パパイヤ	0.5	0.01		0.5		
アボカド		0.1				
パインアップル		0.03				
グアバ		0.03				
マンゴー	0.7	0.03		0.7		
パッションフルーツ		0.03				
なつめやし		0.03				
その他の果実	2	0.5		2		
ひまわりの種子	0.1	0.2		0.1		
ごまの種子	0.1	0.2		0.1		
べにばなの種子	0.1	0.2		0.1		
綿実	0.1	0.2		0.1		
なたね	0.1	0.2		0.1		
その他のオイルシード	0.1	0.2	○	0.1		
ぎんなん	0.05	0.03		0.05		
くり	0.05	2.0	○	0.05		
ペカン	0.05	0.05		0.05		
アーモンド	0.05	0.03		0.05		
くるみ	0.05	0.03	○	0.05		
その他のナッツ類	0.1	0.2		0.1		
茶	15	20	○	15		
コーヒー豆	0.05	0.05		0.05		
カカオ豆		0.03				
ホップ		20				
その他のスパイス (果実、根及び根茎を除く。)		5	○			
その他のスパイス	5		○	3		1.62, 1.88(¥) (みかんの果皮)
その他のハーブ	6	6	○	0.7		(こまつな参照)
牛の筋肉	2	0.1				【牛の脂肪参照】
豚の筋肉	2	0.1				【牛の脂肪参照】
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2	0.1				【牛の脂肪参照】
牛の脂肪	2	0.2		2		
豚の脂肪	2	0.2		2		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2	0.2		2		
牛の肝臓	0.05	0.05		0.05		
豚の肝臓	0.05	0.05		0.05		

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05	0.05		0.05		
牛の腎臓	0.05	0.05		0.05		
豚の腎臓	0.05	0.05		0.05		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05	0.05		0.05		
牛の食用部分	0.05	0.05		0.05		
豚の食用部分	0.05	0.05		0.05		
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05	0.05		0.05		
乳	0.1	0.05		0.1		
鶏の筋肉	0.1	0.05		0.1		
その他の家きんの筋肉	0.1	0.05		0.1		
鶏の脂肪	0.1	0.1		0.1		
その他の家きんの脂肪	0.1	0.1		0.1		
鶏の肝臓	0.05	0.05		0.05		
その他の家きんの肝臓	0.05	0.05		0.05		
鶏の腎臓	0.05	0.05		0.05		
その他の家きんの腎臓	0.05	0.05		0.05		
鶏の食用部分	0.05	0.05		0.05		
その他の家きんの食用部分	0.05	0.05		0.05		
鶏の卵	0.01	0.05		0.01		
その他の家きんの卵	0.01	0.05		0.01		
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05	0.03		0.05	EU	【<0.023(n=10) (EU)】
魚介類（うなぎ目魚類に限る。）		0.01				
魚介類（すずき目魚類に限る。）		0.01				
魚介類（その他の魚類に限る。）		0.01				
魚介類（貝類に限る。）		0.01				
魚介類（甲殻類に限る。）		0.01				
その他の魚介類		0.01				
はちみつ		0.01				
小麦ふすま	5			5		
とうがらし（乾燥させたもの）				10		
植物油（精製したものに限る。）		0.5				
乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。）		0.1				
乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）		0.2				

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

申請（国内における登録、承認等の申請、イポートトレラス申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案については、太枠線で囲んで示した。

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したものについては、斜線で示した。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

(¥)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。

*米国の基準値1.5 ppmは粉米で設定されている。

※1) ごぼう、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ（スカッシュを含む。）、えだまめ及びいちごについては、プロポーションナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の比例性を考慮して換算した。

※2) 加工食品である「とうがらし（乾燥させたもの）」について、国際基準が設定されているが、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えないことから、基準値を設定しないこととする。基準値が設定されていない加工食品については、原材料の基準値に基づき加工係数を考慮して適否を判断することとしている。なお、本物質について、JMPRはとうがらし（乾燥させたもの）の加工係数を7と算出している。

シペルメトリンの推定摂取量 (単位: µg/人/day)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) TMDI	国民全体 (1歳以上) EDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI
米(玄米をいふ。)	0.3	0.084	49.3	13.8	25.7	7.2	31.6	8.8	54.1	15.1
小麦	2	1.38	119.6	82.5	88.6	61.1	138.0	95.2	99.8	68.9
大麦	2	1.38	10.6	7.3	8.8	6.1	17.6	12.1	8.8	6.1
ライ麦	2	1.38	0.2	0.1	0.2	0.1	1.0	0.7	0.2	0.1
とうもろこし	0.3	0.035	1.4	0.2	1.6	0.2	1.8	0.2	1.3	0.2
そば	0.3	0.035	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.3	0.0
その他の穀類	2	1.38	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4
大豆	0.05	0.05	2.0	2.0	1.0	1.0	1.6	1.6	2.3	2.3
小豆類	0.05	0.05	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
えんどう	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
そら豆	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
らっかせい	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
その他の豆類	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ほれいしょ	0.02	0.005	0.8	0.2	0.7	0.2	0.8	0.2	0.7	0.2
さつも類(やつがしらを含む。)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
かんしょ	0.05	0.01	0.3	0.1	0.3	0.1	0.6	0.1	0.5	0.1
やまいも(長いもをいふ。)	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
こんにゃくいも	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のいも類	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
てんさい	0.1	0.01	3.3	0.3	2.8	0.3	4.1	0.4	3.3	0.3
さとうきび	0.2	0.05	19.6	4.9	16.7	4.2	24.8	6.2	20.0	5.0
たいやん類(アティンショウを含む。)の根	0.1	0.027	3.3	0.9	1.1	0.3	2.1	0.6	4.6	1.2
たいやん類(アティンショウを含む。)の茎	5	2.625	8.5	4.5	3.0	1.6	15.5	8.1	14.0	7.4
かぶ類の根	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
かぶ類の葉	0.7	0.07	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
西洋ねぎ	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クレソン	0.7	0.07	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
はくさい	1	0.02	17.7	0.4	5.1	0.1	16.6	0.3	21.6	0.4
キャベツ	1	0.02	24.1	0.5	11.6	0.2	19.0	0.4	23.8	0.5
芽キャベツ	1	0.02	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
ケール	6	1.99	1.2	0.4	0.6	0.2	0.6	0.2	1.2	0.4
まつな	6	1.99	30.0	10.0	10.8	3.6	38.4	12.7	38.4	12.7
きょうのり	5	1.17	11.0	2.6	2.0	0.5	7.0	1.6	13.5	3.2
チリサイ	5	1.89	9.0	3.4	3.5	1.3	9.0	3.4	9.5	3.6
カリフラワー	1	0.02	0.5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0
ブロッコリー	1	0.02	5.2	0.1	3.3	0.1	5.5	0.1	5.7	0.1
その他のあぶらな科野菜	6	1.99	20.4	6.8	3.6	1.2	4.8	1.6	28.8	9.6
ねぼう	0.3	0.04	1.2	0.2	0.5	0.1	1.2	0.2	1.4	0.2
サルシフィー	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アーティチョーク	0.1	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
チコリ	0.7	0.07	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
エンダイフ	0.7	0.07	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
しゅんぎく	0.7	0.07	1.1	0.1	0.2	0.0	1.8	0.2	1.8	0.2
レタス(サラダ葉及びしらしやを含む。)	2	0.668	19.2	6.4	8.8	2.9	22.8	7.6	18.4	6.1
その他のきく科野菜	5	1.825	7.5	2.7	0.5	0.2	3.0	1.1	13.0	4.7
たまねぎ(キを含む。)	0.05	0.01	1.6	0.3	1.1	0.2	1.8	0.4	1.4	0.3
ねぎ(キを含む。)	4	0.838	37.6	7.9	14.8	3.1	27.2	5.7	42.8	9.0
にら	3	0.63	6.0	1.3	2.7	0.6	5.4	1.1	6.3	1.3
アスパラガス	0.4	0.09	0.7	0.2	0.3	0.1	0.4	0.1	1.0	0.2
わけざ	1	0.46	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1
その他のゆり科野菜	6	0.38	3.6	0.2	0.6	0.0	1.2	0.1	7.2	0.5
にんじん	0.1	0.027	1.9	0.5	1.4	0.4	2.3	0.6	1.9	0.5
バースニップ	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
バセリ	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
みづば	0.7	0.07	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0
その他のセリ科野菜	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トマト	0.7	0.225	22.5	7.2	13.3	4.3	22.4	7.2	25.6	8.2
ピーマン	2	0.585	9.6	2.8	4.4	1.3	15.2	4.4	9.8	2.9
なす	0.5	0.140	6.0	1.7	1.1	0.3	5.0	1.4	8.6	2.4
その他のなす科野菜	2	0.495	2.2	0.5	0.2	0.0	2.4	0.6	2.4	0.6
きゅうり(ガーベンを含む。)	0.3	0.066	6.2	1.4	2.9	0.6	4.3	0.9	7.7	1.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	0.2	0.025	1.9	0.2	0.7	0.1	1.6	0.2	2.6	0.3
じょうり	0.07	0.03	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
甘いかぶ(果皮を含む。)	0.3	0.083	2.5	0.6	1.7	0.3	4.3	1.2	3.4	0.9
メロン類果実(果皮を含む。)	0.8	0.253	2.8	0.9	2.2	0.7	3.5	1.1	3.4	1.1
まくわうり(果皮を含む。)	0.07	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のうり科野菜	0.07	0.01	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
ほづれんそう	5	1.998	64.0	20.5	29.5	9.4	71.0	22.7	87.0	27.8
オクラ	0.5	0.08	0.7	0.1	0.6	0.1	0.7	0.1	0.9	0.1
しょうが	0.2	0.01	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
未成熟えんどう	0.7	0.22	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	1.7	0.5
未成熟いんげん	0.7	0.22	1.7	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0	2.2	0.7
なすめ	2	0.569	5.4	1.0	2.0	0.6	1.2	0.3	5.4	1.5
その他の野菜(すいき及びれんこんを除く。)	5	1.31	67.0	17.6	31.5	8.3	50.5	13.2	70.5	18.5
なかん(外果皮を含む。)	0.7	0.266	12.5	4.7	11.9	4.4	0.4	0.2	18.3	7.0
なつみかんの果実全体	2	0.36	2.6	0.5	1.4	0.3	9.6	1.7	4.2	0.8
レモン	2	0.615	1.0	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	1.2	0.4
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	2	0.615	14.0	4.3	29.2	9.0	25.0	7.7	8.4	2.6
グレープフルーツ	2	0.615	8.4	2.6	4.6	1.4	17.8	5.5	7.0	2.2
ライム	2	0.615	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
その他のかんきつ類果実	2	0.615	11.8	3.6	5.4	1.7	5.0	1.3	19.0	5.8
りんご	2	0.297	48.4	7.2	61.8	9.2	37.6	5.6	64.8	9.6
日本なし	2	0.297	12.8	1.9	6.8	1.0	18.2	2.7	15.6	2.3
西洋なし	2	0.297	1.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	1.0	0.1
メモリ	2	0.297	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む。)	2	0.297	1.0	0.1	0.6	0.1	3.8	0.6	0.8	0.1
もも(果皮及び種子を含む。)	5	1.25	17.0	4.3	18.5	4.6	26.5	6.6	22.0	5.5
ネクタリン	2	0.59	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
あんり(アノリコットを含む。)	2	0.59	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.8	0.2
すもも(ブルーンを含む。)	2	0.59	2.2	0.6	1.4	0.4	1.2	0.4	2.2	0.6
うめ	2	0.59	2.8	0.8	0.6	0.2	1.2	0.4	3.6	1.1
おうとう(チェリーを含む。)	2	0.825	0.8	0.3	1.4	0.6	0.2	0.1	0.6	0.2
いらご	0.7	0.169	3.8	0.9	5.5	1.3	3.6	0.9	4.1	1.0
ラズベリー	0.8	0.398	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
ブラックベリー	0.8	0.398	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
ブルーベリー	0.8	0.398	0.9	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	1.1	0.6
クランベリー	0.8	0.398	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
ハーグルベリー	0.8	0.398	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
その他のベリー類果実	0.8	0.398	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
ぶどう	3	0.98	26.1	8.5	24.6	8.0	60.6	19.8	27.0	8.8
かき	1	0.385	9.9	3.8	1.7	0.7	3.9	1.5	18.2	7.0
キウイ(果皮を含む。)	3	0.99	6.6	2.2	4.2	1.4	6.9	2.3	8.7	2.9
パパイヤ	0.5	0.135	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0

シペルメトリンの推定摂取量 (単位: µg/人/day)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) TMDI	国民全体 (1歳以上) EDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI
マンゴー	0.7	0.19	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
その他他の果実	2	0.495	2.4	0.6	0.8	0.2	1.8	0.4	5.4	0.8
ひまわりの種子	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ごまの種子	0.1	0.05	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
大豆ほなの種子	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
醸業	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
なたね	0.1	0.05	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2
その他のオイルシード	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ぎんなん	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
スツル	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヘーガン	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
くるみ	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のナッツ類	0.1	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	15	0.0371	99.0	0.2	15.0	0.0	55.5	0.1	141.0	0.3
コーン(豆)	0.05	0.049	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
その他のスマバクス	5	1.75	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	1.0	0.4
その他のハーブ	6	1.993	5.4	1.8	1.8	0.6	0.6	0.2	8.4	2.8
牛の筋肉及び脂肪	2	0.15	30.6	2.3	19.4	1.5	41.8	3.1	19.8	1.5
牛の肝臓	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
牛の腎臓	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
牛の食用部分	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の筋肉及び脂肪	2	0.15	84.0	6.3	66.8	5.0	86.4	6.5	61.2	4.6
豚の肝臓	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の腎臓	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の食用部分	0.05	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の陸棲哺乳類の肉類	2	0.15	0.8	0.1	0.2	0.0	0.8	0.1	0.8	0.1
乳	0.1	0.1	26.4	26.4	33.2	33.2	36.5	36.5	21.6	21.6
鶏の筋肉及び脂肪	0.1	0.032	1.9	0.6	1.4	0.4	2.0	0.6	1.4	0.4
鶏の肝臓	0.05	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の腎臓	0.05	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鶏の食用部分	0.05	0.019	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
その他の家きんの肉類	0.1	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
豚の卵	0.01	0.0038	0.4	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1
その他の家きんの卵	0.01	0.0038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05	0.023	0.5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.3
計			1050.8	304.3	636.8	210.7	1043.2	332.4	1172.9	321.7
ADI比 (%)			86.7	25.1	175.4	58.1	81.1	25.8	95.0	26.1

TMDI : 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

TMDI試算法 : 基準値案×各食品の平均摂取量

EDI : 推定1日摂取量 (Estimated Daily Intake)

EDI試算法 : 作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

● : 個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値(案)の数値を用いた。

国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてEDI試算をした。

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いてEDI試算をした。

牛、豚及び鶏の筋肉及び脂肪については、筋肉及び脂肪の摂取量に、TMDI試算では筋肉及び脂肪のうち高い方の基準値(案)を乗じ、EDI試算では高い方の平均的残留濃度を乗じて試算した。

その他の陸生哺乳類については、その他の陸生哺乳類の肉類の摂取量に、TMDI試算では各組織のうち高い方の基準値(案)を乗じ、EDI試算では高い方の平均的残留濃度を乗じて試算した。

シペルメトリンの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI ($\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重/day)	ESTI/ARfD (%)
米（玄米）	米	0.3	○ 0.083	0.5	1
小麦	小麦	2	○ 1.38	1.9	5
大麦	大麦	2	○ 1.38	1.2	3
麦茶		2	○ 1.38	1.1	3
とうもろこし	スイートコーン	0.3	○ 0.22	2.5	6
そば	そば	0.3	○ 0.035	0.0	0
大豆	大豆	0.05	○ 0.05	0.0	0
小豆類	いんげん	0.05	0.05	0.1	0
らっかせい	らっかせい	0.1	○ 0.05	0.1	0
ばれいしょ	ばれいしょ	0.02	0.02	0.2	1
さといも類（やつがしらを含む。）	さといも	0.01	○ 0.01	0.1	0
かんしょ	かんしょ	0.05	0.05	0.6	2
やまいも（長いもをいう。）	やまいも	0.01	0.01	0.1	0
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	だいこんの根	0.1	○ 0.06	0.7	2
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	だいこんの葉	5	5	41.3	100
かぶ類の根	かぶの根	0.01	○ 0.01	0.1	0
かぶ類の葉	かぶの葉	0.7	○ 0.52	1.4	4
はくさい	はくさい	1	○ 0.65	8.4	20
キャベツ	キャベツ	1	○ 0.65	6.2	20
ケール	ケール	6	○ 2.84	22.8	60
こまつな	こまつな	6	○ 2.84	12.0	30
きょうな	きょうな	5	5	16.7	40
チンゲンサイ	チンゲンサイ	5	5	37.1	90
カリフラワー	カリフラワー	1	○ 0.65	4.8	10
ブロッコリー	ブロッコリー	1	○ 0.65	3.9	10
その他のあぶらな科野菜	たかな	6	○ 2.84	22.3	60
	菜花	6	○ 2.84	7.8	20
ごぼう	ごぼう	0.3	0.3	1.5	4
しゅんぎく	しゅんぎく	0.7	○ 0.52	1.7	4
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	レタス類	2	○ 0.90	5.1	10
たまねぎ	たまねぎ	0.05	0.05	0.4	1
ねぎ（リーキを含む。）	ねぎ	4	○ 1.72	6.6	20
にら	にら	3	3	4.0	10
アスパラガス	アスパラガス	0.4	○ 0.20	0.4	1
わけぎ	わけぎ	1	1	2.0	5
その他のゆり科野菜	にんにくの芽	6	6	10.6	30
	らっきょう	6	6	6.4	20
にんじん	にんじん	0.1	○ 0.025	0.1	0
	にんじんジュース	0.1	○ 0.024	0.2	1
パセリ	パセリ（乾燥）	1	1	0.9	2
みつば	みつば	0.7	○ 0.52	0.4	1
その他のせり科野菜	せり	0.01	○ 0.01	0.0	0
トマト	トマト	0.7	0.7	7.7	20
ピーマン	ピーマン	2	2	5.1	10
なす	なす	0.5	0.5	3.2	8
その他のなす科野菜	とうがらし（生）	2	○ 0.69	1.1	3
	ししとう	2	○ 0.69	0.7	2
きゅうり（ガーキンを含む。）	きゅうり	0.3	0.3	1.9	5
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	かぼちゃ	0.2	0.2	2.0	5
	ズッキーニ	0.2	0.2	1.4	4
しろうり	しろうり	0.07	○ 0.05	0.4	1
すいか（果皮を含む。）	すいか	0.3	0.3	9.9	20
メロン類果実（果皮を含む。）	メロン	0.8	○ 0.364	6.2	20
その他のうり科野菜	とうがん	0.07	○ 0.05	0.9	2
	にがうり	0.07	○ 0.05	0.4	1
ほうれんそう	ほうれんそう	5	○ 2.32	11.2	30
オクラ	オクラ	0.5	○	0.0	0
しようが	しようが	0.2	○ 0.01	0.0	0
未成熟えんどう	未成熟えんどう（さや）	0.7	○ 0.45	0.7	2
	未成熟えんどう（豆）	0.7	○ 0.45	0.8	2
未成熟いんげん	未成熟いんげん	0.7	○ 0.45	0.9	2
えだまめ	えだまめ	2	2	5.1	10
その他の野菜（ずいき及びれんこんを除く。）	そら豆（生）	5	5	14.7	40
みかん（外果皮を含む。）	みかん	0.7	0.7	6.5	20
なつみかんの果実全体	なつみかん	2	2	24.9	60
レモン	レモン	2	○ 0.1	0.2	1
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	オレンジ	2	○ 0.1	0.9	2
	オレンジ果汁	2	○ 0.62	6.2	20
グレープフルーツ	グレープフルーツ	2	○ 0.1	1.7	4

シペルメトリンの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg 体重/day)	ESTI/ARfD (%)
その他のかんきつ類果実	きんかん ぽんかん ゆず すだち	2 2 2 2	○ 0.1 ○ 0.1 ○ 0.1 ○ 0.1	0.2 1.1 0.2 0.2	1 3 1 1
りんご	りんご りんご果汁	2 2	○ 0.490 ○ 0.297	7.0 3.1	20 8
日本なし	日本なし	2	○ 0.490	7.4	20
西洋なし	西洋なし	2	○ 0.490	6.9	20
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）	びわ	2	○ 0.490	3.5	9
もも（果皮及び種子を含む。）	もも	5	○ 0.3	4.1	10
すもも（ブルーンを含む。）	ブルーン	2	○ 0.94	5.5	10
うめ	うめ	2	○ 0.94	1.3	3
おうとう（チェリーを含む。）	おうとう	2	2	5.0	10
いちご	いちご	0.7	0.7	2.7	7
ブルーベリー	ブルーベリー	0.8	○ 0.515	0.7	2
ぶどう	ぶどう	3	○ 1.24	16.7	40
かき	かき	1	1	14.3	40
キウイ（果皮を含む。）	キウイ	3	○ 1.37	7.8	20
マンゴー	マンゴー	0.7	○ 0.35	4.7	10
その他の果実	いちじく	2	○ 0.79	6.1	20
ごまの種子	ごまの種子	0.1	○ 0.05	0.0	0
ぎんなん	ぎんなん	0.05	○ 0.05	0.0	0
くり	くり	0.05	○ 0.05	0.1	0
アーモンド	アーモンド	0.05	○ 0.05	0.0	0
くるみ	くるみ	0.05	○ 0.05	0.0	0
茶	緑茶類	15	○ 0.0371	0.0	0

ESTI：短期推定摂取量 (Estimated Short-Term Intake)

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてESTI試算をした。

レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフルーツ及びその他のかんきつ類果実については、みかんの作物残留試験成績より算出した可食部係数（0.0273）を乗じた値に基づく基準値相当の値を使用した。

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いて試算をした。

シペルメトリンの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

食品名 (基準値設定対象)	食品名 (ESTI推定対象)	基準値案 (ppm)	評価に用いた 数値 (ppm)	ESTI (μ g/kg 体重 /day)	ESTI/ARfD (%)
米 (玄米)	米	0.3	○ 0.083	0.9	2
小麦	小麦	2	○ 1.38	4.1	10
大麦	大麦	2	○ 1.38	1.0	3
	麦茶	2	○ 1.38	2.4	6
とうもろこし	スイートコーン	0.3	○ 0.22	5.3	10
大豆	大豆	0.05	○ 0.05	0.1	0
らっかせい	らっかせい	0.1	○ 0.05	0.1	0
ばれいしょ	ばれいしょ	0.02	○ 0.02	0.5	1
さといも類 (やつがしらを含む。)	さといも	0.01	○ 0.01	0.1	0
かんしょ	かんしょ	0.05	○ 0.05	1.3	3
やまいも (長いもをいう。)	やまいも	0.01	○ 0.01	0.1	0
だいこん類 (ラディッシュを含む。) の根	だいこんの根	0.1	○ 0.06	1.3	3
はくさい	はくさい	1	○ 0.65	10.2	30
キャベツ	キャベツ	1	○ 0.65	10.2	30
こまつな	こまつな	6	○ 2.84	25.2	60
ブロッコリー	ブロッコリー	1	○ 0.65	9.4	20
ごぼう	ごぼう	0.3	○ 0.3	1.9	5
レタス (サラダ菜及びちしゃを含む。)	レタス類	2	○ 0.9	8.8	20
たまねぎ	たまねぎ	0.05	○ 0.05	0.9	2
ねぎ (リーキを含む。)	ねぎ	4	○ 1.72	11.2	30
にら	にら	3	○ 3	6.3	20
にんじん	にんじん	0.1	○ 0.025	0.3	1
トマト	トマト	0.7	○ 0.7	19.0	50
ピーマン	ピーマン	2	○ 2	13.1	30
なす	なす	0.5	○ 0.5	7.8	20
きゅうり (ガーキンを含む。)	きゅうり	0.3	○ 0.3	4.4	10
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	かぼちゃ	0.2	○ 0.2	3.2	8
すいか (果皮を含む。)	すいか	0.3	○ 0.3	26.0	70
メロン類果実 (果皮を含む。)	メロン	0.8	○ 0.364	10.7	30
ほうれんそう	ほうれんそう	5	○ 2.32	26.0	70
オクラ	オクラ	0.5	○ 0.20	0.9	2
しょうが	しょうが	0.2	○ 0.01	0.0	0
未成熟えんどう	未成熟えんどう (さや)	0.7	○ 0.45	0.6	2
未成熟えんどう	未成熟えんどう (豆)	0.7	○ 0.45	0.8	2
未成熟いんげん	未成熟いんげん	0.7	○ 0.45	1.8	5
えだまめ	えだまめ	2	○ 2	5.6	10
その他の野菜 (ずいき及びれんこんを除く。)	もやし	5	○ 5	21.0	50
みかん (外果皮を含む。)	みかん	0.7	○ 0.7	19.2	50
オレンジ (ネーブルオレンジを含む。)	オレンジ	2	○ 0.1	2.7	7
	オレンジ果汁	2	○ 0.62	11.1	30
りんご	りんご	2	○ 0.49	15.7	40
	りんご果汁	2	○ 0.297	10.0	30
日本なし	日本なし	2	○ 0.49	14.1	40
もも (果皮及び種子を含む。)	もも	5	○ 0.3	12.7	30
うめ	うめ	2	○ 0.94	3.2	8
いちご	いちご	0.7	○ 0.7	7.6	20
ぶどう	ぶどう	3	○ 1.24	38.0	100
かき	かき	1	○ 1	20.9	50
ごまの種子	ごまの種子	0.1	○ 0.05	0.0	0
茶	緑茶類	15	○ 0.0371	0.0	0

ESTI : 短期推定摂取量 (Estimated Short-Term Intake)

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○ : 作物残留試験における最高残留濃度 (HR) 又は中央値 (STMR) を用いて短期摂取量を推計した。

国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてESTI試算をした。

オレンジ (ネーブルオレンジを含む。) については、みかんの作物残留試験成績より算出した可食部係数 (0.0273) を乗じた値を使用した。

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いて試算をした。

(参考)

これまでの経緯

昭和 61 年 10 月 28 日	初回農薬登録
平成 17 年 11 月 29 日	残留農薬基準告示
平成 25 年 12 月 6 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 28 年 9 月 9 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：はつかだいこん及びほうれんそう）
平成 29 年 1 月 24 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 29 年 11 月 10 日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイを除く））
平成 30 年 2 月 13 日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成 30 年 3 月 7 日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成 30 年 3 月 27 日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和 2 年 9 月 24 日	薬事・食品衛生審議会へ諮問
令和 3 年 3 月 11 日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

○梶山 浩	国立医薬品食品衛生研究所食品部長
石井 里枝	埼玉県衛生研究所副所長（兼）食品微生物検査室長
井之上 浩一	学校法人立命館立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室教授
大山 和俊	一般財団法人残留農薬研究所化学部長
折戸 謙介	学校法人麻布獸医学園理事（兼）麻布大学獸医学部生理学教授
加藤 くみ子	学校法人北里研究所北里大学薬学部生体分子解析学教室教授
魏 民	公立大学法人大阪大阪市立大学大学院医学研究科 環境リスク評価学准教授
佐藤 洋	国立大学法人岩手大学農学部共同獸医学科比較薬理毒性学研究室教授
佐野 元彦	国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授
須恵 雅之	学校法人東京農業大学応用生物科学部農芸化学科 生物有機化学研究室准教授
瀧本 秀美	国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長
中島 美紀	国立大学法人金沢大学ナノ生命科学研究所 薬物代謝安全性学研究室教授
永山 敏廣	学校法人明治薬科大学薬学部特任教授
根本 了	国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長
野田 隆志	一般社団法人日本植物防疫協会信頼性保証室付技術顧問
二村 瞳子	日本生活協同組合連合会組織推進本部長

(○：部会長)

答申（案）

シペルメトリン

今回基準値を設定するシペルメトリンとは、各異性体の和をいうこと。

食品名	残留基準値 ppm
米（玄米をいう。）	0.3
小麦	2
大麦	2
ライ麦	2
とうもろこし	0.3
そば	0.3
その他の穀類 ^{注1)}	2
大豆	0.05
小豆類 ^{注2)}	0.05
えんどう	0.05
そら豆	0.05
らっかせい	0.1
その他の豆類 ^{注3)}	0.05
ばれいしょ	0.02
さといも類（やつがしらを含む。）	0.01
かんしょ	0.05
やまいも（長いもをいう。）	0.01
こんにゃくいも	0.01
その他のいも類 ^{注4)}	0.01
てんさい	0.1
さとうきび	0.2
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.1
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	5
かぶ類の根	0.01
かぶ類の葉	0.7
西洋わさび	0.01
クレソン	0.7
はくさい	1
キャベツ	1
芽キャベツ	1
ケール	6
こまつな	6
きょうな	5
チングンサイ	5
カリフラワー	1
ブロッコリー	1
その他のあぶらな科野菜 ^{注5)}	6
ごぼう	0.3
サルシフィー	0.01

食品名	残留基準値 ppm
アーティチョーク	0.1
チコリ	0.7
エンダイブ	0.7
しゅんぎく	0.7
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）	2
その他のきく科野菜 ^{注6)}	5
たまねぎ	0.05
ねぎ（リーキを含む。）	4
にら	3
アスパラガス	0.4
わけぎ	1
その他のゆり科野菜 ^{注7)}	6
にんじん	0.1
パースニップ	0.01
パセリ	1
みつば	0.7
その他のせり科野菜 ^{注8)}	0.01
トマト	0.7
ピーマン	2
なす	0.5
その他のなす科野菜 ^{注9)}	2
きゅうり（ガーキンを含む。）	0.3
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	0.2
しろうり	0.07
すいか（果皮を含む。）	0.3
メロン類果実（果皮を含む。）	0.8
まくわうり（果皮を含む。）	0.07
その他のうり科野菜 ^{注10)}	0.07
ほうれんそう	5
オクラ	0.5
しょうが	0.2
未成熟えんどう	0.7
未成熟いんげん	0.7
えだまめ	2
その他の野菜（ずいき及びれんこんを除く。） ^{注11)}	5
みかん（外果皮を含む。）	0.7
なつみかんの果実全体	2
レモン	2
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	2
グレープフルーツ	2
ライム	2
その他のかんきつ類果実 ^{注12)}	2

食品名	残留基準値 ppm
りんご	2
日本なし	2
西洋なし	2
マルメロ	2
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）	2
もも（果皮及び種子を含む。）	5
ネクタリン	2
あんず（アプリコットを含む。）	2
すもも（ブルーンを含む。）	2
うめ	2
おうとう（チェリーを含む。）	2
いちご	0.7
ラズベリー	0.8
ブラックベリー	0.8
ブルーベリー	0.8
クランベリー	0.8
ハックルベリー	0.8
その他のベリー類果実 ^{注13)}	0.8
ぶどう	3
かき	1
キウイ（果皮を含む。）	3
パパイヤ	0.5
マンゴー	0.7
その他の果実 ^{注14)}	2
ひまわりの種子	0.1
ごまの種子	0.1
べにばなの種子	0.1
綿実	0.1
なたね	0.1
その他のオイルシード ^{注15)}	0.1
ぎんなん	0.05
くり	0.05
ペカン	0.05
アーモンド	0.05
くるみ	0.05
その他のナッツ類 ^{注16)}	0.1
茶	15
コーヒー豆	0.05
その他のスパイス ^{注17)}	5
その他のハーブ ^{注18)}	6
牛の筋肉	2
豚の筋肉	2

食品名	残留基準値 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物 ^{注19)} の筋肉	2
牛の脂肪	2
豚の脂肪	2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2
牛の肝臓	0.05
豚の肝臓	0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05
牛の腎臓	0.05
豚の腎臓	0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05
牛の食用部分 ^{注20)}	0.05
豚の食用部分	0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05
乳	0.1
鶏の筋肉	0.1
その他の家きん ^{注21)} の筋肉	0.1
鶏の脂肪	0.1
その他の家きんの脂肪	0.1
鶏の肝臓	0.05
その他の家きんの肝臓	0.05
鶏の腎臓	0.05
その他の家きんの腎臓	0.05
鶏の食用部分	0.05
その他の家きんの食用部分	0.05
鶏の卵	0.01
その他の家きんの卵	0.01
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05
小麦ふすま	5

- 注1) 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米（玄米をいう。）、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
- 注2) 「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
- 注3) 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
- 注4) 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類（やつがしらを含む。）、かんしょ、やまいも（長いもをいう。）及びこんにゃくいも以外のものをいう。
- 注5) 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類（ラディッシュを含む。）の根、だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
- 注6) 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）及びハーブ以外のものをいう。
- 注7) 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ（リーキを含む。）、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
- 注8) 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- 注9) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
- 注10) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ（スカッシュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
- 注11) 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- 注12) 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
- 注13) 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
- 注14) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず（アプリコットを含む。）、すもも（ブルーンを含む。）、うめ、おうとう（チェリーを含む。）、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
- 注15) 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
- 注16) 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
- 注17) 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
- 注18) 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
- 注19) 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

注20) 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

注21) 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。