


令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)

新型コロナワクチンの投与開始初期 の重点的調査 (コホート調査)

課題番号 20HA2013



健康観察日誌集計の中間報告 (4)



代表研究者

伊藤 澄信 順天堂大学医学部 臨床研究・治験センター、臨床薬理学 客員教授

分担研究者

楠 進 地域医療機能推進機構・本部・理事

土田 尚 国立病院機構本部総合研究センター 治験研究部長

金子 善博 労働者健康安全機構本部本部 研究ディレクター

飛田 護邦 順天堂大学革新的医療技術開発研究センター 先任准教授

研究事務局

順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床研究・治験センター

予防接種・ワクチン分科会副反応疑い検討部会&医薬品等安全対策部会安全対策調査会 2021/4/23



順天堂大学 コロナワクチン研究事務局

新型コロナウイルスワクチンの投与開始初期の 重点的調査（コホート調査）

リスクコミュニケーションの一環として治験と同様の方法で、1－2万人の安全性情報を収集し、厚労省の専門家会議を通じて、国民の皆様に本ワクチンの安全性情報を発信することを目的とする。免疫を惹起することに伴う発熱、倦怠感などの副反応疑いの情報を正確に把握し、医療機関の業務と両立したワクチン接種が遂行できるように情報発信する。

調査内容： SARS-CoV-2 ワクチン接種者の最終接種4週間までの安全性

- 体温、接種部位反応、全身反応（日誌）
- 主たる目的は副反応疑い、重篤なAE（因果関係問わず）
のコホート調査による頻度調査
- NHO、JCHO、JOHASの職員
- 2万人調査すると0.015%（6,700人に一人）発現する副反応疑いが95%の可能性で捕捉できる（1万人なら0.03%、3,350人に一人）。



ワクチン接種者を対象とする前向き観察研究

被接種者数の推移（累計）




2021年

* 4月8日に1例同意撤回のため
19,808例から1例減



先行接種 被接種者の人口統計学的特性

被接種者数 19,807例



治療中疾患	人数	(割合%)
高血圧	1,724	8.7%
脂質異常症	1000	5.0%
糖尿病	411	2.1%
気管支喘息	430	2.2%
アトピー性皮膚炎	568	2.9%
その他	2,589	13.1%
なし	14,532	73.4%

n=19,807

複数疾患をお持ちの方もいるため合計は100%ではありません


既往歴	人数	(割合%)
気管支喘息	1,940	9.8%
悪性腫瘍	411	2.1%
いずれもなし	17,491	88.3%

n=19,807



先行接種 被接種者の人口統計学的特性

2回目 被接種者数 19,579例 4月21日現在



治療中疾患		(割合%)
高血圧	1,711	8.7%
脂質異常症	993	4.7%
糖尿病	405	1.9%
気管支喘息	423	2.0%
アトピー性皮膚炎	559	2.7%
その他	2,551	12.1%
なし	14,371	68.4%

n=19,579


複数疾患をお持ちの方もいるため合計は100%ではありません

既往歴		(割合%)
気管支喘息	1,913	9.8%
悪性腫瘍	407	2.1%
いずれもなし	17,294	88.2%

n=19,579



発熱 (37.5°C以上)



局所反応（投与部位）のAEの重症度判断基準

Grade AE名	1（軽度）	2（中等度）	3（高度）	4（重篤、生命の危険がある）
疼痛	痛みを感じるが、特に気にならない。	痛みを感じて鎮痛剤を1回服用した。	痛みを感じて鎮痛剤を2回以上服用した。	重症又は持続性の潰瘍、又は壊死、又は手術を要する。
発赤	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
腫脹	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
硬結	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
痒み感	—	痒みを感じるが、薬剤治療を要さない。	痒みを感じ、薬剤治療を要する。	
熱感	—	熱を感じるが、薬剤治療を要さない。	熱を感じ、薬剤治療を要する。	

全身性反応のAEの重症度判定基準




Grade AE名	1（軽度）	2（中等度）	3（高度）	4（重篤、生命の危険がある）
頭痛	日常感じる頭痛より軽度の頭痛の増強 薬剤治療を要さない	中等度の頭痛 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難が生じる	高度の頭痛、日常生活に支障あり	活動不能／動作不能
倦怠感	日常感じる疲労より軽度の疲労の増強 薬剤治療を要さない	中等度の疲労 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難を生じる	高度の疲労、日常生活に支障あり	活動不能／動作不能
鼻汁	日常より鼻汁はあるが、薬剤治療を要さない	中等度の鼻汁 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難が生じる	高度の鼻汁、日常生活に支障あり	—

接種部位反応 ①

Data Cutoff Date 2021/4/21 8:00




1回目接種後

n=19,173(96.8%)



2回目接種後

n=17,376(87.7%)



■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度




■軽度 ■中等度 ■高度



接種部位反応 ②




1回目接種後

n=19,173(96.8%)



2回目接種後

n=17,376(87.7%)



■軽度 ■中等度 ■高度

■中等度 ■高度


■中等度 ■高度



全身反応


1回目接種後

頭痛




倦怠感


n=19,173(96.8%)



鼻水





2回目接種後



倦怠感

n=17,376(87.7%)





■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度




発熱 (37.5°C以上)




接種部位疼痛


1回目接種後 n=19,173(96.8%)





2回目接種後 n=17,376(87.7%)



全身倦怠感



頭痛



9日目以降の健康観察日誌記録

1回目接種後

被接種者数 16,011例

局所反応

	Day9	Day10	Day10 以降
発熱	0.12%	0.09%	0.09%
発赤	0.99%	0.91%	0.60%
腫脹	0.50%	0.45%	0.26%
硬結	0.67%	0.57%	0.35%
疼痛	0.44%	0.36%	0.19%
熱感	0.32%	0.28%	0.16%
かゆみ	0.75%	0.61%	0.00%

全身反応

	Day9	Day10	Day10 以降
頭痛	1.12%	0.81%	0.27%
倦怠感	0.82%	0.67%	0.69%
鼻水	1.29%	1.22%	0.69%

副反応疑い報告等一覧（コミナティ筋注）

PMDA報告症例

2021/4/22現在

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
副反応疑い1	SAE1/副反応疑い1	第3報	皮膚及び口腔内のアレルギー反応	不明	2021/2/19	-	2021/2/19	回復	2021/2/24
副反応疑い2	SAE3/副反応疑い2	第3報	脱力（手足があがらない）発熱	40代女性	2021/2/22	-	2021/2/22	回復	2021/2/24
副反応疑い3	SAE4/副反応疑い3	第1報	冷感・悪寒戦慄	40代女性	2021/2/19	-	2021/2/19	回復	2021/2/20
副反応疑い4	SAE5/副反応疑い4	第3報	突発性難聴	40代女性	2021/2/22	-	2021/3/2	軽快	2021/3/23
副反応疑い5	SAE6/副反応疑い6 ※因果関係否定のため取り下げ	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19	-	2021/2/25	軽快	2021/3/4
副反応疑い6	SAE10/副反応疑い6	第3報	左三叉神経障害	40代女性	2021/2/22	-	2021/2/23	回復	2021/4/12
副反応疑い7	SAE12/副反応疑い7	第1報	アナフィラキシー	40代女性	2021/2/17	2021/3/11	2021/3/11	回復	2021/3/12
副反応疑い8	SAE13/副反応疑い8	第3報	末梢性顔面神経麻痺 ※三叉神経障害から事象名変更	20代女性	2021/2/22	-	2021/3/9	軽快	2021/3/25
副反応疑い9	SAE14/副反応疑い9	第2報	浮動感、左眼瞼挙上困難、左眼違和感	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
副反応疑い10	SAE15/副反応疑い10	第2報	気分不良、動悸、視覚異常	40代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
副反応疑い11	SAE16/副反応疑い11	第2報	食欲不振	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/14	軽快	2021/3/18
副反応疑い12	SAE17/副反応疑い12	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19	-	2021/3/15	軽快	2021/3/24
副反応疑い13	副反応疑い13 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	蕁麻疹	50代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/3/15	軽快	2021/3/16
副反応疑い14	SAE19/副反応疑い14	第2報	急性冠症候群及び心筋炎疑い	20代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	軽快	2021/4/5
副反応疑い15	SAE21/副反応疑い15	第2報	右前庭神経炎	40代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/3/17	軽快	2021/3/23
副反応疑い16	SAE22/副反応疑い16	第3報	アナフィラキシー ショック	40代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/19
副反応疑い18	SAE25/副反応疑い18	第2報	アナフィラキシー	30代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/22
副反応疑い19	副反応疑い19 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	血管迷走神経反射	20代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/18	回復	2021/3/18
副反応疑い20	副反応疑い20 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	けいれん	40代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/19	回復	2021/3/19
副反応疑い21	副反応疑い21 ※非重篤のためSAE番号なし	第2報	蕁麻疹	20代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/20	回復	2021/4/2
副反応疑い22	SAE27/副反応疑い22	第5報	発熱の長期化／中毒疹 ※事象名追加	20代男性	2021/2/24	2021/3/20	2021/3/20	軽快	2021/4/16
副反応疑い23	SAE32/副反応疑い23	第2報	肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/4/2	軽快	2021/4/13

副反応疑い17は4月8日同意撤回のため削除

副反応疑い報告等一覧（コミナティ筋注）

SAE（因果関係問わず）

2021/4/22現在

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
SAE1	SAE1/副反応疑い1	第3報	皮膚及び口腔内のアレルギー反応	不明	2021/2/19	-	2021/2/19	回復	2021/2/24
SAE2	SAE2	第2報	一過性全健忘	60代女性	2021/2/19	-	2021/2/22	回復	2021/2/24
SAE3	SAE3/副反応疑い2	第3報	脱力（手足があがらない）発熱	40代女性	2021/2/22	-	2021/2/22	回復	2021/2/24
SAE4	SAE4/副反応疑い3	第1報	冷感・悪寒戦慄	40代女性	2021/2/19	-	2021/2/19	回復	2021/2/20
SAE5	SAE5/副反応疑い4	第3報	突発性難聴	40代女性	2021/2/22	-	2021/3/2	軽快	2021/3/23
SAE6	SAE6/副反応疑い5 ※因果関係なしに変更	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19	-	2021/2/25	軽快	2021/3/4
SAE7	SAE7	第2報	左尿管結石	40代男性	2021/2/22	-	2021/3/3	回復	2021/3/7
SAE8	SAE8	第2報	COVID-19	20代女性	2021/2/24	-	2021/3/2	軽快	2021/3/5
SAE9	SAE9	第2報	急性虫垂炎	30代女性	2021/2/22	-	2021/2/27	回復	2021/3/15
SAE10	SAE10/副反応疑い6	第3報	左三叉神経障害	40代女性	2021/2/22	-	2021/2/23	回復	2021/4/12
SAE11	SAE11	第1報	急性虫垂炎	40代女性	2021/2/20	-	2021/2/25	回復	2021/3/2
SAE12	SAE12/副反応疑い7	第1報	アナフィラキシー	40代女性	2021/2/17	2021/3/11	2021/3/11	回復	2021/3/12
SAE13	SAE13/副反応疑い8	第3報	末梢性顔面神経麻痺 ※三叉神経障害から事象名変更	20代女性	2021/2/22	-	2021/3/9	軽快	2021/3/25
SAE14	SAE14/副反応疑い9	第2報	浮動感，左眼瞼挙上困難，左眼違和感	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
SAE15	SAE15/副反応疑い10	第2報	気分不良，動悸，視覚異常	40代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
SAE16	SAE16/副反応疑い11	第2報	食欲不振	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/14	軽快	2021/3/18
SAE17	SAE17/副反応疑い12	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19	-	2021/3/15	回復	2021/3/24
SAE18	SAE18	第1報	労作性狭心症	50代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/2/25	回復	2021/3/15
SAE19	SAE19/副反応疑い14	第2報	急性冠症候群及び心筋炎疑い	20代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	軽快	2021/4/5
SAE20	SAE20	第2報	右鎖骨骨折	60代男性	2021/2/24	2021/3/15	2021/3/4	軽快	2021/3/19



副反応疑い報告等一覧（コミナティ筋注）

SAE（因果関係問わず）

2021/4/22現在

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
SAE21	SAE21/副反応疑い15	第2報	右前庭神経炎 ※前庭神経炎から事象名変更	40代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/3/17	軽快	2021/3/23
SAE22	SAE22/副反応疑い16	第3報	アナフィラキシー ショック	40代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/19
SAE24	SAE24	第2報	癒着性イレウス	50代女性	2021/2/20	-	2021/3/6	軽快	2021/3/25
SAE25	SAE25/副反応疑い18	第2報	アナフィラキシー	30代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/22
SAE26	SAE26	第2報	トキシックショック症 候群	30代女性	2021/2/25	-	2021/3/20	軽快	2021/3/27
SAE27	SAE27/副反応疑い22	第5報	発熱の長期化/中毒疹 ※事象名追加	20代男性	2021/2/24	2021/3/20	2021/3/20	軽快	2021/4/16
SAE28	SAE28	第2報	摂食障害	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/26	軽快	2021/4/15
SAE29	SAE29	第1報	S状結腸憩室炎	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	回復	2021/3/27
SAE30	SAE30	第2報	脳梗塞	60代男性	2021/2/22	2021/3/16	2021/3/23	軽快	2021/4/20
SAE31	SAE31	第3報	急性細菌性前立腺炎	50代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/4/2	回復	2021/4/19
SAE32	SAE32/副反応23	第2報	肺動脈血栓塞栓症、深 部静脈血栓症	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/4/2	軽快	2021/4/13

SAE23は4月8日同意撤回のため削除



健康観察日誌の自由記載欄の中間集計

1回目接種後（19,162名）			2回目接種後（16,907名）		
10028411/筋肉痛/Myalgia	412	2.15%	10008531/悪寒/Chills	1758	10.40%
10008531/悪寒/Chills	361	1.88%	10003239/関節痛/Arthralgia	1709	10.11%
10003239/関節痛/Arthralgia	272	1.42%	病休	1093	6.46%
10076183/ワクチン接種部位運動障害/Vaccination site movement impairment	245	1.28%	10028813/悪心/Nausea	629	3.72%
10028813/悪心/Nausea	231	1.21%	10028411/筋肉痛/Myalgia	559	3.31%
10012735/下痢/Diarrhoea	200	1.04%	10003988/背部痛/Back pain	364	2.15%
10061224/四肢不快感/Limb discomfort	193	1.01%	10037660/発熱/Pyrexia	313	1.85%
10068319/口腔咽頭痛/Oropharyngeal pain	166	0.87%	10012735/下痢/Diarrhoea	277	1.64%
10041349/傾眠/Somnolence	160	0.83%	10068319/口腔咽頭痛/Oropharyngeal pain	211	1.25%
10033371/疼痛/Pain	134	0.70%	10048750/腋窩痛/Axillary pain	207	1.22%
10013573/浮動性めまい/Dizziness	133	0.69%	10013573/浮動性めまい/Dizziness	189	1.12%
10068879/ワクチン接種部位疼痛/Vaccination site pain	121	0.63%	10033371/疼痛/Pain	161	0.95%
10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	119	0.62%	10011224/咳嗽/Cough	154	0.91%
10019211/頭痛/Headache	97	0.51%	10019211/頭痛/Headache	143	0.85%
10011224/咳嗽/Cough	95	0.50%	10061428/食欲減退/Decreased appetite	143	0.85%
10003988/背部痛/Back pain	84	0.44%	10025197/リンパ節症/Lymphadenopathy	120	0.71%
10037844/発疹/Rash	76	0.40%	10000081/腹痛/Abdominal pain	117	0.69%
10052904/筋骨格硬直/Musculoskeletal stiffness	74	0.39%	10047700/嘔吐/Vomiting	101	0.60%
10000081/腹痛/Abdominal pain	73	0.38%	10052904/筋骨格硬直/Musculoskeletal stiffness	100	0.59%
10016322/異常感/Feeling abnormal	72	0.38%	10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	97	0.57%
10069484/ワクチン接種部位内出血/Vaccination site bruising	72	0.38%	10041349/傾眠/Somnolence	95	0.56%
10033425/四肢痛/Pain in extremity	68	0.35%	10076183/ワクチン接種部位運動障害/Vaccination site movement impairment	93	0.55%
10016334/熱感/Feeling hot	59	0.31%	10000059/腹部不快感/Abdominal discomfort	85	0.50%
10068318/口腔咽頭不快感/Oropharyngeal discomfort	59	0.31%	10061224/四肢不快感/Limb discomfort	84	0.50%
10037087/そう痒症/Pruritus	57	0.30%	10033425/四肢痛/Pain in extremity	81	0.48%
10028372/筋力低下/Muscular weakness	53	0.28%	10025182/リンパ節痛/Lymph node pain	68	0.40%
病休	49	0.26%	10025482/倦怠感/Malaise	68	0.40%
10037660/発熱/Pyrexia	46	0.24%	10028836/頸部痛/Neck pain	66	0.39%
10000059/腹部不快感/Abdominal discomfort	45	0.23%	10016322/異常感/Feeling abnormal	64	0.38%
10046735/蕁麻疹/Urticaria	44	0.23%	10046735/蕁麻疹/Urticaria	56	0.33%

Press Release

平成 21 年 11 月 20 日
国立病院機構本部医療部研究課
課長:伊藤 澄信
電話: 03(5712)5075

報道関係者 各位

新型インフルエンザワクチンに関する
2 万人を対象とした安全性研究の中間報告について

【報告のポイント】

- 22, 112 名の医療関係者に新型インフルエンザ国産ワクチンを接種し安全性の検討を行った。現在、22, 002 例の解析データがまとまった。
- 新型インフルエンザワクチンの副反応報告基準に該当するものが90例あり、そのうち、重篤なものは、意識レベルの低下等6例であった。
- ワクチン接種後、局所反応、全身反応として、発赤、腫脹、疼痛、発熱、頭痛、倦怠感等があらわれた。
- 発赤、腫脹は接種当日あるいは翌日に始まるが、3 日後には消失することが多かった。また、発熱は当日か翌日にあらわれることが多かった。

新型インフルエンザワクチンに関する

2 万人を対象とした安全性研究の中間報告について

新型インフルエンザワクチンの接種開始に伴い、早期に安全性を確認することを目的として、「新型インフルエンザ A (H1N1) に対するインフルエンザ HA ワクチンの安全性の研究」(国立病院機構指定研究、主任研究者: 国立病院機構東京医療センター診療部長 岩田敏)において、国立病院機構 67 施設の計 22, 112 名の医療関係者に新型インフルエンザワクチンを接種し安全性の検討を行った。このうち、22, 002 名について集計を行ったので中間的な報告を行う。

1. 研究内容

対象者: 国立病院機構 67 施設の医療関係者計 22, 112 名

接種時期: 10 月 19~21 日

投与経路・投与量: 皮下 15µg (0.5mL) を 1 回接種

調査項目: 以下に該当する事項について集計を行い、安全性を評価

ワクチン接種当日から 14 日目までに認められた副反応、有害事

* 有害事象 (ワクチン接種との因果関係は問わず、接種後に起きた健康上

2. 結果の概要 (別添参照)

(1) 接種者の背景

性別: 男 25.6% 女 74.4%

年齢: 20-29 歳 34.3%

30-39 歳 25.5%

40-49 歳 21.5%

50-59 歳 16.7%

60 歳以上 1.9%

原疾患: 高血圧、脂質代謝異常、糖尿病などで;

気管支喘息を持っている接種者 (治療)

(2) 副反応の概要

○局所反応

2cm 以上の発赤 (赤くなること)

2cm 以上の腫脹 (はれ)

中等度以上の疼痛 (痛み止めを用いる程度の

* 発赤、腫脹の 96% は接種当日あるいは翌日に始まり

73% は 4 日以内に消失した。

○全身反応

発熱 (37.5℃以上) 3.1%

頭痛 14.1%

倦怠感 19.0%

鼻水 10.4%

* 発熱の 34% は発作当日か翌日に見られた。

関節痛、下痢、咳嗽、筋肉痛、悪心、嘔吐、口腔咽頭痛がみられた。

○新型インフルエンザワクチン副反応報告基準に該当する有害事象 90 名

重篤な有害事象

副反応報告基準に合致した報告症例

事象名	人数	報告基準	副反応報告名	人数
動悸 (胸性頻脈)	1	1	アナフィラキシー	1
肩下肢筋肉痛	1	7	38℃以上の発熱	39
嘔吐・吐気	1	10	肘を超える局所の異常腫脹	1
発熱・意識レベルの低下・嘔吐	1	11	じんましん	28
吐気・嘔吐	1	12	湿疹	2
末梢性めまい	1	16	全身倦怠感・咽頭痛・胸痛	1
		16	全身の発疹	1
※ 後遺障害に至る転帰のものはなかった		16	頭痛・食欲不振	1
※ 重篤: 入院又は入院相当の疾病		16	頭痛・下痢・嘔吐	1
		16	上下肢筋肉痛	1
(その他)		16	下痢	1
死亡 (交通事故による受傷)		16	喘息発作・発熱	1
		16	喘息発作・皮膚掻痒・頭痛	1
		16	倦怠感・腰痛・腹痛・下痢	1
		16	倦怠感・両上・下肢の脱力感	1
		16	頭痛	1
		16	咳	1

(3) その他の有害事象報告

局所反応ならびに定型的全身反応以外に 463 件 (因果関係が否定されたものも含む) が報告されたが、特に注意喚起を必要とするものは認められなかった。

3. 現時点での所見

接種 10 分後に発現したアナフィラキシーショック症例は緊急の治療を必要とした。

重篤な有害事象 (入院等) 6 件が報告されたが後遺障害に至る転帰のものはなかった。

10月19-21日接種を
11月20日に公開

【照会先】
国立病院機構本部医療部研究課
伊藤 澄信
電話: 03(5712)5075

海外試験とH1N1インフルエンザワクチンとの比較

	BNT162b2 mRNAワクチン 筋注		BNT162b2第Ⅲ相試験 (NEJM) 2020年 海外 18,860例		H1N1pdm インフルエンザワクチン 不活化ワクチン 皮下注
	コミナティ筋注	先行接種			H1N1インフルエンザ
	2021年 (NHO,JCHO,JOHAS) 途中経過				2009年 (NHO) 22,112例
	1回目	2回目	1回目	2回目	
発熱 (37.5℃以上)	3.3%	38.0%			発熱 (37.5℃以上) 3.1%
発熱 (38℃以上)	0.9%	21.2%	Fever (38.0℃以上) 4%	16%	
接種部位反応	92.9%	92.0%			接種部位反応 69.9%
発赤	14.0%	16.3%	Redness 5%	6%	発赤 60.1%
疼痛	92.3%	90.8%	Pain at injection site 83%	78%	疼痛 43.8%
腫脹	12.6%	14.2%	Swelling 6%	6%	腫脹 36.0%
硬結	10.7%	10.3%			
熱感	12.9%	18.9%			熱感 28.2%
かゆみ	8.0%	12.0%			かゆみ (中等度以上) 6.7%
全身症状	35.8%	76.1%			全身症状 26.7%
倦怠感	23.2%	69.4%	Fatigue 47%	59%	倦怠感 19.0%
頭痛	21.2%	53.6%	Headache 42%	52%	頭痛 14.1%
鼻水	10.3%	14.5%			鼻水 10.4%



まとめ

2021/4/22現在

- 2月14日に特例承認となった新型コロナワクチン「コミナティ筋注」を2月17日から先行接種対象者に接種開始した。
- 2月25日に被接種者登録が終了し、19,807例が1回目接種し、コホート調査に登録された。
- 被接種者は20代から50代がそれぞれ21-25%、60歳以上が8.7%、男性33.8%、女性66.2%、医師16.7%、看護師46.6%であった。2回目接種は19,579例が接種した。
- 接種後8日目以降に回収した1回目接種19,173例(全体の96.8%) および2回目接種17,376例(87.7%) の健康観察日誌から、1回目接種後の発熱(37.5℃以上)は3.3%であったが、2回目は38.0%と高率であった。発熱する場合は翌日が多く、接種3日目には解熱した。接種部位の疼痛は90%を超える被接種者が自覚し、接種翌日が最も頻度が高かった。接種3日後には軽快した。1回目に比べ、2回目接種では接種翌日に頭痛(5割)、全身倦怠感(7割)を自覚した。年齢および性別によって、副反応の発現頻度は異なり、若年者・女性が高かった。65歳以上(511例)では発熱9%、全身倦怠感38%、頭痛20%であったが、接種部位疼痛は80%であった。
- 健康観察日誌の自由記載副反応から、腋窩リンパ節腫大を含む反応性リンパ節腫脹が2%強にみられた。
- 研究班では2回目接種翌日の勤務は控えるように勧告をしていたが、それでも病休者は6.5%にみられた。
- 2009年のH1N1pdmインフルエンザワクチンNHO 2万人調査と比較すると、コミナティ筋注は接種部位の疼痛の頻度が明らかに高く、2回目接種後の37.5℃以上の発熱(4割)、頭痛(5割)、全身倦怠感(7割)を認めた。
- 2回目接種後も接種30分以内の副反応疑いを認めた。1回目、2回目接種合わせて、顔面神経麻痺を含む末梢神経障害など22例がPMDAに報告された。

