

新冠疫苗接種說明書

關於新冠疫苗

本疫苗已被列入針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的國家及地方政府的疫苗接種計畫，其接種費用由公共資金承擔，並對所有有接種意願的人免費接種，接種群體年齡在 12 歲及以上。

疫苗效果及接種方法

本疫苗由輝瑞公司製造，使接種者能預防感染新冠病毒。

研究結果發現：與尚未接種本疫苗的人相比，本疫苗接種者感染新冠病毒的幾率很低。(研究結果報告稱，本疫苗預防疾病發作的有效行為為 95%。)

產品名稱	復必泰 [®] (Comirnaty [®]) 肌肉注射
有效性及作用	預防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的感染性疾病
接種頻次及間隔時間	2 劑 (間隔 3 週) *肌肉注射
接種目標群體	12 歲及以上的年齡群體(本疫苗針對未滿 12 歲人士的有效性與安全性尚不明確。)
接種劑量	每劑 0.3 mL，共 2 劑

- 兩劑疫苗之間的接種間隔時間通常為三週。(如果您接種完第一劑後已超過三週，請儘快接種第二劑。)
- 如果您接種了本疫苗的第一劑，請確保第二劑接種同款疫苗。
- 研究結果表明：接種者在完成接種兩劑疫苗 7 天後，才可獲得充分的針對新冠病毒的免疫力，但目前本疫苗預防感染的有效性尚不確定。無論您是否接種本疫苗，您都需要採取適當的感染防範措施。

不適宜接種群體

下列群體不適宜接種本疫苗。如果您符合以下任一情況，請務必在接種前的問診中明確告知醫生。

- 明顯發熱症狀(*1)
- 身患嚴重急性病
- 對本疫苗的任一成分出現過嚴重過敏症狀(*2)
- 除上述明顯情況外其它不適宜接種的群體

(*1) 明顯發熱症狀通常指體溫高達或超過 37.5°C。但是即使體溫低於 37.5°C，這不一定適用於根據常規體溫被診斷為發熱的情況。

(*2) 過敏反應以及多種過敏症狀，包括全身性皮膚和黏膜症狀、出現喘氣、呼吸困難、心動過速或血壓過低症狀。

應該對疫苗接種持謹慎態度的群體

符合下列任一情況的，應對疫苗接種持謹慎態度。如果您遇到下列情況，請務必在接種前的問診中明確告知醫生。

- 正在進行抗凝血治療、患血小板減少症或凝血功能障礙症
- 曾被診斷為免疫缺陷、或近親患有先天性免疫缺陷
- 患有心臟、腎臟、肝臟或發育障礙等基礎疾病
- 曾接種過疫苗並在接種二天內出現發熱、全身皮疹等過敏症狀
- 曾出現過痙攣症狀
- 可能對疫苗成分過敏

(續背面)

如果您處於孕期或可能懷孕、或處於哺乳期，請務必在接種前的問診中明確告知醫生。

本疫苗產品含有未在其他疫苗中使用過的添加成分。如果您曾對藥物有過超敏或過敏反應，請務必在接種前的問診中明確告知醫生。

完成疫苗接種之後

- 完成疫苗接種後請您在接種點至少等待 15 分鐘(如果您曾出現過包括過敏休克在內的嚴重過敏反應，或出現噁心、頭暈等症狀，請至少等待 30 分鐘)。如果您接種疫苗後感到不適，請立即聯繫醫生。(便於醫務人員處理疫苗接種後的突發性副作用。)
- 疫苗接種部位需保持清潔乾淨。雖然疫苗接種當天淋浴身體並無大礙，但請不要揉擦接種部位。
- 請在疫苗接種當天避免劇烈運動。

不良反應

主要的不良反應症狀表現為：接種部位疼痛、頭疼、關節及肌肉疼痛、疲勞感、發冷以及發熱症狀。罕見的嚴重不良反應包括休克及過敏症。由於本疫苗屬於新型疫苗，有可能引起一些目前尚未發現或明確的症狀。如果您在疫苗接種後察覺到任何相關症狀，請聯繫接種醫師或您的家庭醫生。

關於疫苗引發的健康損害的保障機制

本疫苗接種可能會引起一些健康問題(例如疾病或殘疾)。儘管這屬於極端案例，但其潛在風險不容忽視，所以已建立起一套針對該風險的保障機制。

如果因接種新冠疫苗而引起健康損害，《預防接種法》同樣明文規定了相關保障措施(醫療費、傷殘撫恤金等)。相關保障的申請程序請諮詢您所在地區的地方政府。

關於新冠病毒的感染症狀

感染新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)後，患者會出現發熱、咳嗽等類似普通感冒的症狀。儘管多數輕症患者能被治癒，但仍有重症感染者會患有呼吸困難及嚴重肺炎症狀，嚴重者可能會致死。

本次被批准的新冠疫苗(輝瑞公司製)的特點

本疫苗屬於信使 RNA (mRNA) 疫苗。配方中的信使 RNA 會嵌入脂膜，它是新冠病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(病毒入侵人體細胞時所需的蛋白)的“藍圖”。當信使 RNA 通過疫苗接種進入人體後，病毒性刺突蛋白會按照信使 RNA 在人體細胞內生成，由此誘發對抗刺突蛋白的中和抗體和細胞免疫反應，後者能預防感染新冠病毒。

本疫苗包含以下成分：

活性成分	◇ Tozinameran (mRNA，編碼附著在人體細胞膜的全長刺突蛋白)
添加成分	◇ ALC-0315: [(4-羥丁基)氮雜二基(己烷-6,1-二基)雙(2-己基癸酸酯)]
	◇ ALC-0159: 2-[(聚乙二醇)-2000]-N,N-二十四烷基乙酰胺
	◇ DSPC: 1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼
	◇ 膽固醇
	◇ 氯化鉀
	◇ 磷酸二氫鉀
	◇ 氯化鈉
	◇ 磷酸氫二鈉二水合物
	◇ 蔗糖

更多關於新冠疫苗有效性及安全性的資訊，請閱覽“厚生勞動省”網站的“新冠病毒疫苗”頁面。

厚生勞動省
新型冠狀病毒疫苗

檢 索



如果您無法閱覽該網站，請聯繫您所在地的地方政府。