

إرشادات حول التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد

نبذة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد

يتم التطعيم بهذا اللقاح كجزء من مشروع التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) الذي تجريه الحكومة الوطنية والحكومات المحلية. يتم توفير هذا اللقاح على نفقة الدولة ويتم تطعيم الراغبين به مجاناً. هذا اللقاح مخصص للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 سنة فما فوق.

تأثير اللقاح وطريقة إعطائه

اللقاح المستخدم هذه المرة هو لقاح تاكيدا/مودرنا. وهو يمنع ظهور أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد. ولقد تبين بأن أعداد من يصابون بأعراض عدوى فيروس كورونا المستجد ممن تم تطعيمهم بهذا اللقاح أقل ممن لم يتم تطعيمهم. (يُذكر أن نسبة تأثير الوقاية من ظهور أعراض العدوى تبلغ حوالي 94%.)

لقاح مودرنا كوفيد - 19 للحقن العضلي®	الاسم التجاري
الوقاية من عدوى فيروس SARS-CoV-2	الفعالية والتأثير
جرعتان (بينهما 4 أسابيع عادةً) * حقن عضلي	عدد الجرعات والفواصل الزمني بينها
البالغون 12 عاماً فما فوق (لم تتضح بعدُ فعالية وسلامة اللقاح لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً).	الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم
0.5 ملي للجرعة الواحدة (2×)	مقدار الجرعة

- يتم التطعيم بالجرعة الثانية عادةً بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى. (إذا مر أكثر من 4 أسابيع بعد تلقي الجرعة الأولى، فيرجى تلقي الجرعة الثانية في أسرع وقتٍ ممكن.)
- إذا تلقيت الجرعة الأولى من هذا اللقاح، يكون من الضروري تلقي نفس اللقاح للجرعة الثانية أيضاً.
- أظهرت التجارب السريرية أن المناعة الكافية لا تتحقق إلا بعد 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح. كما أنه لا يمكن الوقاية من العدوى بشكل تام. يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة العدوى بغض النظر عن التطعيم.

الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم

لا يمكن تطعيم الأشخاص التالية بهذا اللقاح. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يعانون من حمى واضحة (*1)
- الأشخاص المصابون بأمراض حادة خطيرة
- الأشخاص الذين يعانون من سوابق فرط الحساسية الشديدة (*2) تجاه مكونات هذا اللقاح
- الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى بخلاف ما سبق تجعل تلقي اللقاح غير مناسب لهم
- (*1) الحمى الواضحة تشير عادةً إلى درجة حرارة 37.5°م أو أعلى. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك إذا تم تشخيص الحالة على أنها حمى بالمقارنة بدرجة حرارة الجسم الطبيعية، حتى لو كانت درجة الحرارة أقل من 37.5°م.
- (*2) الحساسية المفرطة أو الأعراض المتعددة التي تشير إليها مثل أعراض التهاب الجلد والأغشية المخاطية المختلفة أو الصفير عند التنفس أو ضيق النَّفَس أو تسارع ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم، إلى آخره.

الأشخاص الذين يتوجب عليهم الحذر عند التطعيم

على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الأمور التالية أن يتوخوا الحذر عند تلقي التطعيم. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية تنطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

- الأشخاص الذين يخضعون لعلاج مضاد لتخثر الدم، والأشخاص الذين يعانون من نقص صفيحات الدم أو الاعتلال الخثري
- الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، والأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من نقص المناعة الخلقي
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية أو مزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات الدم أو اضطرابات النمو
- الأشخاص الذين أدى تطعيمهم في الماضي إلى ظهور أعراض حساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي الشامل في غضون يومين من التطعيم
- الأشخاص الذين أصيبوا بتشنجات في الماضي
- الأشخاص الذين قد يعانون من حساسية تجاه مكونات هذا اللقاح

على الحوامل والنساء اللاتي يحتمل أن يكن حوامل والمرضعات الحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم. يحتوي هذا الدواء على مواد مضافة لم يسبق استخدامها في اللقاحات من قبل. على الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لحساسية مفرطة أو تحسس من الدواء في الماضي الحرص على إخبار الطبيب بذلك في الاستشارة السابقة للتطعيم.

(تابع على الوجه الخلفي)

الاحتياطات اللازمة بعد التطعيم

- بعد تلقي التطعيم بهذا اللقاح، يرجى الانتظار في مركز التطعيم لمدة 15 دقيقة (30 دقيقة للأشخاص الذين سبق لهم التعرض لأعراض حساسية شديدة بما فيها الحساسية المفرطة والأشخاص الذين سبق لهم الشعور بالتوكم أو الإصابة بالإغماء) وإعلام الطبيب على الفور عند الشعور بأي نوعك. (هذا الأمر يسمح بالاستجابة للأعراض الجانبية المفاجئة).
- حافظ على نظافة منطقة الحقن ولا تفركها إذا قمت بالاستحمام في يوم التطعيم.
- يمكنك متابعة حياتك بشكل طبيعي، ولكن يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

الأعراض الجانبية

- تشمل الأعراض الجانبية الرئيسية على ألم في موقع الحقن (*1) والصداع وآلام المفاصل والعضلات والإرهاق والقشعريرة والحمى وما إلى ذلك. تشمل الأعراض الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث على الصدمات وفرط الحساسية. ونظرًا لأن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فإنه من المحتمل ظهور أعراض لم يتم تأكيدها بعد. إذا لاحظت أية أعراض مقلقة بعد التطعيم، فيرجى استشارة الطبيب المسؤول عن التطعيم أو طبيب الأسرة.
- (*1) يشعر الكثير من الأشخاص بالألم في اليوم التالي وليس بعد التطعيم مباشرة. كما قد يحدث ألم وتورم بعد حوالي أسبوع أو أكثر من التطعيم.
- تم الإبلاغ عن الإصابة بالتهاب خفيف في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم في بعض الحالات النادرة (*2). إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- (*2) تكون أكثر شيوعًا بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة الأولى.

حول نظام إعانة الأضرار الصحية الناتجة عن التطعيم الوقائي

قد يتسبب التطعيم الوقائي في وقوع مشاكل صحية (الإصابة بمرض أو التعرض لإعاقة). تم تأسيس نظام الإعانة لأنه لا يمكن الحد من هذه المشاكل، على الرغم من شدة ندرة حدوثها. إذا تعرضت لأضرار صحية نتيجة التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد، فيمكنك تلقي المساعدة (كالنفقات الطبية ومعاش الإعاقة وإلى آخره) بناءً على قانون التطعيم الوقائي. فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة البلدية التي تضم شهادة إقامتك.

حول عدوى فيروس كورونا المستجد

الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2 تؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة لأعراض الزكام كالحمى والسعال. يشفى العديد من الناس بعد ظهور أعراض خفيفة فقط، ولكن زيادة شدة المرض تؤدي إلى تفاقم أعراض الالتهاب الرئوي كضيق التنفس كما قد تؤدي إلى الوفاة.

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح تاكيدا/مودرنا) الذي سيتم تطعيمك به هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح حمض نووي ربيبي مرسال (رنا مرسال) يضم غشاءً دهنيًا يحتوي على الرنا المرسال الذي يشكل البروتين الشوكي (البروتين الذي يحتاجه الفيروس ليغزو الخلايا البشرية) في فيروس SARS-CoV-2. عندما يدخل الرنا المرسال إلى الخلايا البشرية بعد التطعيم بهذا اللقاح، يتم إنتاج البروتين الشوكي الخاص بالفيروس داخل الخلايا استنادًا إلى الرنا المرسال ويتم تحفيز إنتاج الأجسام المضادة المعزلة والاستجابة المناعية الخلوية ضد البروتين الشوكي، وبهذا يعتبر بأنه يقي من الإصابة بعدوى فيروس SARS-CoV-2.

يحتوي هذا الدواء على المكونات التالية.

المكونات الفعالة	CX-024414 (الرنا المرسال الذي يقوم بترميز كامل البروتين الشوكي الذي يرتبط بأغشية الخلايا البشرية)
المواد المضافة	SM-102: هيببتايدكان-9-إيل-8-(2-هيدروكسيثيل) (6-أو إكس أو-6-أنديسيلوكسي) هيكسيل (أمينو) إستر أمينو أوكتانوت كوليسترول
	DSPC: 2.1-ديستيريول-سن-جليسرو-3-فوسفوكولين
	2.1-ديميرستويل-راك-جليسرو-3-ميثوكسي بولي إيثيلين جلايكول-2000 (PEG2000 DMG)
	تروميتامول
	هيدروكلوريد التروميتامول
	حمض الخليك
	أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات
	السكروز المنقى

لمزيد من المعلومات حول لقاح فيروس كورونا المستجد، يرجى زيارة موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية
لقاح كورونا

بحث



يرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوزارة.