

សេចក្តីណែនាំអំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា

- ជាគោលការណ៍ សូមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ40ឆ្នាំឡើង លើកលែងតែករណីចាំបាច់។
- ក្នុងករណីអ្នកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូរីដប្រភេទផ្សេងដោយសារមានប្រតិកម្មនឹងសារធាតុផ្សំដែលមានក្នុងវ៉ាក់សាំងនោះ ហើយអ្នកមានបំណងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្វែរម៉ានេះ អ្នកអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាន ទោះបីជាអ្នកមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំក៏ដោយ (មិនក្រោម១៨ឆ្នាំ)។
- ថ្លីត្បិតជាករណីកម្រ នៅបរទេសត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានការកើតឡើងនូវអាការៈមិនប្រក្រតីផ្នែកស្រទាប់ជុំវិញសរសៃប្រសាទ (demyelinating disorders) ដូចជាបង្កអោយមានការកកឈាម ថយចុះនូវប្លាកែត ប្រទះឃើញបន្ទះឈាមធ្លាក់ក្នុងស្បែក និងជំងឺប្រព័ន្ធភាពសុំនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាយប្រហារសរសៃប្រសាទនៅខាងក្រៅខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង(អាចបណ្តាលអោយពិការ)(Guillain-Barre syndrome) ជាដើម។ សូមស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ និងអត្រាប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងអោយបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំង។

អំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា

វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងតាមមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្ការមេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2)។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយថវិកាសាធារណៈ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនគិតថ្លៃឡើយ។

ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង និងវិធីសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងដែលចាក់លើកនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាហ្វែរម៉ា វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងបង្ការការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងកូរីដ 19។ គេបានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច មានអត្រាចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងនេះទាបជាងអ្នកដែលមិនបានចាក់។ (តាមរយៈការពិសោធន៍បានបង្ហាញថា វាមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការចេញរោគសញ្ញាបានប្រមាណ70%។)

ឈ្មោះវ៉ាក់សាំង	ថ្នាំចាក់សាច់ដុំ VAXZEVRIA®
ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព	ការបង្ការជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយវីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញាប់ និងចន្លោះពេលវេលានៃការចាក់ វ៉ាក់សាំង	2 ដង (ជាធម្មតា គម្លាត4-12សប្តាហ៍) *ការចាក់សាច់ដុំ
បុគ្គលដែលអាចចាក់ វ៉ាក់សាំងបាន	ជាគោលការណ៍ចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើង
បរិមាណវ៉ាក់សាំង	1 ដង 0.5 mL សរុប 2 ដង

- យោងតាមការ យោងតាមការអនុម័តរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោយការចាក់លើកទី1 ត្រូវទទួលបានការចាក់លើកទី2 ដោយទុកគម្លាត 4-12 សប្តាហ៍។ យ៉ាងណាមិញ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត អ្នកគួរទុកគម្លាតចាប់ពី8សប្តាហ៍ឡើងទើបជាការប្រសើរ។ ម្យ៉ាងទៀត ករណីលើស 12សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី 1 សូមទទួលបានការចាក់លើកទី2 ឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាច។
- ចំពោះអាយុដាច់ខាតដោយចាក់វ៉ាក់សាំង ដោយយោងតាមការអនុម័ត វាមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើង។ ប៉ុន្តែដោយពិចារណាតាមស្ថានភាពនៃការណែនាំអោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់បណ្តាលប្រទេសមួយចំនួន និងរបាយការណ៍ទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងគុណសម្បត្តិនៃវ៉ាក់សាំងតាមក្រុមអាយុ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាគោលការណ៍ត្រូវបានកំណត់យកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 40ឆ្នាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ។
- ករណីលើកទី1 អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ សូមប្រាកដថាអ្នកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នានេះនៅលើកទី2 ដែរ។
- តាមរយៈការពិសោធន៍បានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីប្រមាណ15ថ្ងៃក្រោយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2 ទើបវ៉ាក់សាំងចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធភាពសុំ។ ការបានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនមានន័យថាអាចជួយការពារការឆ្លងបានទាំងស្រុងនោះទេ។ ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងអោយបានត្រឹមត្រូវគឺជាវិធីចាំបាច់ទោះបីជាបាន ឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ។

បុគ្គលដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន

វ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមឡើយ។ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាលក្ខខណ្ឌណាមួយត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

- បុគ្គលដែលមានគ្រុនក្តៅ (*1)
 - បុគ្គលដែលមានជំងឺស្រួចស្រាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
 - បុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (*2) ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។
 - អ្នកដែលក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងSARS-CoV-2 ធ្លាប់កើតមានអាការៈកកឈាមនៃវីរុស ឬអាការៈដែលក្លាយជាមួយនូវអាការៈថយចុះប្លាកែត
 - អ្នកដែលមានប្រតិកម្មដ៏ធ្ងន់ capillary leak syndrome (បន្ទះឈាមធ្លាក់ក្នុងស្បែក)
 - បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដទៃក្រៅពីលក្ខខណ្ឌខាងលើដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ។
- (*1) គ្រុនក្តៅជាទូទៅមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 37.5 អង្សារសេ ឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែ លក្ខខណ្ឌនេះមិនសមស្របសម្រាប់ករណីដែលជំងឺនេះត្រូវបានរាយការណ៍ជាគ្រុនក្តៅដោយពិចារណាលើសីតុណ្ហភាពរាងកាយធម្មតាឡើយ ទោះបីជាវាមានសីតុណ្ហភាពទាបជាង 37.5 អង្សាក៏ដោយ។
- (*2) ជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះ និងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់នេះ រួមមានដូចជា រកស្បែក និងរោគសញ្ញាមានភ្លាសរអិល ពិបាកដកដង្ហើម ដង្ហើមខ្លី បេះដូងលោតញាប់ និងសម្ពាធឈាមខ្សោយ ជាដើម។

បុគ្គលដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

- បុគ្គលដែលកំពុងព្យាបាលការកកឈាម បុគ្គលដែលមានប្លាកែតថយចុះ ឬជំងឺកកឈាម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ពិនិត្យឃើញថាខ្លះភាពសុំ ឬបុគ្គលដែលមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធខ្លះភាពសុំពិក្រណីត។
- បុគ្គលដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនស្រាប់ដូចជា ជំងឺបេះដូង តម្រងនោម ថ្លើម ជំងឺឈាម ឬ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់ ជាដើម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមក ហើយកើតមានរោគសញ្ញាអាឡាក់ហ្ស៊ី ដូចជា គ្រុនក្តៅ ឬរមាស់ស្បែកនៅក្នុងអំឡុងពេល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់មានជំងឺប្រកាច់កាលពីមុន
- បុគ្គលដែលអាចនឹងអាឡាក់ហ្ស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។

(បន្តទៅខាងក្រោយ)

