

Instructions sur le vaccin contre le coronavirus (pour la dose de rappel (3^e dose))

Vaccin Pfizer
(janvier 2022)

À propos du vaccin contre le coronavirus

Ce vaccin fait partie du programme de vaccination contre le coronavirus (SRAS-CoV-2) des autorités nationales et locales. Ce vaccin est pris en charge par les fonds publics et est disponible gratuitement pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner. La dose de rappel (troisième dose) de ce vaccin s'adresse aux personnes de 18 ans et plus.

Effets du vaccin et mode d'administration

Le vaccin administré est fabriqué par le laboratoire Pfizer. Le vaccin prévient l'apparition du coronavirus.

Il a été constaté que le taux d'anticorps neutralisants un mois après la dose de rappel de ce vaccin est plusieurs fois supérieur à celui calculé un mois après la deuxième dose.

Nom de vente	Vaccin Comirnaty ^(R) à injecter par voie intramusculaire
Efficacité et effets	Prévention des maladies infectieuses causées par le SRAS-CoV-2
Fréquence et intervalle de vaccination	1 injection administrée (après un intervalle défini à la suite de l'inoculation de la deuxième dose) *Injection intramusculaire
Sujets cibles de l'inoculation	Personnes âgées de 18 ans et plus (l'efficacité et la sécurité de la dose de rappel chez les personnes de moins de 18 ans n'ont pas encore été déterminées.)
Posologie	0,3 ml par dose, 1 injection

- L'intervalle pour la dose de rappel en vertu de la Loi sur la vaccination varie en fonction des personnes pouvant la recevoir (actuellement entre 6 et 8 mois). Veuillez consulter la notice reçue des autorités locales de votre lieu de résidence.
- Ce vaccin peut être utilisé pour la dose de rappel, quel que soit le type de vaccin ayant servi à la première et à la deuxième doses.
- Même après avoir reçu une dose de rappel avec ce vaccin, il n'est pas possible de prévenir parfaitement les risques d'infection. Vous devez continuer à adopter des mesures appropriées de prévention des infections, que vous ayez été vacciné ou non.

Les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin

Ce vaccin ne peut pas être administré aux personnes concernées par les symptômes ci-dessous. Si vous pensez être concerné par l'un des éléments suivants, veuillez en parler avec le médecin lors de la consultation pré-vaccinale.

- Personnes ayant une fièvre évidente (*1)
 - Personnes souffrant d'une maladie aiguë grave
 - Personnes ayant des antécédents d'hypersensibilité sévère (*2) à l'un des composants du vaccin
 - Les personnes autres que celles décrites ci-dessus qui ont des conditions rendant inappropriée l'administration du vaccin
- (*1) Une fièvre évidente est généralement définie comme étant égale ou supérieure à 37,5°C. Toutefois, cela ne s'applique pas nécessairement aux cas où l'on juge qu'il s'agit d'une fièvre au vu de la température normale du corps, même si la température est inférieure à 37,5°C.
- (*2) Anaphylaxie et symptômes multiples évocateurs d'une anaphylaxie, notamment les symptômes généralisés au niveau de la peau et des muqueuses, respiration sifflante, dyspnée, tachycardie, et hypotension. Les personnes qui ont constaté ces symptômes après la première ou la deuxième vaccination ne peuvent pas recevoir une dose de rappel avec le même vaccin.

Les personnes qui doivent faire plus particulièrement attention au moment de se faire vacciner

Les personnes qui présentent l'une des affections suivantes doivent être prudentes quant à l'administration du vaccin. Si vous pensez être concerné, veuillez en parler avec le médecin lors de la consultation pré-vaccinale.

- Les personnes sous traitement anticoagulant, les personnes souffrant de thrombocytopénie ou de troubles de la coagulation,
- Les personnes ayant reçu un diagnostic d'immunodéficience dans le passé, ou les personnes ayant des parents proches atteints d'immunodéficience congénitale,
- Les personnes atteintes d'affections sous-jacentes telles que des troubles cardiaques, rénaux, hépatiques, sanguins ou du développement,
- Les personnes qui ont reçu des vaccins dans le passé et qui ont présenté des symptômes suggérant une allergie, comme de la fièvre ou une éruption cutanée généralisée dans les 2 jours suivant la vaccination,
- Les gens qui ont eu des convulsions dans le passé,
- Les personnes qui peuvent être allergiques aux composants de ce vaccin.

Si vous êtes enceinte ou si vous avez un doute, si vous allaitez, assurez-vous d'en informer le médecin lors de la consultation pré-vaccinale.

Ce produit contient un additif qui n'a jamais été utilisé dans un vaccin auparavant. Néanmoins, même si vous n'avez pas consulté votre obstétricien à ce propos, vous pouvez vous faire vacciner si le médecin responsable de la consultation pré-vaccinale a jugé que la vaccination était possible.

Si vous avez eu une hypersensibilité ou des réactions allergiques à des médicaments par le passé, assurez-vous d'en informer le médecin lors de la consultation pré-vaccinale.

(Suite au verso)

Que faire après avoir reçu le vaccin

- Après avoir reçu le vaccin, veuillez attendre au moins 15 minutes dans l'établissement où vous avez reçu le vaccin (au moins 30 minutes pour les personnes ayant déjà présenté des symptômes allergiques graves, y compris l'anaphylaxie par le passé, ou celles qui ont eu un malaise ou qui ont perdu connaissance, etc.), et si vous ne vous sentez pas bien, veuillez appeler immédiatement votre médecin. (Cela permettant de répondre à des effets secondaires soudains.)
- La zone où le vaccin a été injecté doit être maintenue propre. Bien que prendre un bain le jour-même de la vaccination ne pose pas de problème, veuillez à ne pas frotter la zone où le produit a été injecté.
- Veuillez vous abstenir de tout exercice physique intense le jour de l'administration du vaccin.

Effets secondaires

- Les principaux effets secondaires comprennent la douleur dans la zone injectée, les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires, la fatigue, les frissons et la fièvre. Les effets secondaires rares et graves comprennent un état de choc ou une anaphylaxie. Ce vaccin étant un nouveau type de vaccin, il est possible qu'il provoque des symptômes qui n'ont pas encore été détectés. Si vous remarquez des symptômes préoccupants après la vaccination, consultez le médecin qui vous a vacciné ou votre médecin traitant.
- Dans de rares cas, des cas de myocardite et de péricardite ont été rapportés après la première vaccination (première ou deuxième dose) (*). Si dans les jours suivant la vaccination vous présentez des symptômes tels que des douleurs thoraciques, des palpitations, des difficultés à respirer ou des gonflements, veuillez consulter un médecin au plus vite.
(* Ces cas semblent se manifester plus fréquemment après la seconde vaccination qu'après la première, avec une tendance plus prononcée chez les personnes jeunes, notamment chez les hommes.
- Lors de l'injection de la dose de rappel, c'est principalement un gonflement des glandes lymphatiques sous les aisselles qui est souvent signalé (environ 5 %) par rapport à la première et à la deuxième doses. Bien que les symptômes soient légers et qu'ils disparaissent en quelques jours, veuillez consulter un médecin s'ils s'aggravent ou persistent.

À propos du système d'aide en cas de préjudice lié à la vaccination

Les vaccinations peuvent entraîner des problèmes de santé (maladie ou invalidité). Bien que cela soit extrêmement rare, le risque ne peut pas être écarté, et un système d'aide a été mis en place pour cette raison.

Dans le cas de préjudices résultant de la vaccination contre le coronavirus, des indemnités (frais médicaux, prestations de pension d'invalidité, etc.) sont prévues en vertu de la Loi sur l'immunisation. Veuillez consulter la municipalité de votre lieu de résidence au sujet des procédures requises pour présenter une demande.

À propos de l'infection à coronavirus

Lorsqu'une infection causée par le SRAS-CoV-2 se développe, des symptômes semblables à ceux d'un rhume sont observés, comme la fièvre et la toux. Si de nombreuses personnes se remettent de la maladie avec des symptômes bénins, dans des cas graves, les symptômes de pneumonie, tels que des difficultés respiratoires, s'aggravent et peuvent entraîner le décès de la personne.

Caractéristiques du vaccin contre le coronavirus (vaccin fabriqué par Pfizer) présentement administré

Ce vaccin est un vaccin à ARN messenger (ARNm). Il s'agit d'une formulation dans laquelle l'ARNm, qui est le plan de construction de la protéine spike du SRAS-CoV-2 (une protéine nécessaire au virus pour pénétrer dans les cellules humaines), est enfermé dans une membrane lipidique. Lorsque l'ARNm est introduit dans les cellules humaines par inoculation du vaccin, les protéines virales spike sont produites dans les cellules sur la base de l'ARNm, et des anticorps neutralisants contre les protéines spike et des réponses immunitaires cellulaires sont induits, ce qui est censé prévenir les infections causées par le SRAS-CoV-2.

Ce médicament contient les composants suivants.

Composant actif	◇ Tozinameran (ARNm codant la protéine spike pleine longueur qui se lie à la membrane cellulaire humaine)
Additifs	◇ ALC-0315: bis (2-hexyldécanoate) de [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyle)
	◇ ALC-0159: 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N,N-ditétradécylacétamide
	◇ DSPC: 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine
	◇ Cholestérol
	◇ Chlorure de potassium
	◇ Phosphate de potassium monobasique
	◇ Chlorure de sodium
	◇ Sodium phosphate dibasic dihydrate
◇ Saccharose	

Pour plus d'informations sur les questions d'efficacité et de sécurité, veuillez consulter le site web du Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales

MHLW COVID-19 Vaccin

Recherche



Si vous ne parvenez pas à consulter le site web, veuillez contacter votre ville.