

**សេចក្តីណែនាំអំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩  
(ការចាក់ដូសមូលដ្ឋាន(ការចាក់លើកទី១ លើកទី២) )**

ជាគោលការណ៍ សូមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ40ឆ្នាំឡើង លើកលែងករណីចាំបាច់។

- ក្នុងករណីអ្នកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ប្រភេទផ្សេងទៀតដោយសារមានប្រតិកម្មនឹងសារធាតុផ្សំដែលមានក្នុងវ៉ាក់សាំងនោះ ហើយអ្នកមានបំណងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សែនីកានេះ អ្នកអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាន ទោះបីជាអ្នកមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំក៏ដោយ (មិនក្រោម១៨ឆ្នាំ)។
- ថ្វីត្បិតជាករណីកម្រ នៅបរទេសត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានការកើតឡើងនូវអាការៈមិនប្រក្រតិផ្នែកស្រទាប់ជុំវិញសរសៃប្រសាទ (demyelinating disorders) ដូចជាបង្កអោយមានការកកឈាម ថយចុះនូវប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ប្រទះឃើញបន្តិចបន្តួចឈាមឆ្មារក្នុងស្បែក និងជំងឺប្រព័ន្ធភាពស្តាំនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាយប្រហារសរសៃប្រសាទនៅខាងក្រៅខ្នងក្បាល និងខ្នងឆ្អឹងខ្នង(អាចបណ្តាលអោយពិការ)(Guillain-Barre syndrome) ជាដើម។ សូមស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំង។

**អំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩**

វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងតាមមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ (SARS-CoV-2)។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយថវិកាសាធារណៈ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនគិតថ្លៃឡើយ។

**ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង និងវិធីសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង**

វ៉ាក់សាំងដែលចាក់លើកនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាហ្សែនីកា។ វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងបង្ការការចេញរោគសញ្ញាណៃជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ គេបានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច មានអត្រាចេញរោគសញ្ញាណៃជំងឺឆ្លងនេះទាបជាងអ្នកដែលមិនបានចាក់។ (តាមរយៈការពិសោធន៍បានបង្ហាញថា វាមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការចេញរោគសញ្ញាបានប្រមាណ70%។)

ឈ្មោះវ៉ាក់សាំង	ថ្នាំចាក់សាច់ដុំ VAXZEVRIA™
ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព	ការបង្ការជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយវីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញាប់ និងចន្លោះពេលវេលានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង	2 ដង (ជាធម្មតា គម្លាត4-12សប្តាហ៍) *ការចាក់សាច់ដុំ
បុគ្គលដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន	ជាគោលការណ៍ចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើង
បរិមាណវ៉ាក់សាំង	1 ដង 0.5 mL សរុប 2 ដង

- យោងតាមការអនុម័តរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោយការចាក់លើកទី១ ត្រូវទទួលបានការចាក់លើកទី២ ដោយទុកគម្លាត 4-12 សប្តាហ៍។ យ៉ាងណាមិញ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត អ្នកគួរទុកគម្លាតចាប់ពី8សប្តាហ៍ឡើងទើបជាអាការៈប្រសើរ។ ម្យ៉ាងទៀត ករណីលើស 12សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី 1 សូមទទួលបានការចាក់លើកទី២ ឱ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ចំពោះអាយុជាគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង ដោយយោងតាមការអនុម័ត វាមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើង។ ប៉ុន្តែដោយពិចារណាតាមស្ថានភាពនៃការណែនាំអោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់បណ្តាលប្រទេសមួយចំនួន និងរបាយការណ៍ទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងគុណសម្បត្តិនៃវ៉ាក់សាំងតាមក្រុមអាយុ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាគោលការណ៍ត្រូវបានកំណត់យកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 40ឆ្នាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ។
- ករណីលើកទី 1 អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ជាគោលការណ៍សូមចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នានេះនៅលើកទី 2 ដែរ។
- តាមរយៈការពិសោធន៍បានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីប្រមាណ15ថ្ងៃក្រោយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២ ទើបវ៉ាក់សាំងចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធភាពស្តាំ។ ម្យ៉ាងទៀត ការបានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនមានន័យថាអាចជួយការពារការឆ្លងបានទាំងស្រុងនោះទេ។ ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងអោយបានត្រឹមត្រូវគឺជាវិធីដាច់ខាតនេះបើជាបាន ឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ។

**បុគ្គលដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន**

វ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមឡើយ។ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាលក្ខណៈមួយត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

- បុគ្គលដែលមានគ្រុនក្តៅ (\*1)
- បុគ្គលដែលមានជំងឺស្រួចស្រាវជ្រាវធ្ងន់ធ្ងរ
- បុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (\*2) ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។
- អ្នកដែលក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងSARS-CoV-2 ធ្លាប់កើតមានអាការៈកកឈាមនៃវីរុស ឬអាការៈដែលធ្លាប់មកជាមួយនូវអាការៈថយចុះប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
- អ្នកដែលមានប្រតិកម្មដ៏ធ្ងន់ capillary leak syndrome (បន្ទះឈាមឆ្មារក្នុងស្បែក)
- បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដទៃក្រៅពីលក្ខណៈខាងលើដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ។

(\*1) គ្រុនក្តៅជាទូទៅមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 37.5 អង្សាសេ ឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែ លក្ខណៈនេះមិនសមស្របសម្រាប់ករណីដែលជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញជាមុនដោយពិចារណាលើសីតុណ្ហភាពរាងកាយធម្មតាឡើយ ទោះបីជាវាជាការមានសីតុណ្ហភាពទាបជាង 37.5 អង្សាក៏ដោយ។

(\*2) ជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹង រោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ រួមមានដូចជា រលាកស្បែក និងរោគសញ្ញាមានគ្នាសរសៃ ពិបាកដកដង្ហើម ដង្ហើមខ្លី បេះដូងលោតញាប់ និងសម្ពាធឈាមខ្សោយ ជាដើម។

**បុគ្គលដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង**

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

- បុគ្គលដែលកំពុងព្យាបាលការកកឈាម បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ថយចុះ ឬជំងឺកកឈាម។
  - បុគ្គលដែលធ្លាប់ពិនិត្យឃើញថាខ្លះភាពស្តាំ ឬបុគ្គលដែលមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធខ្លះភាពស្តាំពិការភាព។
  - បុគ្គលដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនស្រាប់ដូចជា ជំងឺបេះដូង តម្រាបនោម ថ្លើម ជំងឺឈាម ឬ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់ ជាដើម។
  - បុគ្គលដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមក ហើយកើតមានរោគសញ្ញាអាឡាក់ស៊ី ដូចជា គ្រុនក្តៅ ឬរមាស់ស្បែកនៅក្នុងអំឡុងពេល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពី ការចាក់វ៉ាក់សាំង។
  - បុគ្គលដែលធ្លាប់មានជំងឺប្រកាច់កាលពីមុន
  - បុគ្គលដែលអាចនឹងអាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬអាចមានផ្ទៃពោះ ឬកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។
- វ៉ាក់សាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុបន្ថែមដែលមិនធ្លាប់មានប្រើនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងពីមុនៗមកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាឡាក់ស៊ី ជាមួយនឹងថ្នាំពីមុនមក សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

**សកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង**

- បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច សូមរង់ចាំនៅទីតាំងដែលអ្នកចាក់ថ្នាំនោះឱ្យបានយ៉ាងហោច 15 នាទី (យ៉ាងហោច 30 នាទីសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានរោគសញ្ញាអាឡាគីប៊ីជីដូន ដូចជាជំងឺប្រតិកម្មថ្នាំ ឬបុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឬសន្លប់ជាដើម) ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន សូមទាក់ទងទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ។ (ធ្វើបែបនេះអាចជួយឱ្យអ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងភ្លាមៗនោះ)
- កន្លែងដែលចាក់ថ្នាំគួរតែរក្សាឱ្យស្អាត។ ទោះបីជាអ្នកអាចដូតទឹកនៅថ្ងៃដែលចាក់ថ្នាំនោះបានក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនត្រូវដុសកន្លែងដែលចាក់ថ្នាំនោះដែរ។
- អ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពរស់នៅបានជាធម្មតា ប៉ុន្តែសូមជៀសវាងការហាត់ប្រាណខ្លាំងៗ និងពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជ្រុលជាដើម នៅថ្ងៃចាក់ថ្នាំរួច។

**ផលប៉ះពាល់**

- ផលប៉ះពាល់ ទូទៅមានដូចជា ការឈឺចាប់ត្រង់កន្លែងដែលបានចាក់ ឈឺក្បាល ឈឺសន្ទាក់ឬសាច់ដុំ ឆ្អឹង អស់កម្លាំង ស្រៀវស្រាញ់ ក្តៅខ្លួន ជាដើម។ នៅក្នុងការពិសោធន៍បានរកឃើញថា រោគសញ្ញាណាមួយនេះមានទំនោរលេចឡើងញឹកញាប់បន្ទាប់ពីការចាក់លើកទី១ ច្រើនជាងលើកទី២។ ម្យ៉ាងទៀត មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកម្រនឹងកើតឡើងមានដូចជា សម្ពាធឈាមចុះលឿនខ្លាំង ឬប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីកស៊ីជីដូន ដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មី ទើបថ្មីនេះអាចនឹងបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាដែលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ច្បាស់ រហូតមកដល់ពេលនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកកក់សម្គាល់ឃើញមានរោគសញ្ញាណាមួយបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់អ្នក។
- ថ្លីត្បិតជាករណីកម្រ នៅបរទេសត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមានការកើតឡើងនូវអាការៈមិនប្រក្រតីផ្នែកស្រទាប់ជុំវិញសរសៃប្រសាទ (demyelinating disorders) ដូចជាបង្កោយមានការកកឈាម ថយចុះនូវច្បាភ័ក្ត្រ(\*1) ប្រទះឃើញបន្ទះឈាមឆ្មារៗក្នុងស្បែក(\*2) និងជំងឺប្រព័ន្ធភាពស្តាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាងប្រហារសរសៃប្រសាទនៅខាងក្រៅខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង(\*3) បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ សូមទៅពិគ្រោះនៅស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់។  
 (\*1) អាការៈដូចជា ឈឺក្បាលខ្លាំងជាប់ ស្រវាំងភ្នែក ដង្ហើមខ្លី រង្វង់រង្វាន់ ញឹកញាប់កន្ត្រាក់ ឈឺទ្រូង ហើមឬឈឺដើង ឈឺពោះជាប់ ខ្លាំឈាម(ដា)នៅក្រៅពីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ។ល។ គួរបញ្ជាក់ថា ភាគច្រើននៃរោគសញ្ញានេះ ជាទូទៅកើតមានក្នុងរង្វង់28ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច និងកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលចាក់លើកទី១ ច្រើនជាងលើកទី២។  
 (\*2) រោគសញ្ញាដូចជា ហើមដៃដើង សម្ពាធឈាមទាប ។ល។  
 (\*3) ចុះខ្សោយក្នុងការធ្វើចលនាដូចជា ពិបាកក្នុងការធ្វើបញ្ជូនកម្លាំងមកដៃដើង ចុះខ្សោយផ្នែកវិញ្ញាណដូចជាស្លឹក បញ្ហាក្នុងការបន្ទោរបង់និង ចុះខ្សោយសុខភាពភ្នែកដូចជាស្រវាំងភ្នែក។

**អំពីប្រព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ការរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំង**

ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព (ជំងឺផ្សេងៗ ឬពិការភាព)។ ទោះបីជាករណីកម្រ ប៉ុន្តែក៏មិនអាចសន្មតថាគ្មានទាំងស្រុងបានឡើយ ហេតុនេះទើបប្រព័ន្ធជំនួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នៅក្នុងករណីដែលមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង ជំនួយ (ចំណាយលើការព្យាបាល ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផនពិការ ជាដើម) ក៏មានផ្តល់ជូនផងដែរនៅក្រោមច្បាប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។ សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងសាលាក្រុងរបស់អ្នកអំពីនីតិវិធីចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញបែបបទ។

**អំពីការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា**

នៅពេលដែលឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 អ្នកអាចនឹងមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺផ្តាសាយ ដូចជា គ្រុនក្តៅ និងក្អក ជាដើម។ ទោះបីជាមានមនុស្សជាច្រើនបានជួរស្រាលពីជំងឺនេះដោយមានរោគសញ្ញាតិចតួចក្តី នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន រោគសញ្ញាណាមួយ ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងទៀត ហើយ ថែមទាំងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀត។

**លក្ខណៈសម្គាល់របស់វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា (វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន) ដែលនឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើកនេះ**

ថ្នាំនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងវិយរលីវិចទ័រ(viral vector) ហើយជាថ្នាំដែលបញ្ចូលហ្សែនដែលបង្កើតជាជំនួយនូវលំដាប់គម្របនៃអាស៊ីតអាមីណូរបស់ប្រូតេអ៊ីនបន្លា(spike protein)(ប្រូតេអ៊ីនចាំបាច់របស់វីរុសដើម្បីជ្រៀតចូលក្នុងកោសិកាមនុស្ស) នៃវីរុសSARS-CoV-2 ទៅក្នុងស៊ីមៀនអាដេណូវីរុស(simian adenovirus) (ធ្វើឱ្យអាដេណូវីរុសដែលជាវីរុសផ្តាសាយ មិនអាចបង្កើនបរិមាណបាន) ។ នៅពេលប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកោសិកាបស់មនុស្សតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ប្រូតេអ៊ីនបន្លា(spike protein)របស់វីរុសនឹងត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងកោសិកាដោយផ្អែកតាមហ្សែននេះ ហើយតាមរយៈការដឹកនាំឱ្យបង្កើតអង់ទីកូរប្រឆាំងទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លា(spike protein)ព្រមទាំងឆ្លើយតបដោយប្រព័ន្ធភាពស្តាំកោសិកា គេជឿថានឹងអាចបង្ការជំងឺឆ្លងបង្កដោយវីរុសSARS-CoV-2បាន។

ថ្នាំនេះមានផ្សំឡើងពីគ្រឿងដូចខាងក្រោម៖

សារធាតុផ្សំសកម្ម	<ul style="list-style-type: none"> <li>វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណា(SARS-CoV-2) (វិយរលីវិចទ័រ(viral vector)នៃស៊ីមៀនអាដេណូវីរុស(simian adenovirus)ដែលត្រូវបានផ្តល់ប្រើប្រាស់)</li> <li>(សំគាល់៖ ស៊ីមៀនអាដេណូវីរុសដែលត្រូវបានបញ្ចូលហ្សែនដែលបង្កើតជាជំនួយនូវលំដាប់គម្របនៃអាស៊ីតអាមីណូរបស់ប្រូតេអ៊ីនបន្លា(spike protein)របស់វីរុសSARS-CoV-2)</li> </ul>
ធាតុផ្សំបន្ថែម	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-histidine</li> <li>ម៉ាញ៉េស្យូមក្លរួ</li> <li>អេតាណូលគ្លាតូនីក</li> <li>L-histidine hydrochloride monohydrate</li> <li>disodium edetate dihydrate</li> <li>polysorbate 80</li> <li>សូដ្យូមក្លរួ</li> <li>ស្ត្រូនីយ៉ូម</li> </ul>

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធជំនួយ និងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណា សូមចូលទៅកាន់ទំព័រវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណានៅលើវេបសាយប្រកបដោយសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។

ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា

ស្វែងរក

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបើកវេបសាយនោះបានទេ សូមទាក់ទងទៅកាន់សាលាក្រុងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។