

スパイクバックス筋注3回目接種後 抗スパイクタンパク質抗体価の推移




| | 接種前幾何平均抗体価 (U/mL) | 接種後幾何平均抗体価 (U/mL) | 幾何平均抗体価倍率 (倍) |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| スパイクバックス筋注 (95%信頼区間) | 457 (420 - 497) | 29,610 (27,676 - 31,678) | 64.8 (60.3 - 69.7) |

| 年齢階級 | スパイクバックス筋注筋注追加接種 | |
|------|------------------|-----|
| | 男 | 女 |
| 20 | 39 | 82 |
| 30 | 46 | 74 |
| 40 | 48 | 79 |
| 50 | 40 | 50 |
| 60以上 | 13 | 11 |
| 小計 | 186 | 296 |
| 合計 | 482 | |


抗N抗体が陰性の者482人を集計 (SPSS Ver.28)

| | 接種前幾何平均抗体価 (U/mL) | 接種後幾何平均抗体価 (U/mL) | 幾何平均抗体価倍率 (倍) |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 男 | 383 (335 - 438) | 31,401 (28,132 - 35,049) | 82.0 (73.8 - 91.0) |
| 女 | 510 (458 - 567) | 28,537 (26,190 - 31,094) | 56.0 (50.9 - 61.5) |


接種前抗S抗体価



接種28日後抗S抗体価



28日後幾何平均抗体価倍率



エラーバーは母平均の95%信頼区間を示す。各年齢階級の左は男性、右は女性