

إرشادات خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد

نبذة عن لقاح فيروس كورونا المستجد

يدخل هذا اللقاح في إطار برنامج الحكومات الوطنية والمحلية الخاص بمحاربة فيروس كورونا (السارس-كوفي-2)، بحيث تتكلف الصناديق العمومية بتمويل هذا اللقاح، وهو متاح مجاناً لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح به، خصوصاً الأشخاص البالغين من العمر 12 سنة فما فوق

الآثار الجانبية لهذا اللقاح وطريقة تدبيره

تم تصنيع هذا اللقاح من قبل شركة فايزر، وله دور هام في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت بعض الاكتشافات أن أشخاصاً قلناً يصابون بفيروس كورونا المستجد بعدما تم تلقيحهم بالمقارنة بنظرائهم الغير الملقحين (يمكن أن تصل الفعالية في الوقاية من المرض إلى 95 في المائة حسب التقارير).

اسم المنتج	كوميوناتى. الحقن العضلي
الفعالية والآثار الجانبية 2	الوقاية من الأمراض المعدية التي يتسبب فيها السارس-كوفي-2
تكرار التلقيح والفواصل الزمنية	مرتين (بفاصل زمني يبلغ ثلاثة أسابيع) *حقن عضلي
الفئات المستهدفة بالتلقيح	الأشخاص البالغين من العمر 12 سنة أو فما فوق (لم تتضح بعد الفعالية والسلامة لدى الأشخاص أقل من 16 سنة)
مقدار الجرعة	0.3 مل لكل جرعة بإجمالي جرعتين

- بعد تلقي التلقيح الأول، عادة ما يجرى التلقيح الثاني بعد 3 أسابيع (المرجو القيام بالتلقيح الثاني في أسرع وقت ممكن، عند مرور 3 أسابيع على التلقيح الأول)
- في حالة تلقيكم لهذا اللقاح في المرة الأولى، تأكدوا من تلقي نفس اللقاح في المرة الثانية
- يُعتقد أن الحصول على المناعة الكافية لا يتسنى إلا بعد مرور 7 أيام على تلقي الجرعة الثانية من التلقيح. كما أنه لا يمكن الوقاية من العدوى بشكل تام، ولهذا عليكم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم لا.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح

- يستثنى من التلقيح الأشخاص المشار إليهم أسفله، لذا يرجى التأكد من استشارة الطبيب إن كانت لديكم إحدى الحالات التالية قبل عملية التلقيح:
- أشخاص لديهم حمى واضحة (*1)
- أشخاص يعانون من أمراض حادة
- أشخاص لهم تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة تجاه أي عنصر مكون لهذا اللقاح (*2)
- أشخاص بحالات أخرى لم نتطرق إليها أعلاه، والتي تجعل تلقي هذا اللقاح غير مناسب

(*1) تُعرّف الحمى الواضحة بأنها 37.5 د أو أعلى. ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحالات التي يُحكم فيها على أنها حمى بالنسبة لدرجة حرارة الجسم العادية حتى ولو كانت تحت 37.5 درجة مئوية

(*2) الحساسية المفرطة والأعراض المشيرة إليها، بما في ذلك من أعراض التهاب الغشاء المخاطي، والصفير، وضيق التنفس، وانعدام انتظام دقات القلب، وضغط الدم المنخفض.

الأشخاص الذين عليهم توخي الحذر بشأن تلقي اللقاح

يجب على الأشخاص الذين لديهم أي من الحالات التالية توخي الحذر بشأن تلقي هذا اللقاح. إن كنت تعتقد أن إحدى الحالات تنطبق عليك، فتأكد من إطلاع الطبيب على حالتك أثناء استشارة ما قبل التلقيح

- أشخاص يخضعون للعلاج المضاد للتخثر، الأشخاص الذين يعانون من قلة الصفائح أو اضطرابات التخثر
- أشخاص تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، أو أشخاص لهم أقارب مصابين بنقص المناعة الخلقي
- أشخاص مصابون بأمراض رئوية أو مزمنة، مثل القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات دموية أو اضطرابات في النمو
- أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي المعمم في غضون يومين من تلقيهم لقاحات في الماضي
- أشخاص عانوا من تشنجات في الماضي
- أشخاص يحتمل أن تكون لديهم حساسية من مكونات هذا اللقاح

في حالة الحمل أو احتمالية الحمل أو الرضاعة، يرجى التأكد من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.

يحتوي هذا المنتج على مادة مضافة لم يسبق استخدامها من قبل في إنتاج اللقاحات. في حالة ظهور حساسية مفرطة أو كانت لديكم حساسية تجاه الأدوية في الماضي، تأكدوا من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.

ما يجب القيام به بعد تلقي التلقيح

- بعد التلقيح، يرجى الانتظار في نفس المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل (30 دقيقة على الأقل لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية الشديدة بما في ذلك الحساسية المفرطة في الماضي، أو أشخاص ظهر عليهم المرض، أو أصيبوا بالإغماء، إلخ.)، وفي حالة الإصابة بتوعك، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً. (هذا يفسح المجال أمام الاستجابة السريعة للأثار الجانبية المفاجئة)
- يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحقونة. بينما لا يشكل الاستحمام أي عائق في نفس يوم التلقيح، يرجى تفادي فرك أو حك المنطقة المحقونة
- يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الشاقة يوم إجراء التلقيح

الآثار الجانبية

- من الآثار الجانبية الرئيسية التي تظهر على متلقي اللقاح نجد: الألم في منطقة الحقن، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات، والإرهاق، والقشعريرة، والحمى. ومن الآثار الجانبية النادرة والخطيرة نجد كذلك الصدمة أو الحساسية المفرطة. بما أنّ هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فهناك احتمال ظهور أعراض لم يتم توضيحها حتى الآن. في حالة ملاحظة أي أعراض مقلقة بعد التلقيح، ينصح استشارة الطبيب الذي أجرى التلقيح، أو طبيب الأسرة
- تم الإبلاغ عن الإصابة بالتهاب خفيف في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم في بعض الحالات النادرة (*). إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور. (* تكون أكثر شيوعاً بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة الأولى.

معلومات حول نظام الإغاثة الخاص بالحالات المرضية الناجمة عن التلقيح

يمكن للتطعيمات أن تسبب مشاكل صحية (مرض أو إعاقة). رغم أن مثل هذه المشاكل الصحية نادرة للغاية، إلا أنه يستحيل وضع حدٍّ للمخاطر المصاحبة، ولهذا السبب قد تم إنشاء نظام إغاثة للتعاظم مع أي أمر طارئ في حالة حدوث أضرار صحية ناجمة عن لقاح فيروس كورونا، فالإعانة متاحة أيضاً بموجب قانون التحصين الخاص بالمناعة (وتشمل هذه الإعانة، النفقات الطبية، تعويضات معاش العجز، وما شابه). للاستفسار أكثر عن الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة بلدية مكان إقامتكم

معلومات حول عدوى فيروس كورونا المستجد

حين تتقدم عدوى ناجمة عن فيروس السارس-كوفي-2، تظهر أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، كالحمى والسعال. بينما يتعافى العديد من الأشخاص ذوي الأعراض الخفيفة من المرض، تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الأعراض الشديدة بظهور أعراض الالتهاب الرئوي، التي تتجلى في صعوبة التنفس، وقد تؤدي حتى إلى الوفاة

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح من صنع شركة فايزر) الذي سيستعمل هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح مرسل الحمض النووي الريبوزي أو "إم آر إن إيه mRNA"، وهو عبارة عن تركيبة يتم فيها تغليف الرنا المرسل في غشاء دهني، والرنا المرسل هو مخطط بروتين سبايك لفيروس السارس-كوفي-2 (وهو بروتين ضروري لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية). عندما يدخل الرنا المرسل في الخلايا البشرية من خلال التلقيح بهذا الدواء، يتم إنتاج بروتينات سبايك الفيروسية في الخلايا بناءً على الرنا المرسل، وبالتالي يتم تحفيز الأجسام المضادة ضد البروتينات الشوكية والاستجابات المناعية الخلوية، والتي يُعتقد أنها تمنع العدوى التي يسببها السارس-كوفي-2

يحتوي هذا الدواء على العناصر المكونة التالية

العنصر النشط المواد المضافة	توزيناميران (الرنا المرسل الذي يشفر الجسم الكامل لبروتين سبايك الذي يرتبط بغشاء الخلية البشرية)
	-أل-س-0315: [(هيدروكسي بيوتيل) أزيديل] مكرر (هكسان-6، 1-دييل) مكرر (2-هيكسيديكانوات) -أل-س-0159: [(بولي إيثيلين جلايكول) -2000] إن، ن-ديتراديسيل أسيتاميد -دي-إس-بي-سي: 1، 2-ديستارويل-إس-إن-جليسرول-3-فسفتيديل كولين -الكوليسترول -كلوريد البوتاسيوم -فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة -كلوريد الصوديوم -ثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة -السكروز

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرفاهية

وزارة الصحة والعمل والرفاهية لقاحات فيروس كورونا المستجد

Search



إذا كنت لا تستطيع تصفح الموقع، يرجى الاتصال بمقر بلديتك.