


コミナティ筋注3回目接種後 抗スパイクタンパク質抗体価の推移

新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）




	接種前幾何平均抗体価 (U/mL)	接種後幾何平均抗体価 (U/mL)	幾何平均抗体価倍率 (倍)
コミナティ筋注 (95%信頼区間)	386 (357-418)	19,771 (18,629-20,984)	51.2 (47.7-55.1)


コミナティ筋注追加接種		
年齢階級	男	女
20	22	45
30	48	70
40	50	83
50	56	58
60以上	38	17
小計	214	273
合計	487	

抗N抗体が陰性の者487人を集計 (SPSS Ver.28)			
	接種前幾何平均抗体価 (U/mL)	接種後幾何平均抗体価 (U/mL)	幾何平均抗体価倍率 (倍)
男	337 (298 - 382)	21,266 (19,321 - 23,407)	63.1 (55.7 - 71.4)
女	429 (388 - 474)	18,674 (17,328 - 20,124)	43.5 (40.2 - 47.2)


接種前抗S抗体価



接種28日後抗S抗体価



28日後幾何平均抗体価倍率



エラーバーは母平均の95%信頼区間を示す
各年齢階級の左は男性、右は女性

