

コミナティ筋注、スパイクバックス筋注3回目接種後 （スパイクバックス筋注初回接種後） 抗スパイクタンパク質抗体価の推移

年齢階層別

コミナティ筋注追加接種

	人数	接種前幾何平均抗体価 U/mL (95%信頼区間)	接種1か月後幾何平均抗体価 U/mL (95%信頼区間)	幾何抗体平均抗体価倍率 倍 (95%信頼区間)
30歳未満	11	1,684 (1,080 - 2,625)	18,615 (11,438 - 30,296)	11.1 (8.2 - 15.0)
30歳代	41	1,083 (924 - 1,269)	19,069 (15,909 - 22,856)	17.6 (13.7 - 22.7)
40歳代	72	842 (712 - 997)	18,683 (16,332 - 21,374)	22.2 (18.6 - 26.5)
50歳以上	43	1,054 (846 - 1,312)	20,398 (16,356 - 25,438)	19.4 (15.7 - 23.8)
全体	167	993 (895 - 1,103)	19,202 (17,470 - 21,106)	19.3 (17.3 - 21.7)

スパイクバックス筋注

	人数	接種前幾何平均抗体 U/mL (95%信頼区間)	接種1か月後幾何平均抗体 U/mL (95%信頼区間)	幾何抗体平均抗体価倍率 倍 (95%信頼区間)
30歳未満	9	1,304 (881 - 1,928)	21,713 (13,222 - 35,655)	16.7 (10.7 - 26.0)
30歳代	50	1,127 (931 - 1,363)	17,613 (15,181 - 20,435)	15.6 (12.6 - 19.3)
40歳代	77	1,058 (899 - 1,245)	17,897 (15,829 - 20,235)	16.9 (15.0 - 19.1)
50歳以上	44	718 (500 - 1,031)	15,948 (12,212 - 20,827)	22.2 (16.8 - 29.5)
全体	180	989 (873 - 1,122)	17,491 (15,923 - 19,213)	17.7 (15.9 - 19.7)

抗N抗体が陰性のコミナティ筋注167人、スパイクバックス筋注180人を集計
SPSS Ver.28