

第 81 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和 4 年度第 6 回薬事・ 食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料 1-2-3-6
2022(令和 4)年 7 月 8 日	

**医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく
製造販売業者からの副反応疑い報告状況について**
(コミナティ筋注、スパイクバックス筋注、バキスゼブリア筋注 ヌバキソビッド筋注 交互接種 基礎
疾患等及び症例経過)
(令和 3 年 2 月 17 日から令和 4 年 6 月 12 日報告分まで)

症例 No.	症状名 (PT 名)	基礎疾患等	症例経過
16251	心筋炎; 発熱; 胸痛	ワクチンの互換	<p>本報告は医薬品医療機器総合機構 (PMDA) を介して連絡可能な医師 (主治医) から入手した自発報告である。PMDA 受付番号: v21130827。</p> <p>19 歳の男性であった。</p> <p>2021/10/30 (ワクチン接種日)、患者は COVID - 19 免疫のため、2 回目の bnt162b2 (コミナティ、注射液、ロット番号: FK8562、使用期限: 2022/04/30、投与経路不明、解剖学的部位不明、2 回目 (最初のファイザー投与)、単回量) の接種を受けた (ワクチン接種時の年齢は 19 歳として報告された)。</p> <p>被疑ワクチン初回接種日前の 4 週間以内にその他のワクチン接種は受けていなかった。</p> <p>事象発現前の 2 週間以内にその他の併用薬は受けていなかった。</p> <p>病歴は持っていなかった (報告通り)。</p> <p>有害事象に関連する家族歴はなしであった。</p> <p>ワクチン歴は以下を含んだ:</p> <p>2021/09/26、患者は、COVID - 19 免疫のため、モデルナワクチン (モデルナ社製造) 1 回目の接種を受け、接種経路は不明であったが問題はなかった</p> <p>2014、インフルエンザ・ワクチン接種後に心筋炎となり、入院した。</p>

2021/10/31 (ワクチン接種翌日)、発熱と胸痛が発現した。

2021/11/01 (ワクチン接種 2 日後)、患者は病院に入院した。

2021/11/09 (ワクチン接種 10 日後)、事象の転帰は軽快であった。

事象の経過は、以下の通りだった：

2014、患者はインフルエンザ・ワクチンの接種後心筋炎を発現し、入院した。2021/09/26、モデルナ社製造の COVID - 19 ワクチンを接種し、問題はなかった。

2021/10/30、コミナティ注射剤の接種を受けた。

2021/10/31、発熱と胸痛を発現した。

2021/11/01、救急を受診した。心のう水は、心電図や心エコーで明らかでなかった。

2021/11/01、患者は心筋炎 (入院、医学的に重要) を発症、転帰「回復したが後遺症あり」(2021/11/11)。

追加報告時の臨床経過：

2021/11/01、時刻不明に心筋炎が発生した。

報告者は心筋炎を重篤 (入院) と分類し、入院期間は 11 日間であった。

2021/11/11、事象の転帰は回復したが後遺症あり、ロキソプロフェンとコルヒチンを含む新たな薬剤/その他の治療/処置を開始する必要があった。

有害事象は医師の診療所に来院する必要があった。

報告者は、事象と BNT162b2 との因果関係は、role in する検査がなかったため、評価不能と評価した。

心筋炎調査票の詳細は以下の通りである：

鑑別診断：

臨床症状/所見を説明可能なその他の疾患が否定できない。

危険因子または他の関連する病歴は以下の通りである：

心不全、または駆出率低値歴、いいえ、基礎疾患としての自己免疫疾患、いいえ。

心血管疾患歴および肥満、いいえ。

上記すべては治療の必要はなかった。

事象「心筋炎」は、医師の診療所受診および救急治療室受診時に評価された。

実施した臨床検査および処置は以下の通り：

血液クレアチンホスホキナーゼ：（日付不明）上昇なし、血液クレアチンホスホキナーゼ mb：（日付不明）上昇なし；コンピューター断層撮影：（2021/11/05）異常所見なし、c 反応性蛋白質：（2021/11/01）3.31mg / dl、注釈：上昇あり；生化学検査；心エコー図：（2021/11/02）異常所見あり、注釈：局所の壁運動異常および左心室中隔の mild hypokinesis；（2021/11/01）。駆出率：（2021/11/02）53%、心電図：（2021/11/01）心のう水は明らかでなかった、注釈：心のう水は心電図や心エコーで明らかでなかった；（2021/11/01）異常所見なし；磁気共鳴画像心臓：（2021/11/11）造影増強、異常所見なし、上昇あり；生化学検査；（2021/11）2408 ng/ml、注釈：2408 まで増加した；（2021/11）その後減少した。白血球数：（2021/11/01）11700、注釈：血液検査。

トロポニン I は、40.9 まで上昇した。

患者は入院した。

ロキソプロフェン（180mg/日）+コルヒチン（0.5mg/日）が開始された。

症状は軽快したが、トロポニン I は 2408 まで上昇し、その後減少した（2021/11）。

心筋炎の他のいかなる有意な要因も認められなかった。これらの所見から、コミナティの接種に伴う心筋炎の可能性が高いと推察された。

報告医師は、事象を重篤（入院：2021/11/01 から 2021/11/11 まで（予定））と分類した。報告医師は事象と bnt162b2 の因果関係を評価不能とした。

他の要因（他の疾患など）の可能性はなかった。

報告医師は、以下の通りにコメントした：

反応の詳細の報告のとおり。留意点は、インフルエンザ・ワクチンによる心筋炎の既往があるということ、そして、異なるワクチン接種を行ったということである；最初にモデルナ社製造のワクチン、その後ファイザー社のワクチン。

事象の転帰は、軽快であった。

再調査は完了した。これ以上の再調査は不要である。これ以上の追加情報は期待できない。

修正：本追加報告は、以前の情報を修正するために提出されている：

生物学的製品が被疑薬として選ばれた。BLA ライセンスがワクチンとして選ばれ、投与日は 2021/08/23 以後であった。被疑薬 MODERNA COVID-19 ワクチンが製品タブに追加、事象適応外使用が削除された。

修正：本追加報告は、保健当局に適切な報告を行うために提出されている：

心筋炎調査票（E2B 追加書類）を、日本保健当局へ提出するために添付した。

修正：本追加報告は、以前の情報を修正するために提出されている：

ワクチン歴、製品詳細および経過欄情報を修正した（日本 LPD に基づ

き、ワクチンの互換とされたので、併用被疑薬であるモデルナCOV
ID-19ワクチンはワクチン歴に変更され、それに応じて、経過欄
の対応する部分は編集された)。

追加情報(2022/02/09)：再調査は完了した。これ以上の情報は期待
できない。

追加情報(2022/03/30)：

本報告は、同連絡可能な医師、追加調査票の返答から入手した自発追
加報告である。更新された情報：

報告者の郵便番号を更新した。患者のイニシャルおよび人種を更新し
た；初回接種の注釈、関連する病歴「ワクチンの互換」を追加した、
臨床検査値トロポニンIの注釈、臨床検査を追加した(CK、CK-MB、冠
状動脈CT、CRP、心臓超音波検査、左心室駆出率、心臓MRI検査、
WBC)、発現日/時刻、終了日/時刻および事象転帰、医師の診療所受
診、事象心筋炎の入院中期間、事象「ワクチンの互換」は削除され、
併用療法はなしにチェックをした。

16441	<p>そう痒症；</p> <p>ほてり；</p> <p>アナフィラキシー反応；</p> <p>ショック；</p> <p>ワクチンの互換；</p> <p>上気道性喘鳴；</p> <p>体温上昇；</p> <p>動悸；</p> <p>呼吸困難；</p> <p>呼吸窮迫；</p> <p>喘鳴；</p> <p>潮紅；</p> <p>発熱；</p> <p>発疹；</p> <p>紅斑；</p> <p>腹痛；</p> <p>蕁麻疹；</p> <p>血圧低下；</p> <p>頻呼吸；</p> <p>頻脈</p>	<p>肥満細胞活性化症候群；</p> <p>薬物過敏症；</p> <p>食物アレルギー</p>	<p>本報告は、規制当局から入手した連絡可能な報告者（医師）からの自発報告である。受付番号：v21131074（PMDA）。</p> <p>2021/10/18 15:00、22歳9ヶ月の女性患者は、COVID-19免疫のためにBNT162b2（コミナティ、剤型：注射剤、ロット番号：FH3023、使用期限：2022/03/31、左肩の筋肉内、2回目、初回のファイザー製投与、22歳時）を接種した。</p> <p>2019年頃、継続中の薬剤アレルギーと食物アレルギーがあり、詳細は不明であった。</p> <p>家族歴は不明であった。</p> <p>また、患者はこれに関連する抗ヒスタミン薬を服用した。</p> <p>患者は、事象の報告前に、モデルナ製ワクチンを接種した。</p> <p>事象の報告前のPfizer-BioNTech COVID-19ワクチン以外に最近SARS-CoV2のワクチン接種を受け、詳細はモデルナ製ワクチンでアナフィラキシーを発現した（ファイザー製ワクチン接種前）。</p> <p>患者はPfizer-BioNTech COVID-19ワクチン接種の前後に他のワクチン接種を受けなかった。</p> <p>発現日付不明、継続中の肥満細胞活性化症候群（MCAS）があった。</p> <p>2021/10/18、ワクチン接種前の体温は、摂氏36.5度であった。</p> <p>4週間以内に他のワクチンを接種しなかった。</p> <p>2021/10/18 15:00（ワクチン接種日）、患者は、BNT162b2の2回目接種を受けた。</p> <p>今回、患者はクロスワクチン接種のため、ファイザー製ワクチンを選択したと報告された。</p> <p>2021/10/18（ワクチン接種日）、ワクチン接種の1時間後アナフィラキシーを発現した。</p> <p>救急治療室を来院した。</p>
-------	--	---	--

詳細な医学的経過は以下の通り：

アナフィラキシーを発現した患者は、コミナティの2回目接種を受けた患者であった。

1回目ワクチン接種に他の COVID-19 ワクチンを受けた人が2回目のワクチン接種にコミナティを接種したと言われた。

15:30、2回目のワクチン接種1時間後に（報告の通り）、患者はアナフィラキシーを発現した。頸部から胸部にかけての発疹、紅潮、発熱、動悸、呼吸苦、腹痛を認めた。ショックには至らなかった（報告の通り）。

報告医師は、事象を重篤（入院/入院期間の延長、入院期間4日、報告の通り）と分類し、事象を BNT162b2 と関連ありと評価した。他要因（他の疾患等）の可能性はなかった。

事象は新たな薬剤/その他の治療/処置の開始を必要とし、詳細は抗アレルギー剤、ステロイド投与であった。

事象の経過は以下の通り：

ワクチン接種およそ30分後より、頻脈、呼吸苦、軽度の喘鳴、皮フ紅潮、Itching など出現した。

ステロイド、抗アレルギー剤点滴投与するも、ある程度軽快はしたが、完全に消失せず、残存したため入院加療した。

前回のモデルナ製ワクチン接種直後および数時間後にもアナフィラキシーが見られたため、今回も同様の現象を生じる可能性を考慮し、同日（2021/10/18）、観察入院したと報告された。

2021/10/22（ワクチン接種の4日後）、退院した。

アナフィラキシーの分類評価（ブライトン分類）は以下の通り：

Major 基準：

皮膚/粘膜症状は、全身性蕁麻疹もしくは全身性紅斑、発疹を伴う全身性掻痒感を含んだ。

循環器系症状は、非代償性ショックの臨床診断（頻脈）を含んだ。

呼吸器系症状は、上気道性喘鳴、呼吸窮迫（頻呼吸）を含んだ。

Minor 基準：

消化器系症状は、腹痛を含んだ。

アナフィラキシーの症例定義は、突然発症、徴候及び症状の急速な進行、複数の器官系症状であり、レベル1を含んだ：

< 1 つ以上の (Major) 皮膚症状基準> AND < 1 つ以上の (Major) 循環器系症状基準 AND/OR 1 つ以上の (Major) 呼吸器系症状基準>。

アナフィラキシーのカテゴリーは、カテゴリー(1)レベル1であった。

有害事象の全ての徴候及び症状の詳細は以下の通り：

動悸、呼吸苦、皮フ紅潮、そうよう、体温上昇、腹痛。BP 80/50、SpO2 98%。

有害事象の時間的経過は以下の通り：

1、全身性紅斑：

頸部、前胸部、顔面中心にワクチン接種 30 分後から出現。約 5 時間。

2、頻脈：

約 30 分後 - 1 時間（報告の通り）。

3、喘鳴：

約 30 分後 - 30 分（報告の通り）。

医学的介入を必要とし、副腎皮質ステロイド、抗ヒスタミン薬、輸液を含んだ。

患者は呼吸器、皮膚/粘膜、消化器の多臓器障害を含んだ。

呼吸器について、以下の事象がはいとして報告された：

上気道性喘鳴、呼吸窮迫、頻呼吸。

詳細は、ステロイド、抗アレルギー剤点滴で改善した。

心血管系について、以下の事象がはいとして報告された：

ショック、頻脈。

詳細は、上記同様だった。

皮膚 / 粘膜について、以下の事象がはいとして報告された：

全身性蕁麻疹（蕁麻疹）、全身性紅斑、皮疹を伴う全身性そう痒症。

詳細は、ワクチン接種 30 分後 約 5 時間 であった。一旦消退後、翌日以降も一過性にありだった。

消化器について、以下の事象がはいとして報告された：腹痛。

詳細は、約 30 分後 1 時間で消失した。

その他の症状について、詳細は体温上昇であった。皮フ症状と同様だった。

2021/10/22（ワクチン接種 4 日後）、事象アナフィラキシーの転帰は回復であった。

2021/10/22、事象（アナフィラキシー反応、発疹、紅潮、発熱、動悸、呼吸苦、腹痛）の転帰は回復であった。

残りのすべての事象の転帰は不明であった。

追加情報（2021/11/04）：

同医薬情報担当者経由で連絡可能な同医師からの新規の追加報告。前報で報告した主要な報告者は、看護師から医師に修正された。

追加情報（2021/11/22）：

本報告は、再調査に応じた連絡可能な同医師から入手した自発的な追加報告である。

追加の新規情報は、以下を含む：

ワクチン接種時年齢、新規事象が追加された、事象の転帰および臨床経過が更新された。

本追加報告は再調査にもかかわらずロット/バッチ番号が利用可能でないことを通知するために提出されている。

再調査は完了し、詳しい情報は期待されない。

追加情報（2021/11/29）：本症例 202101506596 は 202101589901 と重複しており、情報を結合した追加報告である。現在および今後すべての追加情報は、202101506596 で報告される。

同医師から報告された新たな情報：臨床検査値（体温）が追加され、事象が更新され、新たな事象紅潮/発熱が追加され、入院の詳細が更新され、経過が更新された。入院期間が更新された。

再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

18827	<p>アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加;</p> <p>アラニンアミノトランスフェラーゼ増加;</p> <p>倦怠感;</p> <p>肝機能異常</p>	ワクチンの互換	<p>これは、規制当局からの連絡可能な報告者（医師）から入手した自発報告である。受付番号：v2210000031（PMDA）。</p> <p>2022/03/26 12:20、49歳の女性患者は、COVID-19免疫のためにbnt162b2（コミナティ、3回目（追加免疫）、ロット番号：FN2723、有効期限：2022/07/31、単回量）を接種した（49歳時）。</p> <p>関連する病歴と併用薬は、報告されなかった。</p> <p>ワクチン接種歴は以下を含んだ：モデルナ（1回目、ロット番号3002618、有効期限不明、製造販売業者：武田薬品工業株式会社、接種日：2021/07/19、COVID-19免疫のため）；モデルナ（2回目、ロット番号3004667、有効期限不明、製造販売業者：武田薬品工業株式会社、接種日：2021/08/18、COVID-19免疫のため）。</p> <p>以下の情報が報告された：</p> <p>2022/03/29 発現のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加（医学的に重要）、転帰「軽快」、「GOT 268」と記述された；</p> <p>2022/03/29 発現のアラニンアミノトランスフェラーゼ増加（医学的に重要）、転帰「軽快」、「GPT 273/101」と記述された；</p> <p>2022/03/29 発現の肝機能異常（医学的に重要）、転帰「軽快」、「肝機能障害」と記述された；</p> <p>2022/03/27 発現の倦怠感（非重篤）、転帰「軽快」、「全身倦怠感」と記述された。</p> <p>以下の検査と処置を受けた：アラニンアミノトランスフェラーゼ：（2022/03/29）273；（2022/04/01）101；アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ：（2022/03/29）268；（2022/04/01）34； - グルタミルトランスフェラーゼ：（2022/03/29）198。</p> <p>アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、肝機能異常、倦怠感により治療的な処置がとられた。</p> <p>臨床経過：</p>
-------	---	---------	---

2022/03/27 から、患者は全身倦怠感を発現した。

2022/03/29、治療のために病院を受診し、採血後、G O T（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）は 268、G P T（アラニンアミノトランスフェラーゼ）は 273、 γ -グルタミルトランスフェラーゼは 198 であった。治療のためにウルソデオキシコール(250) 3錠/日 1回 1錠を使用した。

2022/04/01、G O T（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）は 34、G P T（アラニンアミノトランスフェラーゼ）は 101 であった。

事象は軽快であった。

報告医師は、事象を非重篤と分類し、事象と BNT162b2 との因果関係は報告されなかった。

他の疾患等の他要因の可能性は提供されなかった。

これ以上の再調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。

18925	<p>ワクチン接種部位疼痛；</p> <p>ワクチン接種部位運動障害；</p> <p>不眠症；</p> <p>低比重リポ蛋白増加；</p> <p>疼痛；</p> <p>白血球数増加；</p> <p>血中コレステロール増加；</p> <p>血中ブドウ糖増加；</p> <p>関節痛；</p> <p>C - 反応性蛋白増加</p>	<p>ワクチンの互換；</p> <p>腱炎；</p> <p>閉経期症状</p>	<p>本報告は、医薬情報担当者および製品情報センターから入手した連絡可能な報告者（医師）からの自発報告である。</p> <p>2022/03/07 17:49、58歳の女性患者はCOVID-19免疫のためBNT162b2（コミナティ、3回目（追加免疫）、単回量、ロット番号：FK6302、使用期限：2022/04/30、58歳時、筋肉内、左上腕）の接種を受けた。</p> <p>関連する病歴は以下を含んだ：</p> <p>「石灰化腱炎」、発現日：2021/11（継続中か不明）、注釈：発現日：2021年11月下旬、2021年12月中旬には改善；</p> <p>「更年期障害」（継続中か不明）；</p> <p>「ワクチンの互換」（継続中か不明）。</p> <p>両肩の石灰化腱板炎のため整形外科への通院歴があった。</p> <p>ワクチン接種前、石灰化腱板炎の痛みは改善していた。</p> <p>併用薬は以下を含んだ：</p> <p>閉経期症状（継続中）のためのメノエイド経皮投与。</p> <p>（更年期障害のためワクチン接種の2週間以内にメノエイドコンピパッチの経皮投与を受けた。継続中であった。）</p> <p>ワクチン接種歴は以下を含んだ：</p> <p>COVID-19 ワクチン モデルナ（1回目単回量、投与経路：筋肉内、ロット番号：報告書作成時に入手不可/提供済み）、投与日付：2021/06/22、COVID-19免疫に対して、反応：「摂氏38.5度程度の発熱」；</p> <p>COVID-19 ワクチン モデルナ（2回目単回量、投与経路：筋肉内、ロット番号：報告書作成時に入手不可/提供済み）、投与日付：2021/07/20、COVID-19免疫に対して、反応：「発熱」。</p> <p>有害事象は製品の使用後に発現した。</p>
-------	---	---	--

患者はロキソニンを服用したが、2022/03/11 午前の時点（時間不明）で、痛みは改善しなかった。

以下の情報が報告された：

2022/03/07、ワクチン接種部位疼痛（非重篤）を発現、転帰「未回復」；

2022/03/07、ワクチン接種部位運動障害（非重篤）を発現、転帰「未回復」、「接種部位疼痛に伴う腕の上げにくさ」と記載された；

2022/03/07、疼痛（非重篤）、不眠症（非重篤）を発現、転帰「未回復」、すべて「眠れない程の痛み」と記載された；

2022/03/07 21:00、関節痛（医学的に重要）を発現、転帰「回復」、「左肩関節痛」と記載された；

2022/03/10、血中ブドウ糖増加（非重篤）を発現、転帰「不明」、「血糖：140mg/dL」と記載された；

2022/03/10、C - 反応性蛋白増加（非重篤）を発現、転帰「不明」、「CRP：5.29mg/dL」と記載された；

2022/03/10、低比重リポ蛋白増加（非重篤）を発現、転帰「不明」、を「LDL コレステロール：148mg/dL」と記載された；

2022/03/10、血中コレステロール増加（非重篤）を発現、転帰「不明」、「総コレステロール：267mg/dL」と記載された；

2022/03/10、白血球数増加（非重篤）を発現、転帰「不明」、「白血球：11900/uL」と記載された。

事象「左肩関節痛」は診療所来院を必要とした。

患者はロキソニンを服用したが、2022/03/10 時点でも眠れないほどの痛みは改善しなかった。

原疾患の訂正：両肩の石灰化腱板炎。

両肩の石灰化腱板炎は、両肩関節痛のため受診した整形外科で診断された。

痛みはロキソニンの内服でコントロールできた。

受診 1 ヶ月前くらいからはロキソニンでコントロールできた。

接種の際には痛みの程度は軽かった。左上腕にワクチンを接種した。
予防接種時には更年期障害に対しメノエイドコンピパッチ貼付を行っていた。

組織的または職業的にコロナウイルスへの曝露頻度が高いリスク（および重篤な COVID-19 の合併症リスク）に起因する追加免疫のための投与。

2021 年 11 月下旬、両肩石灰化腱板炎があり、肩関節周囲炎（両肩）ではなかった。

2021 年 12 月中旬、改善した。

関連する詳細：痛みは両肩というより両上腕にあった。

右側の痛みは左側より大きかった。

以下の検査と処置を受けた：

血中コレステロール（142-219）：（2022/03/10）267 mg/dl；

血中ブドウ糖（73-109）：（2022/03/10）140mg/dl；

体温：（日付不明）摂氏 38.5 度、注釈：モデルナワクチン 1 回目および 2 回目の後；

C - 反応性蛋白（正常高値 0.14）：（2022/03/10）5.29mg/dl；

低比重リポ蛋白（65-139）：（2022/03/10）148mg/dl；

白血球数（3300-8600）：（2022/03/10）、11900、注釈、単位：/uL。
関節痛、ワクチン接種部位疼痛、ワクチン接種部位運動障害、疼痛、不眠症の結果として治療的処置がとられた。

2022/03/07 21:00、左肩関節痛を発現した。

報告者は、診療所に来院が必要な事象であったと述べた。

事象の転帰は、左肩関節内ステロイド注射を含む治療により回復であった。

報告者は、事象を重篤（医学的に重要な事象）と分類し、事象とBNT162b2との因果関係を評価不能とした（理由：元々左肩関節石灰化腱板炎あり）。

bnt162b2のロット番号は提供されておらず、追跡調査において要請される。

追加情報（2022/04/08）：本報告は、再調査票に応じた連絡可能な同医師からの自発追加報告である。

最新情報に従って含まれる新たな情報：

更新された情報：

患者イニシャル、年齢、ワクチン接種時の年齢が更新された；ワクチン接種歴と関連する病歴が更新された；3回目の開始/中止時間が追加された。接種経路と解剖学的部位が更新された。ロット番号と使用期限が追加された；併用薬が追加された。事象「肩関節痛」が更新された。新たな事象が追加された。

再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

修正：本追加報告は、前回報告した情報を修正するために提出するものである：修正（DSU）：患者タブと経過欄からワクチン履歴の詳細 [COVID-19 ワクチン モデルナ/ COVID-19 免疫/ワクチンの互換] を削除する修正を行った。患者タブの関連する病歴としてワクチンの互換を追加し、経過を更新した。

18974	<p>ウイルス性心筋炎；</p> <p>口腔咽頭痛；</p> <p>心臓ペースメーカー挿入；</p> <p>心電図異常；</p> <p>意識消失；</p> <p>消化不良；</p> <p>発熱；</p> <p>腹部不快感</p>	ワクチンの互換	<p>本報告は連絡不能な報告者（消費者またはその他の非医療従事者）から入手した自発報告である。</p> <p>2022/02/27、37歳男性患者はBNT162b2（コミナティ、3回目[追加免疫]、単回量、ロット番号：FN2723、使用期限：2022/07/31）をCOVID-19免疫のために接種した。</p> <p>患者の併用薬は報告されなかった。</p> <p>ワクチン接種歴には以下が含まれた：モデルナ COVID-19 ワクチン（初回）、COVID-19 免疫のため。モデルナ COVID-19 ワクチン（2回目）、COVID-19 免疫のため。</p> <p>患者はウイルス性の急性心筋炎として診断された。</p> <p>事象の転帰は未回復であった。</p> <p>事象の経過は以下のとおりであった：</p> <p>2022/04/03 夜、患者は発熱を発現した。事象の転帰は未回復であった。</p> <p>2022/04/04 夜、患者は喉の痛みを発現した。事象の転帰は不明であった。</p> <p>2022/04/05、患者はクリニックに行って薬を処方された。</p> <p>その後も、胃の不快感や胸やけを発現した。事象の転帰は提供されなかった。</p> <p>2022/04/07 の16:00 ごろ、患者は意識を失うを発現した。手に持っていた携帯電話を落とした。</p> <p>18:30 ごろ、近くの病院へ救急搬送された。医師はワクチンをいつ接種したか尋ねた。報告者の夫は勘違いをしていて、3回目接種から1か月以上経つが2、3週間前に接種をしたと答えた。そのため、医師はそれに基づき副反応を疑った。心電図を取ったところ、乱れていた。患者はペースメーカーを入れるを発現し、19:00 ごろに大きい病院へ搬送された。大きい病院では、おそらくウイルス性の急性心筋炎ではないかと診断された。</p>
-------	--	---------	--

現在の状態は、心筋炎の中でも悪い状態にあり、集中治療室(CCU)にいた。熱は下がっていなかった。直近では摂氏 37.8 度くらいであった。

事象「発熱/熱摂氏 37.8 度くらい」および「喉の痛み」は診療所受診を必要とした。事象「ウイルス性の急性心筋炎」、「意識を失う」、「心電図の乱れ」、及び「ペースメーカーを入れる」は緊急治療室受診を必要とした。

患者は以下の臨床検査および処置を受けた：体温：（日付不明）摂氏 37.8 度。心電図：（2022/04/07）心電図の乱れ。

ウイルス性心筋炎、意識消失、発熱、口腔咽頭痛、腹部不快感、消化不良、心電図異常、心臓ペースメーカー挿入に対して治療処置がとられた。

これ以上の追跡調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。

修正(2022/04/20):この追加情報は前報で報告された情報を修正するために提出された:ワクチン接種歴の「製造販売業者不明」が削除された。(初回、製造販売業者不明)および(2回目、製造販売業者不明)の記載が、(初回)および(2回目)へ更新された。

<p>19038</p>	<p>失神; 意識消失</p>	<p>ワクチンの互換</p>	<p>本報告は、規制当局から入手した連絡可能な報告者（医師）からの自発報告である。当局受付番号：v2210000255（PMDA）。</p> <p>2022/04/08 14:30、40歳の女性患者は covid-19 免疫のため BNT162b2（コミナティ、3回目（追加免疫）、単回量、ロット番号：FN9605、使用期限：2022/08/31、40歳時）を接種した。</p> <p>患者に家族歴は無かった。ワクチンの予診票での注意点（基礎疾患、アレルギー、最近1ヵ月以内のワクチン接種や病気、服薬中の薬、過去の副作用歴、発育状況など）は無かった。</p> <p>併用薬は報告されなかった。</p> <p>ワクチン接種歴：Covid-19 ワクチン（初回、単回量、製造販売業者不明）COVID-19 免疫のため；モデルナ covid-19 ワクチン（2回目、単回量）COVID-19 免疫のため、反応：「発熱 38.5」。</p> <p>以下の情報が報告された：</p> <p>2022/04/09 15:00、意識消失（医学的に重要）が発現、転帰「回復」（2022/04/14）、「意識を失なった（5-10分）」と記述された。</p> <p>2022/04/09 15:00、失神（医学的に重要）が発現、転帰「回復」（2022/04/14）。</p> <p>以下の臨床検査および手段が実施された：</p> <p>体温：（2022/04/08）摂氏 36.3 度。</p> <p>失神および意識消失により、治療的処置は取られなかった。</p> <p>臨床経過：</p> <p>2022/04/08（金）、コロナワクチン接種した。</p> <p>2022/04/09（土）15:00、失神した。意識を失なった（5-10分）。</p> <p>自然に戻った。</p> <p>2022/04/14、患者本人電話して正常、神経症状なし。</p>
--------------	---------------------	----------------	--

			<p>報告医師は事象を非重篤（報告の通り）と分類し、事象と BNT162b2 との因果関係を評価不能と評価した。</p> <p>コロナワクチンとの関連不明であった。</p> <p>これ以上の追跡調査はできない。これ以上の情報は期待できない。</p> <p>修正：本追加報告は以前の情報を修正するために提出される。</p> <p>「患者に家族歴は無かった。ワクチンの予診票での注意点（基礎疾患、アレルギー、最近 1 ヶ月以内のワクチン接種や病気、服薬中の薬、過去の副作用歴、発育状況など）は無かった。」が経過欄情報に更新された。</p>
19148	<p>アナフィラキシー反応；</p> <p>口腔咽頭不快感；</p> <p>呼吸困難；</p> <p>振戦；</p> <p>頭痛</p>	<p>ゴム過敏症；</p> <p>ワクチンの互換；</p> <p>喘息；</p> <p>食物アレルギー</p>	<p>本報告は、連絡可能な報告者（薬剤師）から入手した自発報告である。</p> <p>2022/03/27 16:00（接種日）37 歳の女性患者（非妊娠）は、COVID-19 免疫のため、BNT162b2（コミナティ、ロット番号：不明、単回量、筋肉内）3 回目（追加免疫）の接種を受けた（37 歳時）。</p> <p>関連する病歴は以下を含んだ：</p> <p>「季節性気管支喘息」（継続中かどうか不明）；</p> <p>「メロン、パイナップルに対するアレルギー」（継続中かどうか不明）；</p> <p>「ラテックスに対するアレルギー」（継続中かどうか不明）。</p> <p>患者は併用薬の投与があった。</p> <p>ワクチン接種 2 週間以内に喘息のため吸入薬を投与した。</p> <p>他施設で接種したため、3 回目接種のロット番号は不明であった。</p>

COVID ワクチン接種前の 4 週間以内にその他のワクチン接種は受けていなかった。

ワクチン接種歴は以下を含んだ：

スパイクボックス（投与 1 回目、バッチ/ロット番号：不明、他施設で接種したため）、COVID-19 免疫のため；

スパイクボックス（投与 2 回目、バッチ/ロット番号：不明、他施設で接種したため）、COVID-19 免疫のため。

臨床経過：

当日 19:00（16:00 にワクチン接種後）から頭痛が発現し、カロナールを服用した。

19:30 喉の違和感と呼吸困難が発現した。

20:00 喘息の吸入薬を使用して呼吸困難は改善した。

20:00 上肢の震えが発現した。

20:00 所持していたエピペンを投与したが、ふるえと喉の違和感が持続したため救急要請をした。

2022/03/27 19:00 有害事象の発現時間と報告された。

本事象により入院となった。

患者は以下の検査と処置を受けた：

2022/03/27 SARS-CoV-2 検査：陰性（注釈：鼻咽頭スワブ）。

頭痛、口腔咽頭不快感、呼吸困難、振戦に対して医療的処置がとられた。

事象、頭痛、喉の違和感、呼吸困難、上肢の震えの転帰は、点滴治療で解消した（2022 年の不特定日）。

ワクチン接種前、患者は COVID-19 と診断されなかった。ワクチン接種以来、患者は COVID-19 の検査を受けていた。

			<p>2022/05/11 の追加報告において、アナフィラキシーと判断されたと報告があった。患者はアナフィラキシーを発現し、転帰は不特定日に解消された。他院にて接種しているため、これ以上の情報はない。</p> <p>追加調査は不可能である（ロット/バッチ番号の情報は入手不可能）。これ以上の追加情報は期待できない。</p> <p>追加情報（2022/05/11）：連絡可能な別の薬剤師から新情報を入手した（追跡調査の回答）。新情報は原資料に記載されたものである：新報告者、新事象「アナフィラキシー」の追加、臨床情報の更新をした。</p> <p>追加情報(2022/06/01)：</p> <p>再調査は完了した。</p> <p>これ以上の追加情報は期待できない。</p>
19216	幻聴	ワクチンの互換	<p>本報告は、連絡不可能な報告者（消費者またはその他非医療専門家）から入手した自発報告である。報告者は患者である。</p> <p>2022/04/21、47 歳女性患者（非妊娠）は COVID-19 免疫のために、BNT162b2（コミナティ、3 回目（追加免疫）、単回量、ロット番号：FT9319、使用期限：2022/09/30、47 歳時、左腕）を接種した。</p> <p>関連する病歴は以下を含んだ：</p> <p>ワクチン製品の交換（継続中かどうか不明）。</p> <p>併用薬の服用があった。</p> <p>COVID ワクチン接種前 4 週間以内に、その他のワクチンの接種を受けていなかった。</p>

ワクチン接種の2週間以内に鎮痛剤を服用していた。

ワクチン接種前に COVID-19 と診断されていなかった。

ワクチン接種以降、患者は COVID-19 の検査を受けていなかった。

ワクチン接種歴は以下が含まれた：

モデルナ（投与回数：2回目、バッチ/ロット番号：3003658、COVID-19 免疫のため）；

モデルナ（投与回数：1回目、バッチ/ロット番号：3004496、COVID-19 免疫のため）。

臨床経過：

2022/04/22 03:00（ワクチン接種1日後）、幻聴が発現した。

不明日、事象の転帰は不明であった。

報告者は事象を非重篤に分類した。

患者は治療を受けなかった。

追加調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。

19360	<p>アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加;</p> <p>アラニンアミノトランスフェラーゼ増加;</p> <p>四肢痛;</p> <p>横紋筋融解症;</p> <p>歩行障害;</p> <p>発熱;</p> <p>筋肉痛;</p> <p>血中クレアチンホスホキナーゼ増加</p>	<p>ワクチンの互換;</p> <p>甲状腺癌</p>	<p>本報告は、連絡可能な報告者（薬剤師）から入手した自発報告である。</p> <p>2022/04/25、29歳の女性患者（非妊娠）は、COVID-19免疫のためにBNT162b2（コミナティ、バッチ/ロット番号：不明、単回量）の3回目（追加免疫）の接種をした（接種時29歳）。</p> <p>関連する病歴は下記を含んだ：</p> <p>「甲状腺癌術後」（継続の有無不明）；「ワクチン製品の相互作用」（継続の有無不明）。</p> <p>併用薬は下記を含んだ：：</p> <p>アルファカルシドール；チラーヂンS；フェロミア；セルトラリン；モサプリドクエン酸塩錠。</p> <p>ワクチン接種歴は下記を含んだ：</p> <p>スパイクボックス（投与回数：2、バッチ/ロット番号：不明、詳細の特定または判読不能、COVID-19免疫のため）；スパイクボックス（投与回数：1、バッチ/ロット番号：不明、詳細の特定または判読不能、COVID-19免疫のため）。</p> <p>下記情報が報告された：</p> <p>発熱（非重篤）は、2022/04/26に発現し、転帰は「不明」、「摂氏37.9度の発熱」と記載された。</p> <p>筋肉痛（非重篤）は、2022/04/27に発現し、転帰は「不明」、「下肢の筋肉痛」と記載された。</p> <p>アラニンアミノトランスフェラーゼ増加（重篤）は、2022/05/02に発現し、転帰は「不明」、「ALT149」と記載された。</p> <p>アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加（重篤）は、2022/05/02に発現し、転帰は「不明」、「AST707」と記載された。</p> <p>血中クレアチンホスホキナーゼ増加（重篤）は、2022/05/02に発現し、転帰は「不明」、「CPK2000以上」と記載された。</p>
-------	---	-----------------------------	---

四肢痛（非重篤）は、2022/05/02 に発現し、転帰は「不明」、「下肢の痛み」と記載された。

横紋筋融解症（重篤）は、2022/05/02 に発現し、転帰は「不明」であった。

歩行障害（非重篤）は、2022/05/02 に発現し、転帰は「不明」、「歩きにくさがある」と記載された。

事象「横紋筋融解症」、「摂氏 37.9 度の発熱」、「下肢の筋肉痛」、「下肢の痛み」、「歩きにくさがある」、「CPK2000 以上」、「AST707」および「ALT149」は医師の診療所受診を要した。

患者は下記の臨床検査および処置を受けた：

アラニンアミノトランスフェラーゼ：（2022/05/02）149；アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ：（2022/05/02）707；クレアチン・ホスホキナーゼ：（2022/05/02）2000 以上；体温：（2022/04/26）摂氏 37.9 度；C 反応性蛋白：（2022/05/02）0.5。

横紋筋融解症、発熱、筋肉痛、四肢痛、歩行障害、血中クレアチンホスホキナーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加のため、治療的処置が取られた。

臨床経過：2022/04/25、3 回目接種（ロット番号：不明、理由：詳細の特定または判読不能）を受けた。

事象の発現日は、2022/04/26 と報告された。

報告者は、事象のため医師またはその他医療専門家の診療所/クリニックを受診したと述べた。

事象の転帰は不明であり、有害事象に対して受けた治療は点滴療法であった。

2022/04/26、摂氏 37.9 度の発熱が発現した。

2022/04/27、下肢の筋肉痛が発現した。

2022/05/02、下肢の痛み、歩きにくさがあるが発現した。

特に筋肉への負荷はなかった。

関節痛があった。

病院にて採血を行った：CRP0.5、AST707、ALT149、CPK2000 以上。

横紋筋融解症はコミナティにより引き起こされたと考えた。

COVID ワクチン以前の 4 週間以内に他のワクチンを接種したかは不明であった。

ワクチン接種の 2 週間以内にアルファカルシドール、チラーヂン S、フェロミア、セルトラリン、モサプリドクエン酸塩錠を投与した。

ワクチン接種前、COVID-19 の診断はされていなかった。

ワクチン接種以降、患者は COVID-19 の検査を受けていなかった。

薬剤、食物、その他製品に対するアレルギーはなかった。

BNT162b2 のロット/バッチ番号に関する情報は要請されており、入手次第、提出される。

追加情報（2022/05/11）：再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

追加情報（2022/05/18）：再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

19396	<p>2 グロブリン減少；</p> <p>四肢痛；</p> <p>関節痛；</p> <p>頸部痛；</p> <p>顔面痛</p>	ワクチンの互換	<p>本報告は、製品情報センター及び医薬情報担当者経由で連絡可能な報告者（医師）から入手した自発報告である。</p> <p>2022/03/23、41歳の女性患者はCOVID-19免疫のためBNT162b2（コミナティ、3回目（追加免疫）、30ug、単回量、パッチ/ロット番号：不明、筋肉内、左腕）の接種を受けた（41歳時）。</p> <p>関連する病歴はなかった。</p> <p>有害事象に関連する家族歴：無し。</p> <p>COVID ワクチンの前4週間以内にその他のワクチン接種はなかった。</p> <p>ワクチン接種の2週間以内に投与したその他の薬剤はなかった。</p> <p>併用薬はなかった。</p> <p>ワクチン接種歴は以下を含んだ：</p> <p>モデルナ COVID-19 ワクチン（1回目、投与経路：筋肉内、ワクチンの部位：左上腕）、投与日：2021/07/07、COVID-19免疫のため、反応：「鎖骨下に腫れがあって、リンパ節症が疑われた」、「鎖骨下に腫れがあって、リンパ節症が疑われた」）、モデルナ COVID-19 ワクチン（2回目、投与経路：筋肉内、ワクチンの部位：左上腕）、投与日：2021/08/10、COVID-19免疫のため、反応：「鎖骨下に腫れがあって、リンパ節症が疑われた」、「鎖骨下に腫れがあって、リンパ節症が疑われた」）。</p> <p>以下の情報が報告された：</p> <p>関節痛（非重篤）、四肢痛（非重篤）、顔面痛（非重篤）、すべて2022/03/23発現、転帰：「未回復」、「肩から（上腕もかな）、頸部・顔面にかけて左の上が全部の痛み」と記述された。</p> <p>頸部痛（障害、医学的に重要）、2022/03/23発現、転帰：「未回復」、「左肩左頸部から顔面にかけて痛みが起こっている」と記述された。</p> <p>2 グロブリン減少（非重篤）、2022/03/28発現、転帰：「不明」、「2 グロブリン(%)：6.7」と記述された。</p>
-------	--	---------	---

事象の「左肩左頸部から顔面にかけて痛みが起こっている」は、診療所への来院を必要とした。

以下の検査と処置を受けた：

Alanine aminotransferase (5-40): (2022/03/28) 12 IU/l; Albumin globulin ratio (1.3-1.9): (2022/03/28) 1.75; Alpha 1 globulin (2.9-4.9): (2022/03/28) 3.3 %; Alpha 2 globulin (7.1-11.8): (2022/03/28) 6.7 %; Amylase (37-125): (2022/03/28) 57 IU/l; Aspartate aminotransferase (10-40): (2022/03/28) 19 IU/l; Basophil count (0-2): (2022/03/28) 0.3 %; Beta 2 globulin (3.2-6.5): (2022/03/28) 4.5 %; Beta globulin (4.7-7.2): (2022/03/28) 6.1 %; Blood albumin (55.8-66.1): (2022/03/28) 63.6 %; Blood albumin: (2022/03/28) 4.8 g/dl; Blood alkaline phosphatase (38-113): (2022/03/28) 58 IU/l; Blood creatine phosphokinase (45-163): (2022/03/28) 117 IU/l; Blood creatinine (0.47-0.79): (2022/03/28) 0.59 mg/dl; Blood glucose (70-109): (2022/03/28) 106 mg/dl; Blood lactate dehydrogenase (124-222): (2022/03/28) 167 IU/l; Blood thyroid stimulating hormone (0.50-5.0): (2022/03/30) 2.120 uiU/mL; Blood urea (8.0-22.0): (2022/03/28) 8.7 mg/dl; Blood uric acid (2.5-7.0): (2022/03/28) 4.3 mg/dl; Computerised tomogram: (日付不明) 所見以上なし; C-reactive protein: (2022/03/28) 0.13 mg/dl, メモ:基準値:0.30 以下; C-reactive protein: (2022/03/28) -, メモ:基準値:"-"; Eosinophil count (0-6): (2022/03/28) 0.9 %; Gamma-glutamyltransferase: (2022/03/28) 16 IU/l, メモ:基準値:30 以下 Globulin: (2022/03/28) 2.8 g/dl; Glomerular filtration rate: (2022/03/28) 88.0 ml/min; Haematocrit (33.4-44.9): (2022/03/28) 41.5 %; Haemoglobin (11.3-15.2): (2022/03/28) 14.0 g/dl; Immunoglobulins (11.1-18.8): (2022/03/28) 15.8 %; Lymphocyte count (18-59): (2022/03/28) 23.7 %; Lymphocyte morphology: (2022/03/28) 0.0 %; Mean cell haemoglobin (26.3-34.3): (2022/03/28) 32.4 pg; Mean cell haemoglobin concentration (30.7-36.6): (2022/03/28) 33.8 %; Mean cell volume (79.0-100.0): (2022/03/28) 95.8fL; Metamyelocyte count: (2022/03/28) 0.0 %; Monocyte count (0-8): (2022/03/28) 4.1 %; Myelocyte count: (2022/03/28) 0.0 %; Neutrophil count (40-74): (2022/03/28) 71.0 %; Platelet count (正常範囲下限:13.0): (2022/03/28) 27.2x10000/uL; Protein total (6.7-8.3): (2022/03/28) 7.6 g/dl; Red blood cell count (正常範囲下限:376): (2022/03/28) 433x10000/uL; Thyroxine free (0.9-1.7):

(2022/03/30) 1.16 ng/dL; Tri-iodothyronine free (2.3-4.3):
(2022/03/30) 2.93 pg/mL; White blood cell count (3500-9100):
(2022/03/28) 8700 IU/l。

頸部痛、関節痛、四肢痛、顔面痛の結果として治療的な処置がとられた。

治療は以下を含んだ：

カロナール、ロキソプロフェン Na、インドメタシン。

ワントラム（2022/04/14、プライバシー医大）。

2022/04/14、プライバシー医大を紹介し、現在精査加療中であった。

臨床経過は以下のとおり報告された。

1回目2回目はモデルナを接種されていた。そのときも鎖骨下に腫れがあつて、リンパ節症が疑われた。

(左)鎖骨上窩リンパ節の腫脹・疼痛が見られた。

全身 CT にて（2021/07/21）、(左)鎖骨上窩～腋窩のリンパ節腫大を認めたが、のちに症状は改善した。

その際は鎖骨下リンパがぼこぼことした感じの腫れがみられ、CTなども取ったが所見以上なしで後に回復した。

3回目はコミナティを接種した。

同日より、左肩左頸部から顔面にかけて仕事にも出れないレベルの疼痛が続いていた。

2022/04/28 現在、職場復帰できていなかった。

アセトアミノフェンを限界まで処方し、ロキソニンも投薬したが痛みは変わらなかった。

2022/03/23、3回目接種にコミナティ接種した。

2022/03/23、左頸部から顔面にかけての疼痛が発現した。

翌日から左頸部から顔面にかけての疼痛が約二週間続いており、仕事にもできないレベルの痛みが続いているとのことであった。

アセトアミノフェンも限界量まで処方して、ロキソニンも投薬したが痛みは変わらなかった。

左頸部から顔面にかけて痛みが起こっている。仕事を休まないといけないくらいであった。

肩から（上腕もかな）、頸部・顔面にかけて左の上が全部の痛みであった。

転帰は、未回復と考えられた。

報告者は、事象を非重篤と分類した。

報告者は、事象と BNT162b2 との因果関係は確実と述べた。

これ以上の再調査は不可能である。ロット/バッチ番号に関する情報は入手できない。これ以上の追加情報は期待できない。

追加情報（2022/04/15）：再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

追加情報（2022/05/06）：再調査の依頼に応じた連絡可能な同医師から入手した新情報は以下を含んだ：更新情報：年齢、ワクチン接種時の年齢、1回目と2回目のワクチン歴の開始日、終了日、投与経路、解剖学的部位の更新、病歴、臨床検査値、被疑薬である3回目の解剖学的部位の更新、事象の記述を「左頸部から顔面にかけて痛みが起こっている」から「左肩左頸部から顔面にかけて痛みが起こっている」に更新、非重篤から重篤に症例をアップグレード、事象の「頸部痛」の診療所への来院にチェック、新事象「2グロブリン減少」追加、併用治療、臨床経過。

再調査は完了した。これ以上の追加情報は期待できない。

「修正：本追加報告は、前回報告情報の修正をするために提出される。：臨床経過情報は更新された。」

<p>19446</p>	<p>ヘルニア; 低酸素症; 咳嗽; 心筋炎; 意識消失; 発熱; 突然死; 鼻閉</p>	<p>ワクチンの互換</p>	<p>本報告は、規制当局を経由して連絡可能な報告者（医師）から入手した自発報告である。PMDA 受付番号：v2210000823（PMDA）。</p> <p>2022/05/01 10:00、19 歳 4 か月の男性患者は、COVID-19 免疫のため、BNT162b2（コミナティ、ロット番号：FN9605、使用期限：2022/08/31、3 回目（追加免疫）、単回量、19 歳時）を接種した。</p> <p>患者の関連する病歴は、以下の通り：</p> <p>「ワクチンの互換」（継続中であるか否か不明）。</p> <p>患者の併用薬は、報告されなかった。</p> <p>ワクチン接種歴は、以下の通り：</p> <p>COVID-19 免疫のため、モデルナ COVID-19 ワクチン（1 回目、単回量、ロット番号：3004495）、</p> <p>COVID-19 免疫のため、モデルナ COVID-19 ワクチン（2 回目、単回量、ロット番号：3004733）。</p> <p>以下の情報が報告された：</p> <p>咳嗽（非重篤）、発現日 2022/05/01、転帰「不明」、</p> <p>発熱（非重篤）、発現日 2022/05/01、転帰「不明」、報告事象名「微熱」、</p> <p>鼻閉（非重篤）、発現日 2022/05/01、転帰「不明」、</p> <p>突然死（死亡、医学的に重要）、発現日 2022/05/04、転帰「死亡」、</p> <p>意識消失（死亡、医学的に重要）、発現日 2022/05/04 04:30、転帰「死亡」、</p> <p>ヘルニア（死亡）、発現日 2022/05/09、転帰「死亡」、報告事象名「ヘルニア状態」、</p> <p>低酸素症（死亡、医学的に重要）、発現日 2022/05/09、転帰「死亡」、</p>
--------------	---	----------------	--

心筋炎（死亡、医学的に重要）、転帰「死亡」。

事象「咳嗽」、「鼻閉」、「微熱」は、診療所への来院を必要とした。

事象「突然死」、「意識消失」は、緊急治療室への来院を必要とした。

臨床経過：

2022/05/04 04:30（ワクチン接種2日18時間30分後）、患者は、不明な事象を発現した。

事象の経過は、以下の通り：

2022/05/01 10:00頃、患者は、ワクチン接種を受けた。その後、微熱、咳、鼻閉感が出現した。

2022/05/02、患者は、かかりつけ医を受診した。SpO2 98%（室内気）、呼吸音は問題なかった。シムビコート吸入が行われた。鎮咳薬と鼻炎薬が2022/03で終了のため、シムビコート、抗ヒスタミン薬、鎮咳薬を処方された。症状の悪化が見られないため、患者は検査を受けずに、帰宅した。

2022/05/04 朝04:30頃、就寝中、突然大声をあげた後、意識消失した。患者の母親が救急要請した。初期波形V5あり。除細動（DC）を数回施行するも、停止せず。喉頭管吸引（LTS）が挿入された。心肺蘇生法（CPR）に継続より、患者は病院に搬送された。搬送後もV5の波形は継続した。アンカロン、アドレナリン投与下で除細動施行しても止まらず。経皮的心肺サポート（PCPS）のカテーテル挿入、ICUに入室した。

本報告は、心筋炎の基準を満たしている。

心筋炎調査票：

臨床症状/所見：

2022/05/04、突然死。

検査所見：

トロポニン I : 2022/05/04 実施、431.7ng/ml、上昇あり、

クレアチンキナーゼ (CK) : 2022/05/04 実施、51.383u/L、上昇あり、

CK-MB : 2022/05/04 実施、1816u/L、上昇あり、

C-反応性蛋白 (CRP) : 2022/05/04 実施、5.64mg/dL、上昇あり、

D-ダイマー : 2022/05/04 実施、11.3ug/ml、上昇あり、

トロポニン T、高感度 CRP、ESR (1 時間値) は、実施されなかった。

画像検査 :

直近の冠状動脈検査が実施された。検査方法は 2022/05/04 に血管造影検査であり、冠動脈狭窄はなかった。

心臓超音波検査は、2022/05/04 に実施され、異常所見には、右室又は左室の、局所又はびまん性の機能異常 (例 : 駆出率低下)、左室壁厚の変化、心腔内血栓があった。

心電図検査 :

心電図検査は、2022/05/04 に実施され、異常所見には、発作性又は持続性の、心房性又は心室性不整脈 (心房期外収縮、心室期外収縮、上室性頻脈、心室性頻脈、心室内伝導遅延、異常 Q 波、低電位)、房室伝導遅延又は心室内伝導障害 (I -III 度房室ブロック、新規に出現した脚ブロック) があった。

2022/05/09、頭部 CT にて、低酸素、ヘルニア状態がみられた。心機能の改善はみられなかった。

2022/05/11、患者は、死亡した。

2022/05/11 (ワクチン接種の 10 日後)、事象の転帰は、死亡であった。

報告医師は、事象を重篤 (死亡) と分類した。

突然死、心筋炎、意識消失、咳嗽、鼻閉、発熱の結果として、治療措置が取られた。

患者の死亡日は、2022/05/11であった。

報告された死因：「突然死」、「心筋炎」、「意識消失」、「低酸素症」、「ヘルニア」。

剖検が行われたか否かは報告されなかった。

これ以上の再調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。

19586	<p>浮動性めまい; 耳鳴</p>	<p>ワクチンの互換</p>	<p>本症例は、連絡不可能な報告者（消費者、またはその他の非医療従事者）から入手した自発報告である。報告者は、患者である。</p> <p>2022/03/07、53歳の男性患者は、COVID-19免疫のため、3回目（追加免疫）単回量のBNT162B2（コミナティ、ロット番号：FM3289、有効期限：2022/05/31、53歳時）を接種した。</p> <p>患者の関連する病歴は以下を含んだ：「ワクチンの互換」（継続中か不明）。</p> <p>患者の併用薬は報告されなかった。</p> <p>ワクチン接種歴は以下を含んだ：モデルナ（1回目投与、COVID-19免疫のため）、モデルナ（2回目投与、COVID-19免疫のため）。</p> <p>以下の情報が報告された：</p> <p>浮動性めまい（非重篤）、発現 2022/03/07、転帰「回復」（2022/03/07）、「3回目接種して20分後に体がふらついた/接種してから20分、30分後に頭のふらつき」と記載された。</p> <p>耳鳴（非重篤）、発現 2022/03/07、転帰「未回復」であった。</p> <p>事象「耳鳴り」は、医師受診を必要とした。</p> <p>患者は、以下の検査と処置を受けた：耳鏡検査：不明、メモ：いろいろな病院で診てもらい、耳を3、4回調べたが対応方法はわからなかった。</p> <p>耳鳴の結果として、治療的な処置がとられた。</p> <p>追加情報：臨床経過は以下のとおり報告された：</p> <p>1回目と2回目はモデルナで、3回目（2022/03/07）はファイザーを接種した。</p> <p>3回目のワクチン接種10分後、患者は体がふらついた。</p>
-------	-----------------------	----------------	--

10分程で治ったが、その後、患者は耳鳴りがするようになった。

患者は、10か所ほどの病院で診察したが、それは治らなかった。

神経外科より、漢方薬ツムラ漢方五苓散エキス顆粒とツムラ漢方黄連解毒湯、耳鼻咽喉科から、アデホス、ストミンなど合計10種類ほどが処方された。患者は1日3回の服用を要した。（他の服用している薬剤についてはすぐに確認ができなかった。）

現在も、患者の症状は治っておらず、対応方法や推奨の病院をもし知っているなら教えてほしいと希望した。

報告者は重篤性評価を提供せず、事象とBNT162b2との因果関係は提供されなかった（報告のとおり）。

接種してから20分、30分後に頭のふらつきと耳鳴りがあった。

頭のふらつきは回復しているが、耳鳴りはずっと治らず、寝ているとき以外は鳴っている。

いろんな病院で診てもらい、耳を3、4回調べたが対応方法はわからなかった。

薬も8種類服用していたが治らない。

報告患者は、事象「耳鳴り」はBNT162b2と関連ありと評価した。

これ以上の再調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。

修正：本追加情報は、以前に報告した情報の修正報告である。

事象：「3回目のワクチン接種10分後、患者は体がふらついた。」は「3回目のワクチン接種20分後、患者は体がふらついた。」に更新された。

全て、経過において「3回目のワクチン接種10分後、患者は体がふらついた。」は「3回目のワクチン接種20分後、患者は体がふらつい

			<p>た。」に更新される。</p> <p>これ以上の再調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。</p> <p>追加情報：(2022/05/19)本報告は、連絡不可能な報告者(消費者、または他非医療従事者)からの自発追加報告である。</p> <p>原本の記載通りに則った新たな情報は以下を含んだ：記載事象名を更新し、追加情報が追加された。</p> <p>これ以上の再調査は不可能である。これ以上の追加情報は期待できない。</p>
22034	アナフィラキシー反応	アナフィラキシー反応; 喘息	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例(厚生労働省受付番号：v21131512)である。</p> <p>2021/12/01 追加情報として、薬剤師による副反応報告症例を入手した。</p> <p>2022/01/19 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/04 コミナティを1回目接種。発疹、呼吸困難が発現したため、コミナティでの2回目接種は行わず。</p> <p>2021/11/27 17:00頃 本剤1回目の接種。</p>

			<p>17:20 発疹、咳、限局的なそう痒感、限局的な発赤・紅斑、両側の気管支痙攣または喘鳴、息苦しさあり。血圧 136/84 mmHg、体温 36.8 。ボスミンを投与したが軽快せず。</p> <p>18:30 病院へ搬送。搬送後、再度ボスミンを投与したが軽快せず。発疹は来院時には改善。</p> <p>18:40 ソルコーテフ 250 mg、ベネトリン投与。</p> <p>19:00 軽快しなかった為、ポララミン、ファモチジン投与。投与後軽快したが、経過観察として入院。</p> <p>20:07 胸部レントゲン実施。異常なし。</p> <p>2021/11/28 08:00 症状の回復を確認。その後、退院。</p> <p>アナフィラキシーの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22134	心膜炎	側頭葉てんかん； 季節性アレルギー； 星細胞腫； 開頭	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v21133084）である。</p> <p>2022/03/10 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/01/08 特に変わりなし。</p> <p>2022/01/09 13:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/01/10 11:00頃 発熱。カロナールを内服。</p>

2022/01/11 15:00-16:00 平熱になった。夜、発熱予防でロキソニンを内服。

2022/01/12 16:00 頃 左側頭部に1分間持続する拍動性の頭痛を自覚。

20:00 頃 心外膜炎発現。間欠的な胸痛、締め付ける感が出現。

2022/01/13 朝、胸痛を10回程度認めた。内科、脳外科受診。脳外科では頭部MRI施行し、鎮痛薬での対処で経過観察となった。CK、CK-MB、D-ダイマーの上昇なし。CRP 1.46 mg/dL と上昇。心エコーでは、前壁の高信号と異常な心嚢液貯留、心膜の炎症所見あり。心電図検査では洞徐脈に加えて、2、3、aVFで0.5 mm 上昇し、J波を伴うST上昇を認めた。本剤接種後頭痛、胸部痛、片頭痛、てんかん発作が鑑別。内科では心電図は特記事項なし。心エコーでEF 58.7%、LV側後壁の心外膜に高信号、心嚢液少量貯留、心膜の炎症所見あり。心外膜炎との診断、入院。ナイキサン 600 mg/日分3、コルヒチン 0.5 mg/日 を内服開始。

2022/01/14 胸部X線検査実施。異常なし。心電図で洞徐脈、洞不整脈及び2、3、aVFでJ波を伴うST上昇を認め、PR延長が疑われた。

2022/01/16 朝、胸痛改善。心電図でPR延長と洞徐脈を認めた。内服は朝で終了とし退院。

日付不明 退院後、胸部絞扼感が残存。内服再開。

2022/01/20 内服終了。

2022/01/24 朝、胸部絞扼感が残存。胸痛出現し、循環器内科受診。コルヒチン 1 mg/日に増量。心電図では2、3、aVFでJ波を伴う軽度ST上昇、洞徐脈を認め、PR延長が疑われた。

2022/01/28 心エコーでEF 67.0%、心嚢液、胸水なし。前回よりEF、心膜肥厚、心嚢液等改善を認めた。心電図で2、aVFでJ波を伴うST上昇を認め、PR延長が疑われた。

2022/02/03 心電図で洞徐脈を認めた。

2022/03/04 外来で症状消失を確認。軽快を認め、終診。

			<p>心外膜炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22143	<p>呼吸困難；</p> <p>大動脈解離；</p> <p>心肺停止</p>		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師による報告である。</p> <p>2022/02/04 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033483）を入手した。</p> <p>2021/06/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/10 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.7 。</p> <p>2022/01/23 17:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/01/24 10:45 息切れを自覚し、他院へ受診。帰宅後、心肺停止状態で当院に救急搬送。蘇生行為を行うも、自己心拍再開せず。12:03死亡確認。CT検査では急性大動脈解離が疑われた。死因は急性大動脈解離。</p>

			<p>息切れ、心肺停止、急性大動脈解離の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22148	アナフィラキシー様反応	<p>喘息；</p> <p>季節性アレルギー；</p> <p>蕁麻疹；</p> <p>過敏症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v21133197）である。</p> <p>2022/02/21 医師より追加情報を入手した。</p> <p>アナフィラキシー様反応は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/04/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/05/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。接種後に悪心、咽頭違和感が発現。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/01/24 10:40 本剤3回目接種。</p> <p>11:05 アナフィラキシー様反応が発現。喘息の前駆症状である生唾、乾性咳嗽、喉頭違和感の訴えあり。医師により、ボスミン0.3 mL筋注施行。</p> <p>11:12 医師指示にてラクテックG 250 mL、生食 50 mL + ポララミン 5 mg1 A を点滴静脈注射施行。プレドニン 5 mg 経口投与。症状が軽快。</p> <p>12:05 症状消失し、回復。点滴静脈注射中止。</p>

			<p>アナフィラキシー様反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22152	1 型過敏症	<p>季節性アレルギー；</p> <p>蕁麻疹；</p> <p>過敏症</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022540）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v21133256）である。</p> <p>1 型アレルギーは企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/05/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/05/28 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>日付不明 両腕発疹が発現。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.5 度。</p> <p>2022/01/29 11:44 本剤 3 回目の接種。1 型アレルギーが発現。接種後 1 時間以内に咽頭違和感、膨疹出現。被接種者が自己にて抗ヒスタミン薬を内服していたため、経過観察。その後、症状悪化ないため帰宅、経過観察とした。</p> <p>1 型アレルギーの転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>

22153	溺死	リンパ節転移; 子宮癌; 直腸癌	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した解剖医による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033749）である。</p> <p>子宮癌、直腸癌、腹部リンパ節転移の既往あり、UFT 内服中。</p> <p>2021/04/25 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/05/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/01/31 11:15 本剤3回目接種。接種後、普段より元気がなく、眠そうであった。</p> <p>2022/02/02 00:00 死亡。朝、自宅浴室の浴槽内で死亡しているのを発見。死因は溺死と考える。</p> <p>元気がない、眠そうな症状の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22160	呼吸停止; 意識レベルの低下; 発熱	便秘; 活動性低下; 胃食道逆流性疾患; 食欲減退	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/02/05 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022545）を入手した。</p> <p>2022/02/07 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033498）を入手した。</p> <p>2022/03/14 医師より追加情報を入手した。</p> <p>呼吸停止、声掛けに反応なしは企業により重篤と判断された。</p>

			<p>2021/06/18 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07/09 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/01/21 13:00 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/01/24 15:00 過ぎに悪寒を伴う 38.9 の発熱を認める。呼吸器症状、消化器症状、関節の腫脹など見られず、カロナール 200 mg 2 錠服用にて経過観察。</p> <p>2022/01/25 朝、36.8 に解熱。以後、悪寒、発熱みられず経過観察。同日の採血にて白血球 20,900、Neu 78.0%、CRP 11.4、NTproBNP 9,333、Alb 1.9、GOT 30、GPT 23、Na 128、K 4.4、Cl 95。</p> <p>2022/01/26 02:55 体温 36.7 。起きており、声掛けに反応あり。</p> <p>04:00 声掛けに反応なく顔色悪く冷感を確認。呼吸停止状態で発見したため、看護師に連絡。</p> <p>06:45 死亡確認。死因は不詳。剖検なし。</p> <p>悪寒、声掛けに反応しないこと、顔色悪いこと、冷感、呼吸停止の転帰は、不明。発熱の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22162	<p>心肺停止；</p> <p>意識レベルの低下；</p> <p>死亡</p>	<p>リウマチ性障害；</p> <p>喘息</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033499）である。</p> <p>車椅子生活の患者。リウマチで足の変形があり、手術施行歴あり。</p> <p>2021/06/22 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07/13 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。接種後、発熱が出現。</p> <p>日付不明 接種前体温：36 度。</p>

			<p>2022/02/03 13:30 本剤3回目の接種。その後、状態の変化はなかった。</p> <p>2022/02/04 11:30頃 39度台の発熱が発現。カロナール内服。</p> <p>12:00頃 傾眠となった。</p> <p>14:45 意識低下、心肺停止。</p> <p>16:05 蘇生措置し、心拍再開。レスピレーター装着し、入院。</p> <p>2022/02/05 00:13 死亡。</p> <p>発熱、意識低下、心肺停止の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22163	<p>心肺停止；</p> <p>急性心筋梗塞</p>	<p>不眠症；</p> <p>大腿骨頸部骨折；</p> <p>慢性心不全；</p> <p>湿疹；</p> <p>糖尿病；</p> <p>背部痛；</p> <p>脊椎圧迫骨折；</p> <p>脳梗塞；</p> <p>認知症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033576）である。</p> <p>2022/02/22 医師より追加情報を入手した。</p> <p>合併症と慢性湿疹及び手術後の腰痛などの治療のため、ゾルピデム酒石酸塩錠、セレコキシブ錠、ルパフィン錠、メマンチン塩酸塩OD錠、セルトラリン錠、バイアスピリン錠、アムロジピンOD錠、ネキシウムカプセル、モーラステープを2021年4月以前に投与開始。2021年6月末より、背部から下肢の痒みを伴う慢性湿疹あり。好酸球7.6%、ステロイドを含む塗り薬で軽快中であった。</p> <p>2021/05/18 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2度</p> <p>2022/02/07 13:00頃 左上腕に本剤3回目接種。BP 120/82、P 96、T</p>

			<p>36.2 。 普段と不変。</p> <p>16:00 頃 副反応なく自宅に戻り、就寝時までも普段と変わらず調子がよかったと家族より話あり。</p> <p>2022/02/08 00:00 頃 排尿。</p> <p>02:30 頃 再び排尿、排便。身体のだるさ、おかしな感じを訴える。</p> <p>03:17 医療スタッフの看護師が訪問。便座上で心肺停止状態。</p> <p>03:22 医師へ連絡。</p> <p>03:32 頃 医師が往診。便座から蒲団に横たえられていたが、瞳孔反射消失、心音呼吸音聴取せず、頸動脈で脈拍触知せず。</p> <p>03:47 医師により死亡確認。糖尿病の持病もあり、死因は無痛性急性心筋梗塞と判断。痛みの訴えはほとんど無かった事により、くも膜下出血や大動脈解離は考えにくいと判断。剖検なし。</p> <p>身体のだるさ、おかしな感じの転帰は、不明。心肺停止、無痛性急性心筋梗塞の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22177	<p>内出血；</p> <p>意識変容状態；</p> <p>脊椎圧迫骨折</p>	<p>胃食道逆流性疾患；</p> <p>高脂血症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033569）である。</p> <p>2022/05/16 医師より追加情報を入手した。</p> <p>一過性意識障害による転倒、顔面内出血、脊椎圧迫骨折は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p>

			<p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/03 11:30 左上腕に本剤 3 回目接種。夜、37.5 度の発熱が発現。</p> <p>2022/02/04 07:40 一過性意識障害が発現。朝食準備中に突然失神し意識を失い転倒。約 2 分程度意識障害を認めた。整形外科を受診し、脊椎圧迫骨折と診断。</p> <p>2022/02/07 来院し、上記報告。顔面内出血を認めた。圧迫骨折のためのコルセット装着。疼痛のため横臥不可。</p> <p>2022/03/08 来院時、鎮痛剤を服用し、コルセット装着で移動。</p> <p>2022/04/18 来院時、コルセット装着しながら、疼痛は改善を認め、鎮痛剤は休薬の方向へ。</p> <p>2022/05/11 来院時、コルセットなし。コルセットは時々装着し、疼痛はほぼ軽快している。症状の軽快を認めた。</p> <p>一過性意識障害による転倒、顔面内出血、脊椎圧迫骨折の転帰は、軽快。発熱の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22185	アナフィラキシー様反応	過敏症	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>アナフィラキシーのような症状は企業により重篤と判断された。</p> <p>アレルギー症状によりステロイド外用や抗アレルギー薬服用。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p>

		<p>2022/02/04 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/06 顔・頭に蕁麻疹、口唇の腫れがあり、アナフィラキシーのような症状が発現。</p> <p>日付不明 内科を受診。</p> <p>2022/02/08 現在もかゆみあり。</p> <p>アナフィラキシーのような症状の転帰は、未回復。</p> <p>報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22194	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033654）である。</p> <p>2022/03/02 医師より追加情報を入手した。</p> <p>心筋炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/05/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/09 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/01/24 本剤3回目接種。夜 全身倦怠感、39.3 の発熱、胸苦しさが出現。</p> <p>2022/01/25 発熱持続。</p> <p>2022/01/26 一旦解熱。午後、心筋炎が発現。夕食後より再度 38 の発熱、胸痛、息苦しさあり。次第に心拍数が上がる時に心臓をつかまれるような痛み、動悸あり。</p>

			<p>2022/01/27 医療機関受診。胸部 X 線、心電図実施。37.5 の発熱のため PCR 検査実施。異常なく、ロキソニン、ムコスタ投薬される。</p> <p>2022/01/28 当院受診。心電図、胸部 X 線実施し、異常なし。KT 36.9 、BP 106/72、SpO2 99%、P 74/min。血液検査実施し、白血球 5,000、CRP 2.29 mg/dL、CPK 471 U/L、GOT 63、LDH 299 と高値を認めた。カロナール 500 3 錠、ムコスタ 3 錠分 3 入を 4 日分投薬。心電図検査実施し、0.241 秒と PR 延長を認めた。鑑別診断では、臨床症状/所見を説明可能なその他の疾患が否定。</p> <p>2022/02/03 当院来院。内服しないと痛みあり。KT 35.8 、BP 98/54、SpO2 98%、P 84/min。カロナール 500 1 錠、ムコスタ 1 錠分 1 回で処方。</p> <p>2022/02/14 症状なし。BP 108/54、SpO2 97%、P 85/min。症状の回復を認めた。</p> <p>心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22197	アナフィラキシー反応	アトピー性皮膚炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033656）である。</p> <p>2022/03/04 医師より追加情報を入手した。</p> <p>アナフィラキシーは企業により重篤と判断された。</p> <p>アトピー性皮膚炎を疾患に持つが、症状安定しているため内服なし。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コヒナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/04/11 SARS-CoV-2（コヒナティ筋注）2 回目接種。</p>

			<p>日付不明 接種前の体温:36.6 。</p> <p>2022/02/12 08:49 本剤3回目接種。</p> <p>09:04 胃がムカムカし、嘔気、唾液様の嘔吐、広範にそう痒感、目の充血やかゆみ、咳嗽あり。</p> <p>09:05 アナフィラキシー反応が発現。全身に発赤あり。血圧108/76 mmHg、体温36.7。救急外来受診。ソルアセトFでルート確保し、抗ヒスタミン剤のポララミン注、プリンペラン注を静脈注射。メトクロプラミドを投与。</p> <p>2022/02/13 12:00頃 症状消失。回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシーの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22204	<p>下痢;</p> <p>嘔吐;</p> <p>心肺停止;</p> <p>意識消失;</p> <p>発熱;</p> <p>胃腸炎;</p> <p>脱水;</p> <p>血圧低下;</p> <p>誤嚥性肺炎</p>	<p>てんかん;</p> <p>便秘;</p> <p>感染性胸水;</p> <p>知的能力障害</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033732、v2110033736）である。</p> <p>2022/03/11 医師より追加情報を入手した。</p> <p>幼少期のてんかん発作は内服治療により発作はコントロールしていた。最重度知的障害のため、当院精神科を通院中の被接種者。</p> <p>2021/07/01 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/29 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.9 。</p> <p>2022/02/10 14:00 本剤3回目接種。接種後特に問題なし。</p>

			<p>2022/02/11 朝より水様便頻回。夜間から 2022/02/12 未明にかけて数回嘔吐。</p> <p>2022/02/12 未明、嘔吐後、発熱とむせ込みあり。</p> <p>09:30 当院受診。38.7 の発熱、SpO2 97%、RR 20/分、右肺野に crackles。血圧測定不能、橈骨 A 触知微弱、HR 110-140、覚醒。ラクテック D 500 mL 補液施行。嚥下機能検査 (VE) にて明らかな誤嚥は見られなかったものの、軽度の咳がみられた。胃腸炎による重度の脱水、血圧低下に加え、嘔吐による誤嚥性肺炎が疑われ、他院へ救急搬送。搬送途中で多量の嘔吐あり、意識を失う。救急隊員が心肺蘇生行っても、病院到着時には心肺停止。気管内挿管施行。管も吐物にまみれた。強心剤など施行されたが反応なく、死亡確認。剖検なし。死因は不詳の内因子。</p> <p>発熱、胃腸炎、血圧低下、誤嚥性肺炎の疑い、意識消失の転帰は、不明。下痢、嘔吐、重度の脱水、心肺停止の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22205	<p>ショック；</p> <p>多臓器機能不全症候群；</p> <p>意識変容状態；</p> <p>熱中症；</p> <p>脳梗塞；</p> <p>運動障害</p>	<p>心房細動；</p> <p>糖尿病</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033724）である。</p> <p>2022/03/16 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/02/12 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/13 16:00 頃 意識障害が発現。倒れているところを発見され救急搬送。不慮の事故または先行する疾患によって体動困難となり、暑熱環境下で熱中症となった疑い。既に多臓器不全、ショックで救命</p>

		<p>困難であった。CTで多発脳梗塞の可能性が疑われるが、確定できず。慢性心房細動による脳梗塞の疑いあり。</p> <p>2022/02/14 死亡。死因は熱中症。剖検なし。</p> <p>意識障害、多発脳梗塞の可能性、体動困難、熱中症の疑い、多臓器不全、ショックの転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22210	<p>呼吸停止； 死亡</p>	<p>前立腺癌； 脳梗塞</p> <p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/03/15 医師より追加情報を入手した。</p> <p>呼吸停止は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/15 17:00 頃 本剤 3 回目接種。直後体調変化なし。</p> <p>2022/02/16 00:55 看護師訪室時、体温 37.3 。02:2 L 下で SpO2:93%。吸引し白色粘調痰多量に引ける。著変なし。</p> <p>04:16 朝、注入のため看護師訪室すると呼吸停止しているのを確認。蘇生措置拒否 (DNAR) であったため救命措置は行わず、医師に報告。</p> <p>08:10 医師により死亡確認。死因は前立腺癌。剖検なし。</p> <p>呼吸停止、白色粘調痰多量、発熱の転帰は、不明。</p>

			追跡調査予定なし。
22220	ぶどう膜炎; 網膜血管炎	喘息; 心房細動	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/03/04 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例 (TASK0022565) を入手した。</p> <p>2022/03/07 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて薬剤師より副反応報告症例(厚生労働省受付番号：v2110034507) を入手した。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/06 12:00 本剤 3 回目接種。帰宅途中に右目の飛蚊症と霧視、視界不良を自覚。17:00 ぶどう膜炎、樹氷状網膜血管炎が発現。</p> <p>2022/02/07 朝、視野欠損の拡大があり、近医眼科受診。網膜炎の疑いで当院眼科紹介受診。両眼のぶどう膜炎を認めた。</p> <p>2022/02/08 ぶどう膜炎専門外来を再診。虹彩炎、樹氷状網膜血管炎を認め、ステロイドパルス治療目的で緊急入院。</p> <p>日付不明 ステロイドおよびアシクロビル投与で血管炎自体は消失しつつあるが、視野の改善は乏しい。</p> <p>2022/02/26 退院。</p> <p>2022/03/04 症状は未回復。</p>

			<p>ぶどう膜炎、樹氷状網膜血管炎の転帰は、未回復。</p> <p>報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22224	細菌性肺炎	<p>パーキンソン病；</p> <p>季節性アレルギー；</p> <p>慢性呼吸疾患；</p> <p>肺陰影；</p> <p>胃癌</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033711）である。</p> <p>2022/04/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/06 11:00 本剤接種3回目接種。体調変化なしのため帰宅。</p> <p>14:00 ふるえ、発熱、悪寒、戦慄、呼吸困難が発現。当院へ搬送され、細菌性肺炎で入院。</p> <p>15:00 検査施行。細菌性肺炎の診断で加療。抗生剤はLTRXを使用。以上の経過や既往歴から肺炎による症状と判断。</p> <p>2022/02/19 症状の軽快を認めた。</p> <p>細菌性肺炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22233	心肺停止	<p>脳梗塞；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033862）である。</p> <p>2022/03/17 医師より追加情報を入手した。</p> <p>脳梗塞の既往あり、健康診断時に高血圧を認め要経過観察中の被接種者。服薬等の加療は受けていない。</p> <p>2021/06/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.7 。</p> <p>2022/02/21 11:00 頃 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/22 00:30 自宅でうつ伏せ状態で倒れているのを発見。AED使用も反応なし。救急搬送。</p> <p>01:10 心肺停止状態。</p> <p>02:29 同院にて、死亡確認。頭部打撲、鼻出血を認めた。剖検なし。</p> <p>心肺停止の転帰は、死亡。頭部打撲、鼻出血の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	------	------------------------	---

22246	倦怠感； 嘔吐； 尿閉； 悪寒； 悪心； 発熱； 食欲減退	<p>本例は、当社 MR を通じて入手した薬剤師による報告である。</p> <p>2022/02/28 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて薬剤師による副反応報告症例（TASK0022559）を入手した。</p> <p>2022/03/01 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて薬剤師より副反応報告症例(厚生労働省受付番号：v2110034020)を入手した。</p> <p>2021/05/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/07 昼頃、本剤3回目の接種。20:00頃 発熱、嘔気、嘔吐、食欲不振あり。3日間飲食・服薬できない状態が持続。</p> <p>2022/02/10 救急要請。38 台の発熱、悪寒、倦怠感あり、新型コロナウイルス感染症 PCR 検査陰性を確認し、当院入院。輸液+プリンペラン 10 mg 点滴。夕食後、コートリル 30 mg/日を内服開始。</p> <p>2022/02/12 嘔気軽減、食欲改善。症状の回復を認めた。尿閉にてシロドシン、タダラフィル再開。</p> <p>2022/02/15 残尿量多く、デュタステリド錠 0.5 mg、ウブレチド錠 5 mg 開始。コートリル 15 mg/日に漸減。</p> <p>2022/02/17 残尿量改善し、退院。</p> <p>発熱、嘔気、嘔吐、食欲不振、悪寒、倦怠感、尿閉の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	---	--

<p>22249</p>	<p>代謝性アシドーシス；</p> <p>低酸素性虚血性脳症；</p> <p>心室性頻脈；</p> <p>心室細動；</p> <p>心肺停止；</p> <p>意識変容状態；</p> <p>痙攣発作；</p> <p>肺うっ血；</p> <p>頻呼吸</p>		<p>本例は、薬剤師による副反応報告症例である。</p> <p>2022/04/25 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/18 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/18 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/19 発熱が発現。</p> <p>2022/02/20 解熱傾向。腋窩腫脹、陰嚢痛が発現。</p> <p>2022/02/21 02:45頃 睡眠中に呼吸促迫、家人が呼びかけても反応がないなど意識障害を認めた。</p> <p>02:50 心室細動が発現。すぐに心肺停止となり、救急要請。家族が心肺蘇生実施。</p> <p>03:04 救急隊接触時、VF波形を認め、ショック4回、アドレナリン1回処置。</p> <p>03:18 心拍再開を確認。</p> <p>03:25 当院搬送時、BP 143/102、HR 129、BT 36.0、リザーバー8LでSpO2 95%と酸素化低下を認めた。胸部CTでは肺うっ血像を認めた。BNP 13.4 pg/mLと上昇なし、トロポニンI 17.800 pg/mLと上昇なし。血液ガス pH 6.885、HCO3⁻ 15.7、B.E- 19.0、PaO2 177.3、Lac 121と著明な代謝性アシドーシス、Lac上昇を認め、心肺停止時間がある程度あった事が予想された。ICU入室後、呼吸状態不安定であり、挿管管理となる。日中の心エコーでは、左室駆出率39%(diffuse hypo)と壁運動低下を認めた。入院。</p> <p>2022/02/22 入院後の血液検査ではCPK 2,613 U/L、CK-MB 79 U/L、トロポニンI 19,409 pg/mLと上昇あるが、心エコー再検では左室駆出率60%台と壁運動低下が改善。心筋炎の可能性が低く、特発性VT/VFによる心肺停止であったと診断。けいれん重積発作を認めた。アミオダロン、blocker導入。</p>
--------------	---	--	--

2022/02/24 脳波検査実施。5分以内の痙攣発作を頻回に認めた。

2022/02/28 呼吸状態は大きな問題はなかったが、意識状態は改善なく気管切開実施。

2022/03/01 人工呼吸器より離脱。

2022/03/03 頭部MRI検査実施。両側大脳の皮質、左頭頂葉の皮質下白質、脳梁膨大部、両側尾状核、両側小脳半球などがDWIにて高信号を認め、低酸素脳症を示す所見。NSE 178(CPA後52hr)と高値を認めている事と併せると神経学的予後は厳しいことが予想された。

2022/03/16 けいれん重積、ミオクローヌスに対して最終的にイーケプラ2,000 mg、ランドセン6 mg、ビムパット300 mg処方。

2022/03/28 胃瘻造設術実施。

2022/04/06 他院に転院。後遺症として低酸素脳症、覚醒度は自発開眼があるものの、随意運動や追視などは認めず、意思疎通困難が残る。

発熱の転帰は、軽快。腋窩腫脹(リンパ節腫脹)、陰嚢痛、呼吸促拍、意識障害、肺うっ血、代謝性アシドーシス、けいれん重積発作、低酸素脳症、ミオクローヌスの転帰は、不明。心室細動、心肺停止、突発性V Tの転帰は、回復したが後遺症あり。

追跡調査予定なし。

【脳波検査】(検査日:2022/02/24)

- ・基礎波が目立つ。低電位の も中心部から後頭部にみられる。
- ・光刺激:Driving(+)、右半球性に二相性棘波の群発。
- ・てんかん性放電:発作時、右前側頭部から始まり、右半球性に広がる。

			<p>【脳波検査】（検査日：2022/03/04）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記録状態：覚醒 ・基礎波かではないが、不規則な低電位の徐波と速波からなる。 ・開閉眼： -Blocking(-)。 ・光刺激：Driving(-)。 ・てんかん性放電：右側に二相性の棘波群発をみるが、前回よりは頻度
22251	不整脈； 心肺停止	狭心症	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033883）である。</p> <p>2022/03/14 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/17 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/18 18:30 最終健常。</p> <p>19:00頃 致死性不整脈が発現。風呂につかっているのを家族が発見し、救急要請。救急隊接触時、心肺停止。初期波形は心静止。</p>

19:40 当院救急外来入室。

19:48 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

19:52 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

19:57 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

20:00 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

20:03 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

20:06 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。

20:10 アドレナリン注 0.1%シリンジ 1 mg/mL 静脈注射。計 7 回静脈注射するも自己心拍再開せず。

20:11 死亡宣告。

20:24 死亡時画像診断 CT にて明らかな死因を指摘し得ず。

20:41 検視。死体検案書より、死因は致死性不整脈、発症から死亡までの期間は短時間。剖検なし。

致死性不整脈、心肺停止（CPA）の転帰は、死亡。

追跡調査予定なし。

22253	<p>心停止；</p> <p>心筋梗塞；</p> <p>心臓死；</p> <p>血栓症</p>	<p>糖尿病；</p> <p>脳梗塞；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034204）である。</p> <p>2022/03/17 医師より追加情報を入手した。</p> <p>糖尿病、高血圧症、脳梗塞後遺症で他院に通院中。</p> <p>2021/06/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/18 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/15 定期受診。特に異常なし。</p> <p>2022/02/17 調子が悪いとこのことで夕食摂取せず。発熱などなし。</p> <p>2022/02/18 軽食を摂取。</p> <p>2022/02/20 本剤3回目接種。夜、徘徊あり。</p> <p>2022/02/21 朝、頭部・右下腿に外傷を家族が確認。昼頃まで特に症状なし。</p> <p>18:00 過ぎ ベッドに寄りかかるように座っており、呼びかけるも反応なし。</p> <p>18:31 救急要請。</p> <p>18:44 救急隊到着、心肺停止を確認。心静止のため心肺蘇生開始し、当院へ搬送。アドレナリン2 A 使用。</p> <p>19:03 当院へ搬入。当院初診。心静止のまま、3分程度毎にアドレナリン計8 A 使用し、心肺蘇生するも波形変わらず。心拍再開なし。</p> <p>19:39 死亡確認。CTにて死後時画像診断施行。頭部、胸腹部で明らかな原因なし。採血でも特定に至らず、警察による検死も行い外因要因なしの判断となり、死因は内因性心臓死とした。Dダイマー高値などから血栓症や心筋梗塞の可能性あり。</p>
-------	---	------------------------------------	---

			<p>徘徊、頭部・右下腿に外傷の転帰は、不明。A s y s t o l e、血栓症の可能性、心筋梗塞の可能性の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22254	アナフィラキシーショック	脳性麻痺	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034208）である。</p> <p>2022/03/11 医師より追加情報を入手した。</p> <p>アナフィラキシーショックは企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/29 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 入院。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5度</p> <p>2022/02/17 13:50 本剤3回目接種。</p> <p>14:15 アナフィラキシーショックが発現し、嘔吐少量あり。顔色不良、意識レベル低下なし。BP:87/50 mmHg(通常 120-140/70-80 mmHg)、P:58(通常 70-80)、SpO2:96%、T:36.4度。ベッドへ臥床させ、モニター装着。</p> <p>14:35 嘔気軽度持続。嘔吐なし。BP:88/51 mmHg、P:61、SpO2:98%。</p> <p>14:40 末梢血管確保、ラクテック G 500 mL 点滴開始。BP:123/67</p>

		<p>mmHg。</p> <p>14:55 ソル・メドロール静注用 125 mg+生食 100 mL 側管より点滴開始。顔色改善。通常通り会話可能となり、症状の回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシーショックの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22255	<p>ショック；</p> <p>心筋炎</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033899）である。</p> <p>2022/03/27 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022582）を入手した。</p> <p>2022/03/28 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師より副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034910）を入手した。</p> <p>2021/06/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温:36.1 。</p> <p>2022/02/07 16:30 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/02/08 08:00 心筋炎が発現。息切れ、体動困難あり。</p> <p>2022/02/09 外来受診。血圧 112/62、体温 37.0、SpO2 96%（RA）。血液検査にてCK 9,572 U/L、CK-MB 78.5 U/L、トロポニンT 0.1 ng/mL、CRP 7.16 mg/dL、D-ダイマー 3.2 mcg/mLと上昇。心電図ではV4-6の平坦T波を認めた。入院。</p>

		<p>2022/02/12 呼吸状態悪化。息切れ、多呼吸を認めた。心電図でV2-6のST低下、陰性T波を認め、心筋炎の所見。心臓超音波検査は左室駆出率30%、右室又は左室の局所又はびまん性の機能異常、前壁収縮低下を認めた。ショック状態となる。利尿剤、昇圧剤、強心剤に反応なし。15:44 死亡。</p> <p>心筋炎、ショック状態の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22258	アナフィラキシー反応	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034069）である。</p> <p>2022/03/17 医師より追加情報を入手した。</p> <p>アナフィラキシー反応は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/04/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/04/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/02/15 14:13 本剤3回目接種。右肩に筋注。</p> <p>14:43 アナフィラキシー反応が発現。嘔気を訴え、唾液を吐きつつ、えづいた。頸部、体幹に蕁麻疹、頸部、前胸部にかゆみ、発赤が出現。血圧142/102 mmHg、体温36.3、意識低下を認めた。生理食塩水500 mLでルート確保。かゆみ抑制のため、抗ヒスタミン剤のポララミン5 mg+生理食塩水100 mLを側管より投与。</p> <p>14:55 乾性咳嗽が発現し、連続した。喘鳴聴取なし。SpO2低下なし。咳嗽発作抑制のため、ステロイド剤のプレドニゾン注20 mg+生理食</p>

			<p>塩水 100 mL を側管より投与、気管支拡張剤のムコフィリン 2 mL・メプチン 0.5 mL 吸入を施行。</p> <p>15:22 咳嗽、嘔気軽減。</p> <p>16:05 顔色回復。だいぶ楽になったと発言あり。状態回復と判断し、帰宅許可。経過を通じ、血圧低下や SpO2 低下を認めなかった。</p> <p>2022/02/16 前日 14:30 頃より朝までの記憶なし。</p> <p>2022/02/17 昼食まで嘔吐、嘔気のため摂食困難。経過より、プライトン分類に基づきアナフィラキシー（レベル 3）と診断。</p> <p>12:00 頃 症状消失し回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22260	間質性肺疾患	<p>シェーグレン症候群；</p> <p>心房細動；</p> <p>間質性肺疾患；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033821）である。</p> <p>シェーグレン症候群に伴う間質性肺炎にて無治療、経過観察中。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。明らかな副反応なし。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。明らかな副反応なし。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.4 。</p> <p>2022/02/15 11:15 頃 本剤 3 回目の接種。20:00 頃 間質性肺炎が発現。安静時に呼吸困難あり。</p> <p>2022/02/16 02:00 頃 発熱あり。</p>

			<p>2022/02/17 当院受診。両肺間質影、LD、KL-6、CRP 上昇あり、SpO2 低下のため入院。</p> <p>間質性肺炎の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22272	<p>痙攣発作；</p> <p>発熱；</p> <p>脳梗塞</p>	<p>塞栓性脳卒中；</p> <p>心房細動</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033858）である。</p> <p>心原性脳梗塞の後遺症で ADL は食事以外は全介助で寝たきりの患者。心房細動を伴うが抗 Xa 剤等の内服で安定していた。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5 。</p> <p>2022/02/09 13:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/10 07:00 頃 発熱を伴う一過性の全身けいれんあり。午後、再び全身けいれんあり。本院に入院。入院時、症状は改善。頭部 CT で所見なく、CRP も陰性。脳梗塞の再発と考え、グリセオール等の投与を施行したが、安定。</p> <p>2022/02/14 食事を開始。</p> <p>2022/02/21 経過良好。症状の回復を認め、退院。</p> <p>発熱を伴う全身けいれん、脳梗塞の再発の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>

22276	<p>大動脈解離；</p> <p>心肺停止；</p> <p>意識消失</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>2022/03/09 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022568）、医療品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034432）を入手した。</p> <p>2021/06/13 11:00 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/04 11:00 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.8。</p> <p>2022/02/23 10:00 本剤3回目接種。接種後、軽い頭痛を認めたが独歩で自室に戻り、食事も摂取していた。</p> <p>17:45 転倒、意識消失し心肺停止。意識ないことを確認し、心肺蘇生法を開始。救急要請とともに心電図は心静止であったためアドレナリン静注を行った。その後、波形は無脈性電気活動になるも心拍再開には至らず。</p> <p>18:57 搬送先で死亡確認。死亡時画像診断施行。大動脈解離の所見あり。大動脈に胸水、血が混ざっていた。</p> <p>頭痛、転倒、意識消失の転帰は、不明。心肺停止、大動脈解離の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	--	---

22277	<p>そう痒症；</p> <p>呼吸困難；</p> <p>異常感；</p> <p>発声障害；</p> <p>眼瞼浮腫；</p> <p>紅斑；</p> <p>腹痛</p>		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した会場統括者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033900）である。</p> <p>2021/03/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/04/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 気道閉塞を起こし、入院。</p> <p>日付不明 退院。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.8。</p> <p>2022/02/18 10:51 本剤3回目接種。</p> <p>11:05 のどの違和感、全身の痒みが発現。喉のイガイガ感を訴えた。医師診察し、浮腫なし。腹痛あり。</p> <p>11:10 腹部、大腿のそう痒感あり。腹部発赤、大腿軽度発赤あり。医師診察。11:30まで経過観察の指示あり。薬剤投与なし。Sat 96%、HR 96回/分。</p> <p>11:20 喉のイガイガ感増強。軽度嘔声。全身のかゆみ増強。背部、胸部、顔面に軽度発赤、腹痛あり。</p> <p>11:25 点滴ライン確保。ポララミン5 mg+ガスター20 mg+生理食塩水100 mL投与の指示あり、投与。眼瞼浮腫あり。Sat 98%、BP 109/70、HR 86回/分。</p> <p>11:45 そう痒感軽減。全身の発赤消失。</p> <p>12:27 息がしづらいと訴えあり。Sat 99%。</p> <p>12:30 咽頭浮腫なし。医師よりかかりつけの救急外来に行くよう提案あり。</p> <p>12:50 アナフィラキシーの疑いがあり、病院へ向かい退場。</p>
-------	--	--	---

			<p>のどの違和感、全身の痒み、腹痛、発赤、嘔声、眼瞼浮腫、息がしづらいことの転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22278	心膜炎	妊娠	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033918）である。</p> <p>心膜炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/05/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/09 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.5度。</p> <p>2022/02/11 10:00 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/02/13 20:00 心膜炎が発現。夜間より胸部圧迫感、両下顎の関連痛、息切れあり。</p> <p>2022/02/14 病院受診。心電図でST変化、採血で高感度トロポニンT、CRP、Dダイマーの上昇を認めた。バイタルは安定しており、心エコーでも心収縮良好で心嚢水液貯留は認めなかったため、軽症の心膜炎の可能性を考慮し、経過観察。</p> <p>2022/02/18 再診。症状の改善、心電図でSTの正常化、採血でトロポニンの改善を認めた。症状は軽快。</p>

		<p>心膜炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22279	ギラン・バレー症候群	<p>本例は、当社 MR を介した薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/03/01 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて薬剤師より副反応報告症例(厚生労働省受付番号：v2110034018)を入手した。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。接種後 1 週間感冒症状を認めた。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種 1 週間後、脱力感、全身の痛みがあり当院紹介。GM1 IgM 陽性で免疫性自律神経ニューロパチー (ギランバレー症候群) の診断。</p> <p>2022/02/16 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/23 脱力感、全身の痛みがあり、当院紹介。ギランバレー症候群を認め、入院となる。</p> <p>2022/02/28 現在、入院中。症状は未回復。</p> <p>ギランバレー症候群の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>

22285	脳出血		<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022558）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033951）である。</p> <p>2022/03/15 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/23 14:00 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/14 14:00 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/16 14:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/17 脳出血が発現。</p> <p>2022/02/18 16:00 前より呂律困難、37.7 の発熱を認めた。CTにて脳出血を認め、入院。</p> <p>2022/02/25 症状は未回復。</p> <p>脳出血の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22291	味覚障害； 悪寒； 記憶障害	高血圧	<p>本例は、武田薬品工業株式会社が、モデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022560）である。</p> <p>2022/03/22 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 新型コロナウイルスワクチン（製品名不明）1回目接種。</p>

			<p>2021/06/21 16:46 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/21 09:43 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/22 悪寒、発熱が発現。その後、味覚障害、記憶力障害を認めた。</p> <p>2022/02/28 新型コロナ感染症に対する PCR 検査を施行し、結果は陰性。新型コロナ感染症ではないことを確認。</p> <p>2022/03/01 症状の回復を認めた。</p> <p>発熱の転帰は、不明。</p> <p>悪寒、味覚障害、記憶力障害の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22294	<p>ショック；</p> <p>代謝性アシドーシス；</p> <p>低血糖；</p> <p>凝血異常；</p> <p>多臓器機能不全症候群；</p> <p>循環虚脱；</p> <p>肝機能異常；</p> <p>脱水；</p> <p>腎機能障害；</p> <p>腸管虚血；</p>		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033952）である。</p> <p>2022/03/22 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/18 左腕に本剤 3 回目接種。投与後より、左腕の痛みが発現。</p> <p>2022/02/19 左腕の痛みが継続。全身の疼痛など出現。</p> <p>2022/02/20 貧血様症状等あり、何度か倒れる。夕方より、四肢の筋肉がつる症状を訴えた。</p> <p>2022/02/21 朝、立ち上がっても動けない状態。午後、自宅で倒れて動けない状態を家族が発見。当院へ救急搬送。来院時意識レベル JCS</p>

	<p>血栓症</p>		<p>10、体幹・四肢は循環不全を疑う色調、呼吸回数 40 回、SpO2 は測定不能。血液ガスでは著明な代謝性アシドーシス、低血糖を認め、血圧は 70 mmHg 台のショック状態。採血では著明な血管内脱水、肝腎機能障害、D ダイマー高値など凝固異常を認め、血栓症の疑いあり。ブドウ糖投与、細胞外液の全開投与も実施。全身 CT では明らかな異常は認めないが、原因不明のショック状態であり、多臓器不全も認めため、高度救命救急センターへ転送。</p> <p>日付不明 非閉塞性腸管虚血のため手術実施。何らかの全身性血栓症発症の可能性が疑われる。</p> <p>全身の疼痛、倒れた、四肢の筋肉がつる症状、循環不全、代謝性アシドーシス、低血糖、ショック、血管内脱水、肝腎機能障害、凝固異常、多臓器不全、非閉塞性腸管虚血、全身性血栓症の可能性の転帰は、不明。肝腎機能障害の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
<p>22297</p>	<p>低酸素症； 呼吸困難； 間質性肺疾患； 食欲減退</p>	<p>脂質異常症； 良性前立腺肥大症； 高血圧； C 型肝炎</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034271）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/02/10 本剤 3 回目接種。発熱、労作性の息切れが発現。咳嗽、喀痰なし。</p> <p>2022/02/11 食思不振、38 台の発熱あり。</p> <p>2022/02/16 呼吸困難、低酸素血症、間質性肺炎が発現。緩徐に息切れ増悪のため、近医を受診。SpO2 86%、CRP 9.9、Nt-proBNP 1,192 で心筋炎疑いであったが、心臓超音波検査では問題なし。CT で両肺に広範なすりガラス影を認めた。</p> <p>2022/02/17 意識清明であるが、リザーバマスク 8 L で SpO2 96%。入院。ICU 入室の上、挿管、人工呼吸器管理となった。メチルプレドニ</p>

			<p>ゾロン 1,000 mg+TAZ/PIPC 4.5 g q8 を投与。</p> <p>2022/02/20 プレドニゾロン 50 mg 投与。ガラス影は改善傾向となり、抜管。</p> <p>2022/02/23 日常生活動作回復傾向。</p> <p>2022/02/25 症状の回復を認めた。</p> <p>食思不振、呼吸困難、低酸素症、間質性肺炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22299	脳症	<p>下肢骨折；</p> <p>便秘；</p> <p>白内障；</p> <p>薬物過敏症；</p> <p>虫垂炎；</p> <p>食道炎；</p> <p>骨粗鬆症；</p> <p>高脂血症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医療関係者による報告である。</p> <p>2022/03/02 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医療関係者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034047）を入手した。</p> <p>2022/04/01 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/02/20 通常の電話対応が可能。異常なし。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.6 。</p> <p>2022/02/21 10:18 本剤 3 回目接種。夜以降、記憶が曖昧、携帯電話の使い方がわからず、言葉も不明瞭になる。</p> <p>2022/02/23 体調が悪いと訴えた。体のふらつき、物忘れを認めた。</p> <p>2022/02/25 当院受診。BP 134/74、SpO2 98%、HR 83/分。B P P V としてメリスロン 3 錠、アデホスコワ 3 包処方。</p>

			<p>2022/02/26 前日来院したことを覚えていないとのこと。健忘、不随意運動あり。内科を受診。頭部 CT 異常なし。リボトリール 0.5 mg1錠を 2 日間内服。</p> <p>2022/02/28 不随意運動消失。眠くて困るとのことでリボトリール中止。少しはっきりして記憶はヒントがあるとわかるようになってきた。</p> <p>2022/03/07 眠くてボーッとした感じは少し改善されたが、元気な時に比べると眠いとのこと。症状の軽快を認めた。</p> <p>不随意運動の転帰は、回復。体調不良、BPPV、物忘れ、眠さ、脳症の疑いの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22301	心膜炎	<p>冠動脈バイパス;</p> <p>糖尿病;</p> <p>高脂血症</p>	<p>本例は、当社 MR を通じて入手した医師による報告である。</p> <p>2022/03/22 当社 MR を通じて医師より追加情報を入手した。</p> <p>2022/03/25 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2019/10/21 冠動脈バイパス術施行。LITA-LAD、RITA-D1、Ao-SVG・D1-#14、RGEA・R4PD-#4PL。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/19 本剤 3 回目の接種。</p> <p>2022/02/22 胸痛あり。心膜炎が発現。</p> <p>2022/02/24 胸痛が回復。</p> <p>2022/02/25 14:00 胸痛、胸部圧迫の症状があり当院受診。心電図で ST 上昇を認めた。心臓カテーテル検査を実施したところ問題なかった</p>

		<p>が、経過観察のため入院。</p> <p>日付不明 入院後、経過観察を実施したが、問題がないと判断。</p> <p>2022/03/02 症状の軽快を認めた。</p> <p>心膜炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22305	蓄膿	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>蓄膿症は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/19 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/21 蓄膿症が発現。</p> <p>日付不明 症状の回復を認めた。</p> <p>蓄膿症の転帰は、回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

22306	突発性難聴	<p>本例は、当社窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>突発性難聴は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 39.5 の発熱が 3 日継続。血尿、膀胱炎、突発性難聴、倦怠感が発現。</p> <p>2022/02/24 倦怠感が 3 週間継続している。</p> <p>発熱、血尿、膀胱炎、突発性難聴、倦怠感の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22309	性器出血	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>不正出血は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07/17 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/08/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/15 生理 1 日目。</p> <p>2022/02/23 本剤 3 回目接種。</p>

		<p>日付不明 接種後、38.7 の発熱、頭痛、全身筋肉痛、首下リンパ節の痛み、立ちくらみ、不正出血が発現。</p> <p>2022/02/27 不正出血の症状あり。</p> <p>発熱の転帰は、回復。頭痛の転帰は、軽快。全身筋肉痛の転帰は、未回復。首下リンパ節の痛み、立ちくらみ、不正出血の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22315	心臓弁膜疾患	<p>アレルギー性鼻炎；</p> <p>末梢性ニューロパチー；</p> <p>末梢血管障害；</p> <p>神経痛；</p> <p>糖尿病；</p> <p>緊張性膀胱；</p> <p>胃食道逆流性疾患；</p> <p>脂質異常症；</p> <p>脳出血；</p> <p>脳梗塞；</p> <p>骨粗鬆症；</p> <p>高血圧</p> <p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034391）である。</p> <p>2022/03/19 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022576）を入手した。</p> <p>2022/03/29 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/22 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/13 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/19 定期診察。状態安定。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/02/26 11:10頃 本剤3回目接種。特に問題なく帰宅。</p> <p>2022/02/27頃 突然死した。</p> <p>2022/03/01 朝、自宅の廊下で倒れており、死亡した状態で発見。</p> <p>日付不明 検死の結果、自然死と判断。2022/02/27から2022/02/28朝の間に死亡したと判断。剖検なし。死因は心臓弁膜症。</p>

			<p>心臓弁膜症の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22325	アナフィラキシー様 反応	食物アレルギー	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034169）である。</p> <p>2022/03/28 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.2。</p> <p>2022/03/02 09:58 本剤3回目の接種。</p> <p>10:15 アナフィラキシー様反応が発現。息苦しさ、喉が詰まる感じの咽頭違和感、咳嗽が出現。ボスミン0.3 mL皮下注射、酸素マスク3 L。両肺に軽度喘鳴あり、血圧158/88 mmHg、体温36.2、ソルデム3A 200 mL+ハイドロコートン300 mgを点滴静脈注射。</p> <p>10:30 咳嗽軽減するが、少し息苦しさ残る。肺ラ音なし。</p> <p>11:10 点滴終了時、症状消失。回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシー様反応の転帰は、回復。</p>

			追跡調査予定なし。
22327	出血		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>出血は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/08 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/26 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 悪寒、疲労が発現。</p> <p>2022/02/27 00:00 頃 血液のようなものが下着に付着していた。出血は一度のみであった。</p> <p>2022/02/28 婦人科を受診。本剤副反応の疑い。</p> <p>悪寒、疲労、出血の転帰は、軽快。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

22329	嘔吐; 浮動性めまい; 発熱		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/27 12:00 頃 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/28 00:00 熱、倦怠感、筋肉痛、食欲不振、嘔吐、めまいが発現。</p> <p>02:00 頃 嘔吐、めまいが酷く、病院に搬送。38.7 の熱あり。PCR 検査は陰性。</p> <p>20:00 頃 薬処方され、帰宅。</p> <p>熱(38.7)、倦怠感、筋肉痛、食欲不振、嘔吐の転帰は、不明。めまいの転帰は、未回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22332	間質性肺疾患	肺結核	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2110034048) である。</p> <p>2022/03/23 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/05 本剤 3 回目接種。接種後、発熱はなかったが全身倦怠感が持続。</p>

		<p>2022/02/18 38.5 の発熱あり。</p> <p>2022/02/19 間質性肺炎が発現。発熱が持続するため、当院受診。CTで肺炎像あり。コロナ PCR 陰性で間質陰影呈しており、間質性肺炎と診断。マスク 4 L の酸素需要あり、入院。ステロイド治療を開始し、プレドニン 60 mg を点滴。自己抗体陰性等、その他誘因となりうる所見認めず、症状出現経過より、本剤関連薬剤性肺炎と判断。</p> <p>日付不明 呼吸状態や肺炎像は徐々に改善。</p> <p>2022/03/10 プレドニン 40 mg 内服まで減量。室内気で自宅退院。症状の軽快を認めた。今後は近医で加療継続予定。</p> <p>間質性肺炎の転帰は、軽快。全身倦怠感の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22333	<p>発熱；</p> <p>筋力低下；</p> <p>運動障害；</p> <p>高カリウム血症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034135）である。</p> <p>2021/07/12 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/03 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/02/20 本剤 3回目接種。</p> <p>2022/02/21 08:00 頃 発熱、上肢脱力、体動困難、高CK血症が発現。</p> <p>18:00 過ぎ、経過を診ていたが改善しないため、救急車を要請。</p> <p>19:00 当院救急外来を受診。精査加療目的に当院入院。</p> <p>2022/02/22 採血でCKが6,497と高値。</p>

		<p>日付不明 点滴による対症療法にて症状改善。脳 CT では明らかな異常なし。</p> <p>2022/02/24 CKが2,701まで下降。症状の回復を認め、退院とした。</p> <p>発熱、上肢脱力、体動困難、高CK血症の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22334	<p>呼吸困難；</p> <p>心筋炎；</p> <p>悪寒；</p> <p>発熱</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/01 20:00 頃 本剤 3 回目の接種。40.3 の発熱、悪寒、息苦しさが発現し、救急搬送。心筋炎の疑いと診断された。軽症のため入院せず。</p> <p>2022/03/02 薬を内服し、経過観察中。</p> <p>発熱(40.3)、悪寒、息苦しくなった、心筋炎の疑いの転帰は、未回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

22337	嘔吐; 誤嚥性肺炎	<p>アルツハイマー型認知症;</p> <p>ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症;</p> <p>心房細動;</p> <p>慢性心不全;</p> <p>眼外傷;</p> <p>脳梗塞;</p> <p>蓄膿;</p> <p>高尿酸血症;</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034392）である。</p> <p>2022/03/23 追加情報として、武田薬品工業株式会社が、モデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022579）を入手した。</p> <p>2022/03/24 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師より副反応報告症例(厚生労働省受付番号：v2110034794)を入手した。</p> <p>蓄膿症からの手術痕に対して放射線治療中に受傷し、右眼球損傷した被接種者。アルツハイマー型認知症の程度はFAST5-6。</p> <p>2021/07/02 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/31 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温:36.8。</p> <p>2022/02/15 14:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/16 09:00 嘔吐、誤嚥性肺炎が発現。</p> <p>20:30 多量に嘔吐し、吸引した刺激で再度嘔吐あり。顔色不良、SpO2 80%台、レベルはクリア。BP 160/80、P 100、発熱なし。医師に報告。訪問した際には顔色も戻り、SpO2 91-93%、やや喘鳴あり。受け応えはいつもと変わらず、様子観察。変化あれば再度連絡するよう指示。</p> <p>2022/02/17 09:00 KT 37.8。ラクテック G 500 mL 投与開始。</p> <p>13:30 吐後、発熱し、一過性に SpO2 低下。その後、発熱はなく腹部圧痛も軽度。脱水で虚脱のように見える。水分摂取後、経口摂取は可能な限りで指示。</p> <p>15:30 KT 36.7、SpO2 88-91%(room air)。</p> <p>17:50 KT 38.6。</p> <p>2022/02/18 在宅酸素療法導入。ロセフィン 2 g+生理食塩水注 100</p>
-------	--------------	--	--

			<p>mL、ラクテック G 500 mL×1 を投与。BP 146/83、P 87、BT 38.8、酸素 3 L 下で SpO2 92%。</p> <p>2022/02/19 朝、熱発、嘔吐あり。BP 110/77、P 72、BT 37.7、酸素 4 L 下で SpO2 93%。ラクテック G 500 mL 投与終了。</p> <p>2022/02/20 朝食は全量、昼食は半量摂取。夜は熱発を繰り返し 38.6 あり、夕食は食べず。</p> <p>2022/02/21 BP 119/86、P 85、KT 36.8、SpO2 91%、酸素 3 L 流量中。</p> <p>2022/02/25 朝昼の食事だけ再開。覚醒している時は 5-8 割摂取。</p> <p>2022/02/26 昼間、酸素 1 L 投与。夜間、酸素 3 L 投与で様子見。褥創みられ、仙骨部中心部に黒色の変色あるため、ゲーベン塗布。</p> <p>2022/02/27 ラクテック G 500 mL×1 点滴施行。BP 122/81、P 70、KT 37.1、SpO2 94%。酸素 1 L にすると SpO2 90%以下になることもあり、3 L のまま継続中。</p> <p>2022/03/02 ラクテック G 500 mL 点滴施行。BP 126/80、P 62、KT 36.6、酸素 3 L 下で SpO2 100%。朝昼に食事を半分以上は摂取できている。</p> <p>顔色不良の転帰は、回復。腹部圧痛、脱水、褥瘡の転帰は、不明。嘔吐、誤嚥性肺炎の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22338	<p>ワクチン接種部位紅斑；</p> <p>ワクチン接種部位腫脹；</p> <p>尿失禁；</p> <p>記憶障害；</p>	<p>意識消失；</p> <p>神経痛</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022563）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034162）である。</p> <p>30年以上前に歯科にて、神経痛の注射で意識消失の既往あり。</p>

<p>転倒</p>		<p>2021/06/21 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07/12 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温 : 36.7 。</p> <p>2022/02/25 15:30 本剤 3 回目の接種。</p> <p>2022/02/26 23:00 接種部位腫脹・発赤が発現。深夜、気がついたら尿失禁状態で倒れていた。前後の状況の記憶ははっきりせず。その後、就眠。</p> <p>2022/03/01 病院受診、来院時まで意識問題なし。左上腕接種部位を中心とする 15 cm 程度の皮膚発赤あり。症状の軽快を認める。</p> <p>接種部位腫脹・発赤、尿失禁、倒れた、記憶がはっきりしないの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
<p>22339</p>	<p>不整脈; 出血; 失神; 心室細動; 心肺停止; 無脈性電気活動</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2110034188) である。</p> <p>2022/04/26 薬剤師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/01/27 午後、本剤 3 回目接種。夜、就労。</p> <p>2022/01/28 朝、帰宅。その後、発熱が発現。</p> <p>2022/01/29 朝、解熱。歯科受診し、親知らずを抜歯。</p> <p>20:06 失神、失禁で家族に連絡。数秒後、目が上転し意識消失。</p>

20:11 心肺停止状態で発見。家族が心肺蘇生法開始。救急隊接触時、致死性不整脈、心房細動を認め、AED 作動し、DC を 2 回実施。

20:43 吸引後 PEA にラリングルチューブ挿入。

20:49 当院到着。口腔内、気管支、鼻からの出血があった。蘇生、投薬されるも、効果なし。

20:59 人工心肺、循環補助装置装着後、集中治療を開始。冠動脈造影検査では有意狭窄認めず。心筋生検では特記すべき事項なし。

21:22 頭部 CT 施行。くも膜下出血なし。脳出血なし。硬膜下血腫なし。硬膜外血腫なし。骨折なし。脳浮腫なし。脳室、脳溝の拡張なし。眼窩内に特に異常は見られない。撮影範囲内の副鼻腔は clear。脳血管障害は見られない。

21:25 肺-骨盤 CT 施行。両肺広範囲間質影の診断。胸部、腹部腫瘍は見られない。

胸部:大静脈剥離なし。大動脈瘤なし。心嚢内液体貯留なし。胸腔内液体貯留なし。縦隔液体貯留なし。冠血管起始異常不明。冠血管石灰化なし。気胸なし。縦隔内気腫僅か。両肺にすりガラス影が広範囲にみられる。上葉上部、両肺下葉背側に認められ、間質影だが鑑別が難しい。縦隔、肺門、腋窩のリンパ節腫大なし。

腹部:大動脈解離なし。大動脈瘤なし。後腹膜血腫なし。胃内容液貯留あり。腹腔内液貯留なし。脾腫大なし。肝内の占拠性病変なし。胆嚢、胆管の拡張なし。腎、脾、副腎には特に異常なし。リンパ節腫大なし。腸管壁肥厚なし。スキャノ像にて、両側上肢、近位大腿の骨に明らかな異常なし。

2022/02/01 05:33 死亡。死因は心室細動と診断。希望されなかったため剖検なし。

発熱の転帰は、回復。失神、失禁、出血の転帰は、不明。心肺停止、致死性不整脈、PEA、心室細動の転帰は、死亡。

追跡調査予定なし。

22342	スチル病； 肝障害		<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/10 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/21 成人スティル病が発現。発熱、肝障害、リンパ節腫脹を 発症し、入院。</p> <p>日付不明 発熱持続。</p> <p>2022/02/28 ステロイドパルス療法施行。</p> <p>2022/03/04 症状の回復を認めた。</p> <p>成人スティル病、肝障害の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22343	無力症； 血栓性脳梗塞	喘息； 白内障； 糖尿病； 脂質異常症； 脳梗塞； 高血圧	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した治験コーディネーターによる副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034170）である。</p> <p>2022/03/18 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて治験コーディネーターより副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034679）を入手した。</p> <p>2002 年頃に脳梗塞発症した歴あり。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p>

			<p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.3 。</p> <p>2022/03/02 16:00 本剤 3 回目接種。</p> <p>18:00 食事中に脱力、手指の違和感出現。その直後、立位動作時に転倒、意識消失なし。</p> <p>22:30 一過性脳虚血発作疑いで、一次救急医療機関より当院救急救命室へ転送。精査の結果、ラクナ梗塞の診断で入院。確定診断はアテローム血栓性脳梗塞。急性期治療に準じた保存的治療開始。バイアスピリン、クロピドグレルを初回ローディング投与。</p> <p>2022/03/03 アルガトロバン、エダラボン併用開始。</p> <p>2022/03/09 アルガトロバン、エダラボン併用中止。</p> <p>2022/03/11 バイアスピリン中止し、クロピドグレル単剤へ移行。後遺症として右上下肢片麻痺が残る。回復期医療機関へ転院。</p> <p>脱力、アテローム血栓性脳梗塞の転帰は、後遺症あり。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22344	<p>悪性症候群；</p> <p>播種性血管内凝固；</p> <p>窒息；</p> <p>誤嚥</p>	<p>糖尿病；</p> <p>認知症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034152）である。</p> <p>2022/03/24 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/09 本剤 3 回目の接種。接種後、特に問題なく帰宅した。</p> <p>2022/02/10 悪性症候群、DIC が発現。午後 動けなくなったため病院</p>

		<p>受診、血液検査、画像検査に大きな異常なく、経過観察とした。その後動くことが出来ず、食べることも出来なかった。ネキシウム、ジヤヌビア、メトグルコ、ドネペジル、リスペリドン、ピペリデン、ルネスタの投与中止。</p> <p>2022/02/11 朝 高熱、意識混濁、SpO2 60%となり、当病院へ搬送。悪性症候群、DIC、痰または吐物の誤嚥、ちっ息を診断し、入院。</p> <p>日付不明 それぞれに対し加療を行い、改善。</p> <p>2022/02/17 症状の回復を認めた。</p> <p>2022/03/03 退院。</p> <p>悪性症候群、DIC、誤嚥、ちっ息の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22345	内出血	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>内出血は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 内出血を認めた。</p> <p>内出血の転帰は、不明。</p>

			<p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22347	死亡		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034246）である。</p> <p>2022/04/07 くすり相談窓口を通じた看護師からの追加情報を入手した。</p> <p>2022/04/20 医師より追加情報を入手した。</p> <p>血圧とコレステロールの薬を内服中の被接種者。</p> <p>2021/06/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.7。</p> <p>2022/03/02 13:40 来院時の体温 35.7、血圧 155/60 mmHg（普段は 110-120/60 mmHg）、脈拍 84 回/分、SpO2 96%。頭痛なし、眼華閃発なし。</p> <p>14:04 本剤 3 回目接種。接種後、15 分待機。</p> <p>14:19 看護師が接種 15 分後に観察し、喉のかゆみなし、息苦しさなし、発赤などなし、気分不良なし、倦怠感なし、嘔気なし、胸痛なし、手足のしびれなし。その他症状ないことなどを確認。</p> <p>14:20 特に状態変化なく終了。看護師が接種後の注意点を説明した後、帰宅。</p> <p>2022/03/03 夕方連絡がつかず、風呂場の浴槽で死亡を確認。詳細不明。</p>

			追跡調査予定なし。
22349	嘔吐； 悪心； 意識変容状態； 発熱； 転倒	食物アレルギー； 高血圧	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034388）である。</p> <p>2021/06/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.1。</p> <p>2022/02/03 15:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/04 00:00 普段通りであった。08:30頃 意識障害、嘔気、嘔吐が発現。倒れているのを発見され、当院へ救急搬送。来院時の意識レベルはJCS 1-1、GCS 14（E4V5M6）と軽度意識障害がみられており、嘔気症状が強く見られていた。意識レベル以外の来院時バイタルは体温 38.8、血圧 168/108 mmHg、心拍数 88/分、SpO2 は酸素経鼻 1 L/分投与下で 96%であり、身体所見では心音整、呼吸音清、気道狭窄音なし、腹部平坦軟で圧痛なく腸蠕動音正常、全身に皮疹なく、神経学的所見も明らかなものは見られなかった。血液検査、尿検査、頭部 CT 検査、体幹部造影 CT 検査、頭部 MRI 検査では、意識障害、嘔気、嘔吐、発熱の原因となる所見は見られず、本剤による副反応が考えられた。入院。</p> <p>2022/02/06 意識レベルは清明、酸素投与も離脱できる状態。</p> <p>2022/02/08 退院。</p> <p>2022/02/17 症状の回復を認めた。</p>

			<p>意識障害、倒れた、嘔気、嘔吐、発熱の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22352	アナフィラキシー反応	<p>アナフィラキシー反応; 抑うつ症状</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師以外の接種者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034212）である。</p> <p>アナフィラキシーの既往あり。抑うつ症の治療中。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 下痢、吐気、関節痛、発熱が発現。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3 。</p> <p>2022/03/03 15:50 本剤3回目接種。</p> <p>15:58 アナフィラキシー反応が発現。両手、両下肢のしびれ、口渇あり、瞼重い。バイタル安定するも、めまい、吐気出現。眼瞼浮腫（±）。</p> <p>16:05 医師指示にてボスミン0.3 mL 筋肉注射。</p> <p>16:17 左手しびれは軽減するも他症状変わらず。頭痛出現。</p> <p>16:25 救急車要請。前胸部に発疹出現。</p> <p>16:45 救急搬送。</p>

			<p>アナフィラキシー反応の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22354	<p>心筋炎； 悪性症候群</p>	<p>うつ病； 2型糖尿病</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034213）である。</p> <p>2022/04/01 医師より追加情報を入手した。</p> <p>急性心筋炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>うつ病に対しサインバルタ内服中であり、リハビリ目的に入院中の被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6 。</p> <p>2022/02/23 09:00 本剤3回目接種。</p> <p>16:00頃 37.8 の微熱が出現し、解熱剤を用いて経過観察。</p> <p>2022/02/24 08:00頃 急性心筋炎、悪性症候群が発現。40 の発熱、発汗を認めた。傾眠で呼びかけに反応するが発語なし、振戦を認めた。心電図検査でT波平低化を認めた。心臓超音波検査で左室駆出率69%、異常所見なし。頭部CTで異常なし、血液検査でCK 4,310 U/L、TropI 3.86、トロポニンT 2.310 ng/mL、CRP 4.16 mg/dL、ESR（1時</p>

間値) 27 mmの上昇を認めた。

2022/02/25 発熱、意識障害は遷延しており、データも含めて悪性症候群の診断基準を満たすことから、ダントロレン 40 mg を点滴静脈注射開始。HR 120 台。

2022/02/26 ダントロレン 100 mg 投与。MAX KT 38.8 、HR 117 bpm、MAX CK 44,420 U/L、Tnl 1.17。

2022/02/27 ダントロレン 60 mg 投与。KT 37.0 、HR 88 bpm、CK 39,930 U/L、Tnl 0.24 。

2022/02/28 ダントロレン 40 mg 投与。KT 37.3 、HR 85 bpm、CK 30,930 U/L、Tnl 0.12 。

2022/03/01 ダントロレン 40 mg 投与。KT 36.9 、HR 85 bpm、CK 19,980 U/L、Tnl 0.08 。

2022/03/02 ダントロレン 20 mg 投与。KT 37.6 、HR 111 bpm、CK 11,380 U/L。

2022/03/03 ダントロレン中止後も発熱、頻脈なく、振戦も消失。その後、CK は徐々に低下。

2022/03/05 悪性症候群の軽快を認めた。

2022/03/14 CK 94 U/L と正常化。

日付不明 急性心筋炎の回復を認めた。

急性心筋炎の転帰は、回復。悪性症候群の転帰は、軽快。

追跡調査予定なし。

22357	過敏症		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者の家族からの報告である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/02 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/03 嘔吐、蕁麻疹、発熱が発現。救急車を要請し、搬送。皮膚科に行くように言われ、その日の中に帰宅。</p> <p>2022/03/04 皮膚科を受診。本剤のアレルギーだろうと診断される。</p> <p>アレルギーの転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22362	<p>テタニー；</p> <p>低カリウム血症；</p> <p>反射減弱；</p> <p>握力低下；</p> <p>過換気</p>	<p>季節性アレルギー；</p> <p>金属アレルギー</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/04/01 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/26 本剤 3 回目接種 (0.5mL)。両下肢のしびれが発現。</p> <p>2022/02/27 38 の発熱、全身倦怠感が発現。</p> <p>2022/03/01 12:30 過換気症候群、過換気症候群による低カリウム血症及びテタニー、左握力低下、下肢深部腱反射低下が発現。両手足麻痺を認め、救急搬送。頻呼吸と血液ガス所見より呼吸性アルカローシスを認めた。低カリウム血症 3.3 mEq/L。補液で低カリウム血症の補正を試みた。</p>

		<p>19:25 上下肢の筋力回復傾向にあったが、歩行出来ないため経過観察入院し、補液継続。</p> <p>2022/03/02 血清カリウム 4.6 mEq/L に改善。</p> <p>2022/03/03 伝い歩き可能、T字杖で歩行可能となり、退院。過換気症候群の回復、過換気症候群による低カリウム血症及びテタニーの軽快を認めた。</p> <p>2022/03/04 精査のため他院脳神経内科受診。神経伝導検査は正常、低頻度頻回刺激は正常。</p> <p>2022/03/17 総合診療科受診。左握力低下、下肢深部腱反射低下を認めるが、その他の所見に乏しかった。更なる精査中。後遺症として左握力低下、下肢深部腱反射低下が残る。</p> <p>過換気症候群の転帰は、回復。発熱、全身倦怠感、過換気症候群による低カリウム血症、過換気症候群によるテタニーの転帰は、軽快。左握力低下、下肢深部腱反射低下の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22363	アナフィラキシー反応	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034247）である。</p> <p>2022/03/25 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/06 16:00頃 本剤3回目の接種。</p> <p>18:00頃 発熱、痛みに対して市販のパファリン1錠を内服。</p> <p>2022/03/07 06:00頃 アナフィラキシー反応が発現。広範なそう痒感、蕁麻疹、発赤が出現。</p>

		<p>07:00 頃 発熱、痛みに対して市販のパファリン 1錠を内服。</p> <p>08:00 頃より呼吸苦、喉の詰まる感が出現。救急要請となり、当院へ救急搬送。血圧 132/72 mmHg、体温 37.8 。嘔声、身体のほてり、顔面の浮腫を認めた。皮疹も胸部、腹部、臀部と体幹部を中心としてあるため、時間的に微妙なアナフィラキシーと診断し、入院。朝食はとっていない。アドレナリン、抗ヒスタミン剤のポララミン、ステロイド剤のソルメドロールを投与、ベネトリン（ 2 ）吸入。</p> <p>2022/03/08 09:00 頃 症状の回復を認めた。退院。</p> <p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復。発熱、痛みの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22368	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034286）である。</p> <p>2022/03/29 医師より追加情報を入手した。</p> <p>心筋炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/05/31 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.7 。</p> <p>2022/02/25 12:35 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 38.6 の発熱、息苦しさ、動悸、立位保持困難などがあった。</p> <p>2022/02/27 救急外来にて PCR 検査実施。結果は陰性。</p>

		<p>2022/03/01 08:00 心筋炎発現。当院来院。心電図検査にて1、3、aVF、V4-V6の陰性T波を認めた。他院へ紹介。</p> <p>日付不明 経過観察後、軽快。倦怠感は少し残存。</p> <p>2022/03/03 症状の回復を認めた。</p> <p>心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22371	<p>横紋筋融解症；</p> <p>歩行障害；</p> <p>筋肉痛；</p> <p>肝機能異常；</p> <p>転倒</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022566）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034287）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/15 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/16 肝機能障害、両側下肢筋肉痛が出現し、転倒・歩行困難のため救急搬送。血液検査ではBUN 25.5 mg/dL、Cr 0.97 mg/dL、AST 296 U/L、ALT 68 U/L、LD 825 U/L、CK 15,833 U/Lと血清CK上昇と筋逸脱酵素上昇を認めた。腰椎CTで両側大腿内転筋群の腫大、HU値低下を認め、同部位に自発痛・圧痛を認めたことから横紋筋融解症が疑われた。尿量をモニタリングの上、点滴加療の方針とした。</p> <p>2022/02/17 血液検査でCK 10,838 U/L。</p> <p>2022/02/19 第2病日から第4病日まで尿量は1,700-2,400 mL/日確保。</p> <p>2022/02/20 第5病日のCK 1,781 U/Lと低下。尿量のモニタリング終了。歩行器で病棟1周できるほど離床できていた。</p>

			<p>2022/03/06 第 19 病日に独居で日常生活動作自立しているため、リハビリ病院へ転院。</p> <p>2022/03/07 症状の軽快を認めた。</p> <p>肝機能障害、両側下肢筋肉痛、転倒、歩行困難、横紋筋融解症の疑いの転帰は、軽快。</p> <p>報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22372	強膜炎	喘息	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034512）である。</p> <p>2022/03/23 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022578）を入手した。</p> <p>2022/03/24 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034793）を入手した。</p> <p>強膜炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.6。</p> <p>2022/02/17 14:00 本剤3回目の接種。23:00頃 強膜炎が発現、両目の違和感あり。</p>

			<p>2022/02/18 01:00 左目のまぶたがくっつき開けられなくなる。目やには少しあり、涙が止まらず。明らかにおかしいので鏡を見ると目が充血していた。顔面体が腫れぼったい感じがあり。</p> <p>日付不明 左目の充血が治ると同時に右目が充血。右目の充血が治ると、再び左目の充血を繰り返す。</p> <p>2022/02/21 午前 眼科受診。右眼が充血。まぶたがくっついている状態は改善、目は開けられるようになっている。眼科医も本剤の副作用を考えるとこのことで、1週間たっても改善しないようであれば再診を指示。ヒアレイン点眼液、オロパタジン点眼液を処方。</p> <p>2022/02/22 17:00 右目の充血あり、顔が腫れぼったい状態も持続。</p> <p>2022/02/28 12:00 症状改善し、回復を認めた。後遺症なし。</p> <p>強膜炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22373	多形紅斑	慢性胃炎; 脂質異常; 2型糖尿病	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例(厚生労働省受付番号:v2110034518)である。</p> <p>2022/03/22 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて医師より副反応報告症例(厚生労働省受付番号:v2110035101)を入手した。</p> <p>2022/03/29 医師より追加情報を入手した。</p> <p>当院治療中の被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2(コミナティ筋注)1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2(コミナティ筋注)2回目接種。</p>

		<p>日付不明 接種前体温：36.4 。</p> <p>2022/02/24 10:00 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/02/25 07:00頃 多形滲出紅斑が発現。皮疹、掻痒感が出現。</p> <p>2022/02/26 11:32 徐々に増悪、全身に紅斑が出現し、当院受診。強力ネオミノファーゲン 20 mL+ポララミン 5 mg 1A を静脈注射。ルパフィン 10 mg を処方。</p> <p>2022/02/28 症状はさらに増悪し、当院再受診。生理食塩水注 100 mL+プレドニン 10 mg+ポララミン 5 mg を静脈点滴注射。</p> <p>2022/03/01 生理食塩水注 100 mL+プレドニン 10 mg+ポララミン 5 mg を静脈点滴注射。</p> <p>2022/03/02 症状改善ないため、専門外来へ紹介。皮膚科受診し、連日ステロイド投与後、約1ヶ月で皮疹は消退傾向となった。</p> <p>2022/03/19 プレドニン 2.5 mg 内服中だが、症状の軽快を認めた。</p> <p>多形滲出紅斑の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22375	間質性肺疾患	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034411）である。</p> <p>2021/06/10 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/01 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/17 12:30 本剤3回目の接種。接種後、39度の発熱が発現し、3日間継続。</p> <p>2022/02/20 間質性肺炎が発現。解熱するものの、呼吸困難出現。</p>

			<p>日付不明 画像診断で間質性肺炎の像を認める。SpO2 85%、BT 38.1、KL-6 539.34、CRP 1.58、LDH 353、WBC 7,501。COVID-PCR 検査陰性。</p> <p>2022/02/24 入院。</p> <p>日付不明 本剤による薬剤性間質性肺炎と診断。</p> <p>日付不明 ステロイドパルス療法で改善。</p> <p>2022/03/05 退院。</p> <p>2022/03/07 症状は軽快。</p> <p>日付不明 外来診療中。</p> <p>間質性肺炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22379	<p>対麻痺；</p> <p>感覚障害；</p> <p>肛門直腸障害；</p> <p>膀胱障害</p>	<p>変形性脊椎症；</p> <p>椎間板突出；</p> <p>椎間板障害；</p> <p>脊柱管狭窄症；</p> <p>脊椎すべり症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手したコロナワクチン担当者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034408）である。</p> <p>2010年より通院中、補助具不要で独歩可能の被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/10 本剤3回目接種。</p> <p>日付不明 接種部位の疼痛・腫脹が発現。</p> <p>2022/02/12 両下肢対麻痺、両下肢感覚障害、膀胱直腸障害が発現。起床時より腰痛、両下肢脱力、両下肢筋肉腫脹、歩行障害、両下肢のしびれ・疼痛が発現。</p>

			<p>2022/02/16 11:00 頃 病院受診。胸腰髄 MRI 実施し、異常なし。尿閉あり。</p> <p>2022/02/17 頭部 MRI 実施し、異常なし。症状の改善なし。血液検査、髄液検査に有意な異常所見なし。</p> <p>2022/02/21 当院神経内科へ転院。入院。ステロイドパルス療法、ビタミン B 群投与など実施中。</p> <p>接種部位の疼痛・腫脹、腰痛、両下肢対麻痺、両下肢感覚障害、膀胱直腸障害の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22381	<p>失神寸前の状態；</p> <p>意識変容状態；</p> <p>痙攣発作</p>	<p>子宮平滑筋腫；</p> <p>子宮手術；</p> <p>脂質異常症；</p> <p>食物アレルギー；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師以外の接種者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110033954）である。</p> <p>2022/03/25 医師以外の接種者より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 新型コロナウイルスワクチン（製品名不明）2回目接種。</p> <p>2022/02/24 15:00 来院。KT 36.2 。体調特変なし。左肩に本剤 3 回目の接種。1 回目接種時に迷走神経反射の既往あるため、直後より臥位にて休んだ。</p> <p>15:15 声掛けに返答あり。特変なし。</p> <p>15:40 特変ないため帰宅。</p> <p>15:50 血管迷走神経反射が発現。胸部不快があり、病院に戻る。BP 150/90、SpO2 94-96%、P 58-60。声掛けに応答あり、臥位にて様子を見る。</p> <p>16:10 手指にピクピクとけいれん様症状あり。BP136/70。返答あるも</p>

		<p>のの開眼せず、意識障害を認めた。生食 100 mL にてルート確保。</p> <p>16:30 心電図で異常なし。バイタル異常ないが、上半身にけいれんあり。</p> <p>16:50 けいれん時、SpO2 90%に低下。顔きのみ返答あり。KN3B 輸液 200 mL 継続。</p> <p>17:15 BP 182/96、SpO2 96%、P62。意識レベル改善見られず二次救急で対応。その後、搬送後少し経過して改善。症状の軽快を認めた。</p> <p>19:00 帰宅。</p> <p>血管迷走神経反射、けいれん、意識障害の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22383	過敏症	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034435）である。</p> <p>2022/04/21 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/12 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/03 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5 。</p> <p>2022/02/27 10:11 本剤 3 回目接種。</p> <p>10:31 過敏症反応が発現。接種より約 20 分で胸部苦悶感、顔面紅潮、広範なそう痒感、限局した蕁麻疹、息苦しさを認めた。血圧 192/62 mmHg、体温 36.6 。</p> <p>会場の担当医により、ボスミン、ソル・コーテフ投与を受け、当院搬送となった。</p> <p>11:06 搬入時、症状の消失を認めた。入院。</p>

			<p>2022/02/28 症状の回復を認め、退院。</p> <p>過敏症反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22395	<p>心筋炎；</p> <p>心膜炎</p>	<p>メニエール病；</p> <p>知的能力障害；</p> <p>突発性難聴；</p> <p>肺動脈弁狭窄；</p> <p>血尿；</p> <p>近視</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034436）である。</p> <p>2022/04/04 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/07 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/08 未明、37.5以上の発熱が発現。22:00頃心膜炎、心筋炎が発現し、左前胸部痛を認めた。経過観察をしていたが、軽快せず。</p> <p>2022/03/09 07:00 救急要請し、当院救急外来受診。心嚢液貯留を疑う身体診察所見なし。心電図でaVRのPR低下と他の誘導のST上昇を認めていた。血液検査でトロポニンT 180 ng/mL陽性、CRP 3.91 mg/dL上昇。BNP 5.8 pg/mL、D-ダイマー上昇なし。冠動脈CTで冠動脈病変認めず、有意狭窄なし。心臓超音波検査で左室駆出率65.7%であり、壁運動低下ないが、局所の壁運動異常を認めた。心嚢液貯留なし、心膜の炎症所見なし。胸部CTで異常な心嚢液貯留なし、心膜の炎症所見なし。胸部X線検査で心拡大の所見なし。</p> <p>15:00 心膜炎として緊急入院。入院後、血液検査でCPK 280 U/L、CK-MB 28.0 U/Lまで上昇。アセトアミノフェン、コルヒチン投与し、胸痛は軽快。</p> <p>2022/03/10 心電図でPR低下を認めた。</p> <p>2022/03/11 心臓MRI(ガドリニウム造影)で心膜の炎症所見、T1強調</p>

		<p>像におけるガドリニウム遅延造影を認めた。心膜炎、心筋炎を否定できず、矛盾ない所見。</p> <p>2022/03/14 心電図でPR低下を認めた。</p> <p>2022/03/16 胸痛は認めなくなり、心電図のPR低下も基線に復帰。症状の軽快を認め、退院。</p> <p>心膜炎、心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22396	<p>いびき呼吸；</p> <p>くも膜下出血；</p> <p>昏睡；</p> <p>無力症；</p> <p>脳出血；</p> <p>頭蓋内動脈瘤</p>	<p>頭蓋内動脈瘤</p> <p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034474）である。</p> <p>2021/06/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/15 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/07 15:00 本剤3回目接種。</p> <p>16:40頃 朦朧としているところを発見。同僚が話しかけると頭痛、全身脱力の訴えがあり、本剤の副作用と考え休ませて経過をみた。</p> <p>17:21 意識状態が悪化したため、救急搬送。JCS 200の昏睡状態、いびき呼吸のため気管挿管、呼吸器装着。CTで脳幹から脳室内に穿破する出血を認め、CT血管撮影で前下小脳動脈の動脈瘤からの出血と判断。くも膜下出血で入院。</p> <p>2022/03/09 動脈瘤のコイル塞栓術と開頭血腫除去、ドレナージ術を施行したが、昏睡状態であり、今後死亡につながるおそれのある状態。</p> <p>全身脱力、昏睡状態、いびき呼吸、前下小脳動脈の動脈瘤からの出血、くも膜下出血の転帰は、未回復。</p>

			追跡調査予定あり。
22398	溺死		<p>本例は、2022/03/11 にくすり相談窓口を通じて報告された被接種者家族からの自発報告である。</p> <p>2022/03/14 自治体職員から追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/03 自治体の集団接種にて、本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/04 入浴中に家族が声をかけたときは眠そうな声で返事したが、暫くして家族が見に行くと溺死していた。</p> <p>自治体職員からの情報として、医師は副反応の疑いはないと判断しているとのこと。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22402	意識変容状態； 譫妄	アトピー性皮膚炎； アレルギー性結膜炎； アレルギー性鼻炎； 喘息； 季節性アレルギー	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022570）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034471）である。</p> <p>2022/04/05 医師より追加情報を入手した。</p> <p>意識障害、せん妄は企業により重篤と判断された。</p> <p>気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎の持病を持つが、治療でコントロールしている被接種者。</p> <p>2021/05/17 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6。</p> <p>2022/02/03 全身状態は良好。12:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/04 全身倦怠感が発現。</p> <p>01:00 接種部位の疼痛が発現。</p> <p>03:00 頃 39 の発熱、全身倦怠感が発現。カロナール 200 mg 服用。</p> <p>07:30 過呼吸、動悸が発現。</p> <p>09:00 動悸持続。当院に相談し、安静で様子観察。</p> <p>13:00 頃 意識障害、せん妄が一時見られ、声をかけても応答なし。その後睡眠状態となった。</p> <p>夕方、覚醒。せん妄は回復。本人は覚えていない。</p> <p>20:40 39 の発熱。カロナール 200 mg 服用。耳鳴、嘔気が発現。</p> <p>2022/02/05 07:30 39 の発熱、息切れ、全身倦怠感を認め、パルス</p>
-------	---------------	---	--

			<p>オキシメータ酸素飽和度 93%。</p> <p>11:40 39 の発熱。カロナール 200 mg 服用。酸素飽和度 97%。</p> <p>2022/02/06 11:40 38 の発熱。両腋下、両大腿に蕁麻疹出現。</p> <p>午後、発熱、蕁麻疹は消退。</p> <p>2022/02/11 全身倦怠感は軽快。</p> <p>日付不明 SpO2 の一時的に 93%までの低下はあったが、その他の時間は 96-97%で経過し、息切れは軽快。</p> <p>2022/02 症状は軽快。後遺症は明らかなものは認めず。</p> <p>発熱 39.0 、意識障害、せん妄、両腋下・両大腿の蕁麻疹の転帰は、回復。接種部位の疼痛、全身倦怠感、過呼吸、動悸、耳鳴、嘔気、息切れの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22407	不整脈	<p>不眠症；</p> <p>便秘；</p> <p>心筋梗塞；</p> <p>慢性骨髄性白血病；</p> <p>甲状腺機能低下症；</p> <p>胃食道逆流性疾患；</p> <p>血小板増加症；</p> <p>貧血；</p> <p>高尿酸血症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034597）である。</p> <p>2022/04/07 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温：36.7 。</p> <p>2022/02/24 14:00 本剤3回目の接種。接種後、体調不良の訴えなし。</p> <p>2022/02/25 21:00 自宅で亡くなっているところを発見。</p>

			<p>日付不明 警察で検死を実施。髄液を採取し、血性のもはなく、脳が原因ではないと判断。心臓が原因の突然死の可能性が高い。検死診断結果は、致死性不整脈。</p> <p>致死性不整脈の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22411	アナフィラキシーショック	脳梗塞	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034502）である。</p> <p>2022/03/30 医師より追加情報を入手した。</p> <p>安定した慢性期の脳梗塞後遺症を有する被接種者。</p> <p>2021/06/22 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/13 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.1 。</p> <p>2022/03/09 10:15 本剤3回目接種。30分観察、異常なし。</p> <p>11:30 昼食全量摂取。</p> <p>11:45 嘔吐。チアノーゼ、息苦しさを認めた。SpO2測定不可、血圧134/98 mmHg。アナフィラキシーショックを考え、対応治療開始。アドレナリン、ルート確保しソルコーテフ100 mg×2を静脈注射。酸素5 L投与でSpO2 60%。喘鳴等続くため、病院へ救急搬送。治療と経過にて症状改善し、当日中に帰宅。その後の経過で本症状による後遺症見られていない。</p> <p>2022/03/10 10:30 症状の回復を認めた。</p>

			<p>アナフィラキシーショックの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22417	<p>心肺停止；</p> <p>敗血症；</p> <p>肺炎</p>	<p>アルツハイマー型認知症；</p> <p>背部痛；</p> <p>脂質異常症；</p> <p>骨粗鬆症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/04/05 医師より追加情報を入手した。</p> <p>高血圧症、脂質異常症、骨粗鬆症、アルツハイマー型認知症治療中の被接種者。</p> <p>2021/06/16 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/07 午前、本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/08 夕方、うとうとして食事がとれない状態。その後、便失禁。救急車にて病院へ搬送。搬送中に心肺停止。死亡。搬送先病院の死後 CT で肺炎、敗血症と診断。剖検なし。</p> <p>心肺停止、肺炎、敗血症の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22418	アナフィラキシー様 反応	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034483）である。</p> <p>2022/03/29 薬剤師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/02 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/23 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.0。</p> <p>2022/03/09 15:45 本剤3回目接種。</p> <p>16:00 アナフィラキシー様反応が発現。頭がぼーっとする、ぞわぞわした感じを訴え、顔面紅潮、血圧上昇、喉のイガイガ感を認めた。咽頭腫大は認めず。SpO₂の低下も認めなかった。血圧 169/93 mmHg。</p> <p>16:13 血圧 152/77 mmHg。症状変わらず。</p> <p>16:20 アナフィラキシーとの診断でエピペン注 0.3 mg 施行。生食 500 mL でルート確保。</p> <p>16:26 血圧 128/65 mmHg。</p> <p>16:30 血圧 118/56 mmHg。</p> <p>16:33 血圧 125/66 mmHg。</p> <p>16:35 血圧 133/64 mmHg。症状改善。回復を認め、帰宅。</p> <p>アナフィラキシー様反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	-----------------	--

22420	<p>体重減少；</p> <p>失神</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034490）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/12 本剤3回目接種。失神、体重減少が発現。</p> <p>2022/02/13 接種2日目、易疲労、動くとき血が下がる感じを認めた。夕方、トイレに行き、失神。その後意識は戻ったが、一人で起きられない状態となる。</p> <p>2022/2/16 接種5日目まで、全く起き上がれず、臥床生活。</p> <p>2022/02/23 1週間後、起き上がれるようになった。</p> <p>日付不明 やる気が全く起こらない、体力がない、食欲不振で体重は1ヶ月で2kg減少。</p> <p>2022/03/09 全身症状は未回復。</p> <p>失神、起き上がれないことの転帰は、回復。易疲労、動くとき血が下がる感じ、やる気が全く起こらない、体力がない、食欲不振、体重減少の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	------------------------	--

22421	<p>小発作てんかん; 意識消失; 譫妄</p>	<p>腎過誤腫; 自己免疫性脳炎</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022571）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034601）である。</p> <p>2022/04/12 医師より追加情報を入手した。</p> <p>せん妄状態、小発作は企業により重篤と判断された。</p> <p>自己免疫性辺縁系脳炎の治療によりてんかん発作がコントロールされ、残存した高次脳機能障害に対してリハビリテーション目的で入院中の被接種者。</p> <p>2021/08/02 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/23 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6。</p> <p>2022/03/04 11:30 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/05 13:00 発熱後、けいれんが発現。</p> <p>16:00 意識消失発作が発現。10分程度で意識は自然回復。本剤の副反応による発熱が誘因となった意識消失発作と診断。イーケプラ投与。その後解熱し、症状は落ち着いた。</p> <p>2022/03/06 せん妄状態を認め、2日間セレネース投与。</p> <p>2022/03/09 せん妄が改善。症状の回復を認めた。</p> <p>日付不明 以後も小発作を疑う症状が本剤投与前よりも頻度が増加。</p> <p>発熱、意識消失発作、せん妄状態の転帰は、回復。小発作の転帰は、</p>
-------	----------------------------------	--------------------------	--

			<p>不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22422	アナフィラキシー反応	<p>アルツハイマー型認知症；</p> <p>緑内障；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034577）である。</p> <p>2022/04/05 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/19 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5 。</p> <p>2022/03/08 12:35 本剤3回目接種。</p> <p>12:40 アナフィラキシー反応が発現。呼吸困難感の訴えあり、吃逆、頻呼吸、努力様呼吸が見られた。体温 37.6 への上昇認めたが、血圧 116/73 mmHg、SpO2 低下なし。発疹なし。</p> <p>12:45 医師よりエピペン筋注。</p> <p>12:53 38.7 に体温上昇。</p> <p>13:30 体温 37.5 。</p> <p>血圧、SpO2 低下ないが、努力様呼吸は変わらず。当院に紹介。</p>

			<p>14:13 当院到着。努力呼吸は治まっていた。血液検査、心電図で特記所見認めず。アナフィラキシー反応疑いで抗ヒスタミン剤のポララミン 5 mg、ファモチジン 20 mg、吃逆に対しプリンペラン 10 mg を静注。</p> <p>15:26 レントゲン検査で特記所見なし。</p> <p>15:30 症状消失し、回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22425	<p>内出血；</p> <p>心肺停止；</p> <p>意識消失；</p> <p>末梢腫脹；</p> <p>疼痛；</p> <p>血液障害；</p> <p>骨折</p>	<p>異常感覚；</p> <p>糖尿病；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034642）である。</p> <p>左上腕骨頭骨折と血液疾患疑いは企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前体温：35.2</p> <p>2022/02/28 13:15 本剤3回目の接種。</p> <p>日付不明 左上腕骨頭骨折。</p> <p>2022/03/04 頃 左上腕の腫脹、疼痛、内出血を認めた。</p> <p>2022/03/07 近医受診。特に検査は行ってないものの、血液疾患の疑い。帰宅後、意識がなくなり、心肺停止状態で当院搬送。治療に反応なし。心停止後の検査では、AST 754、LDH 1,665、CK 1,112（CKMB 25）、K 12.6。</p>

			<p>16:55 死亡確認。</p> <p>左上腕骨頭骨折、血液疾患疑いの転帰は、不明。左上腕腫脹、疼痛、内出血、意識消失、心肺停止の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22427	<p>発熱；</p> <p>頭位性回転性めまい</p>	<p>季節性アレルギー；</p> <p>頭位性回転性めまい</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034600）である。</p> <p>花粉症の内服薬服用中の被接種者。</p> <p>2021/07/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/26 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.4 。</p> <p>2022/02/28 18:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/01 06:00 激しい回転性めまい、嘔気、嘔吐が出現。体温37.7 。</p> <p>2022/03/02 症状続き、救急車にて病院受診。頭部CT等の検査、点滴し帰宅。</p> <p>2022/03/04 めまい改善せず、耳鼻科受診。良性発作性頭位めまいの診断。耳石の理学療法を受けるも、10日位めまいが続き、生活・仕事に支障あり。</p> <p>2022/03/14 現在、めまいは軽くなったが、全快せず、頭重感が残る。</p> <p>良性発作性頭位めまいの転帰は、未回復。発熱の転帰は、不明。</p>

			<p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22429	<p>三尖弁閉鎖不全症；</p> <p>低酸素症；</p> <p>失神；</p> <p>深部静脈血栓症；</p> <p>肺塞栓症；</p> <p>肺梗塞；</p> <p>肺高血圧症</p>	<p>良性前立腺肥大症</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022572）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034619）である。</p> <p>2022/04/13 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/04 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.1 。</p> <p>2022/03/03 14:30 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/06 肺血栓塞栓症、右下肢深部静脈血栓症が発現。夜、トイレ後に失神、冷汗を認めた。以後、労作時の呼吸苦を認めた。</p> <p>2022/03/09 ふらついて動けず、救急搬送。当院受診。動悸、労作時呼吸困難の主訴。Sat 88%。低酸素血症を認めた。単純CTで右肺上葉末梢に牽状間質影。RV、IVC拡大。心電図で86 bpm、洞調律、with 1-AVB、2 aVF、V1-4T inv。頭部単純CT問題無く、眩暈ではないと確認。血算、凝固系検査実施。スメアでの凝集所見なし。COVID-PCR陰性確認後、心臓・下肢の超音波検査でRV拡張、IVCも拡大。心室中隔は圧排され、RVの長軸方向のmotionも低下。TR（三尖弁閉鎖不全症）moderate PG 47 mmHg Mr mild Ar mild。肺高血圧症の所見。肺塞栓は确实だが、トロポニンI 0.178、心電図変化もあり、虚血性心疾患除外の為、MDCT+肺動脈CT実施。両PAに血栓多発、右肺下静脈に血栓の所見。右膝窩上下に静脈内血栓残存あり。冠動脈は石灰化あるも有意狭窄はなし。深部静脈血栓症からの肺血栓塞栓症と診断。加療目的に入</p>

院。入院後、肺血栓塞栓症、右下肢深部静脈血栓症、右肺梗塞、肺高血圧に対し、エリキユース 20 mg/日を 7 日投与し、以後 10 mg/日投与。座位で冷汗、頻発、Sat 低下出現し、血栓が動いたか再塞栓が疑われた。ショックなし。

日付不明 その後、経時的に洞調律となり、Sat 改善、酸素も減量できた。Wenckebach AV block も徐々に減少。凝固線溶系に異常なく、抗リン脂質抗体症候群も抗好中球細胞質抗体も否定。他にもヘパリン起因性血小板減少症、免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固症候群が除外された。糖尿病も脂質異常もなし。特に血栓症素因はなく、タイミング的に本剤接種後の血栓症からの深部静脈血栓症、肺塞栓が否定できない。

2022/03/16 Plt 18.1 に回復。D-dimer 10.4、LDH 165、BNP 96.0 に改善。超音波検査で肺高血圧は消失、TR 23.8 mmHg。AR moderate。右膝窩に器質化血栓残存。

2022/03/17 酸素も離脱でき、血圧・HR も安定し、退院。症状の軽快を認めた。退院時にエリキユース錠 2.5 mg 4 錠分 2 を 26 日分処方。

肺血栓塞栓症、右肺梗塞、右下肢深部静脈血栓症の転帰は、軽快。肺高血圧症の転帰は、回復。三尖弁閉鎖不全症、失神、低酸素血症、Wenckebach AV block、胆嚢腺筋腫症、肝嚢胞、両腎嚢胞の転帰は、不明。

追跡調査予定なし。

【胸部-下肢血管造影 CT 検査】（検査日：2022/03/09）

所見

・両側肺動脈主幹部から右肺上中下葉枝、左肺上下葉枝に filling defect を認め、肺塞栓と考えられる。

・右大腿静脈からヒラメ静脈内に血栓を疑う。

			<ul style="list-style-type: none"> ・ 右肺上葉背側の末梢に楔状の濃度上昇を認め、肺梗塞を疑う。 ・ 少量の両側胸水あり。 ・ 心拡大あり。 ・ 肝嚢胞あり。 ・ 胆嚢にくびれ、底部に限局性壁肥厚を認め、胆嚢腺筋腫症を疑う。 ・ 膵尾部に脂肪組織の迷入あり。 ・ 脾、副腎に異常所見なし。 ・ 両腎嚢胞あり。 ・ 前立腺腫大あり。 ・ 腹水貯留なし。 ・ 有意なリンパ節腫大なし。 <p>読影診断</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 肺塞栓を認める。 ・ 右大腿静脈からヒラメ静脈内に血栓を疑う。 ・ 右肺上葉背側に肺梗塞を疑う。
22430	心筋心膜炎	<p>アレルギー性鼻炎；</p> <p>フォンタン手術；</p> <p>上室性期外収縮；</p> <p>口腔咽頭痛；</p> <p>大静脈肺動脈吻合；</p> <p>心室性期外収縮；</p> <p>神経症；</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034947）である。</p> <p>2022/04/14 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p>

		<p>肺動脈閉鎖；</p> <p>胸痛；</p> <p>血管シャント；</p> <p>食物アレルギー</p>	<p>2022/03/02 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/03/09 09:00 心筋心膜炎が発現。朝から増強傾向のある強い胸痛を認め、救急受診。来院途中から自制できないほどの胸痛になりパニック状態となった。倦怠感、悪心を認めた。心電図検査にて複数誘導でST上昇、aVR誘導におけるST低下を認め、ミオコールスプレーを使用した。心電図・痛みとも変化はなかった。採血では心筋逸脱酸素の上昇は確認できず。心臓超音波検査は通常と変わりなく異常所見なし。胸部X線検査で心拡大の所見なし。入院。入院時、SARS-Cov-2核酸定性検査（NEAR法）が陽性であったが、気道症状・発熱・接触歴などいずれもなし。PCR法による核酸検査では陰性だった。アセトアミノフェンおよびモルヒネの使用で痛みは徐々に軽快。</p> <p>2022/03/10 血液検査実施。トロポニンT 1.29 ng/mL、CK 1,392 U/L、CK-MB 151 U/Lの上昇を確認。PCR法・NEAR法いずれも陰性。過去のSARS-CoV-2の感染による検出（広義の偽陽性）などが想定された。</p> <p>2022/03/11 症状・検査所見はいずれも軽快。</p> <p>2022/03/12 心電図変化は残存していたが、症状が軽快したため退院。</p> <p>2022/03/23 外来受診時、心電図変化は残存。症状の軽快を認めた。</p> <p>心筋心膜炎の転帰は、軽快。パニック状態の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
--	--	--	--

22435	心筋炎; 糖尿病	アトピー; 骨折	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>2022/04/05 医師より追加情報を入手した。</p> <p>心筋炎疑い、糖尿病の疑いは企業により重篤と判断された。</p> <p>週1回の飲酒習慣がある被接種者。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2回目接種。</p> <p>2022/03/13 本剤3回目接種。接種後、呼吸困難が発現。</p> <p>2022/03/15 呼吸苦、胸痛が発現。朝、横になると苦しかった。夕方、呼吸が苦しい感じを自覚。夜間は眠れなかった。横になると苦しいので座っていた。発熱なし。</p> <p>2022/03/16 横になっても、それ程呼吸苦は認めず。呼吸苦、嘔気を主訴に受診。心筋炎疑いを認めた。BP 127/101、BT 36.2、Sa 98-99%、HR 98-100、心雑音なし、肺雑音なし、やや頻脈。心電図検査で洞性整脈、HR 89、異常所見なし。血液検査では心筋トロポニンT、CK、CRPの上昇なし。不安神経症、亜急性甲状腺炎の疑い、糖尿病の疑いを認めた。不安神経症に対し不安時服用として、セルシン錠2mg1錠を5回分頓服用で処方。セルシン内服で動悸が治まらない際は救急車要請を指示。呼吸苦、胸痛は回復。</p> <p>心筋炎疑いの転帰は、回復。不安神経症、亜急性甲状腺炎の疑い、糖尿病の疑いの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	-------------	-------------	--

22436	アナフィラキシー反応	食物アレルギー	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師以外の接種者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034985）である。</p> <p>2022/04/15 看護師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.1。</p> <p>2022/03/13 15:50 本剤3回目接種。</p> <p>16:05 症状なく15分の経過観察終了。その後、アナフィラキシー反応が発現。軽度気分不快出現したため、トイレへ行き休憩するも徐々に症状増悪。</p> <p>16:15 冷汗、顔面紅潮、咳嗽、目の充血やかゆみ、息苦しさ、頻呼吸、くしゃみ、鼻水、身体のほてり、胸が苦しい、飲みみにくさ、悪寒、チアノーゼ、頻脈、麻痺/しびれ、嘔声が発現。BP 145/86、P 80、レベル低下、ふらつきを認め、救急対応開始。</p> <p>16:17 酸素3Lマスク開始。ソルラクトで血管確保し、点滴全開で開始。血圧測定できず。</p> <p>16:20 ボスミン0.3 mL筋注。BP 125/66、P 80。JCS 2-10。</p> <p>16:30 酸素4Lへ変更。咽頭圧迫感出現、目のちらつきあり、気分不快増悪、歩行困難。</p> <p>16:45 ポララミン5 mg、ファモチジン20 mg、ソルメドロール125 mg 静脈注射開始。BP 132/68、P 83、SpO2 100%。</p> <p>17:00 入院。</p> <p>夜間、症状軽減。</p> <p>2022/03/14 09:00 症状消失。酸素終了。点滴終了。退院し、帰宅。症状の回復を認めた。</p>
-------	------------	---------	--

			<p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22440	<p>ギラン・バレー症候群；</p> <p>ミラー・フィッシャー症候群</p>		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>ギラン・フィッシャー症候群は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/日付不明 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 ギラン・フィッシャー症候群発症を認めた。</p> <p>ギラン・フィッシャー症候群の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22443	低体温	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>低体温は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/03 本剤 3 回目接種。39.4 の発熱が発現し、持続。</p> <p>2022/03/08 38.0 の発熱が持続。</p> <p>2022/03/15 解熱。低体温になり、悪寒を認めた。</p> <p>日付不明 医療機関受診し、原因は不明と診断。</p> <p>発熱の転帰は、回復。低体温、悪寒の転帰は、未回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22444	歩行障害; 疼痛; 運動障害	<p>本例は、当社 MR を介して薬剤師により報告された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/14 本剤 3 回目接種。夜、腰部・左肘の全身痛を認め、体動・歩行困難。</p> <p>2022/03/15 経過観察の為、入院。</p> <p>2022/03/17 腰痛、左肘より下の痛みがまだ残っている。</p>

		<p>2022/03/22 症状は改善傾向にあり、歩行可能となってきたが、左肘の痛みが残存のため入院継続して経過観察。</p> <p>全身痛、体動困難、歩行困難の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22446	ギラン・バレー症候群	<p>本例は、他社を介して入手した薬剤師による報告である。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 接種 1 週間後、GM1 IgM 検査を受け、抗ガングリオシド抗体陽性。ギラン・バレー症候群の再発を認めた。</p> <p>日付不明 免疫グロブリンを投与して痛みの緩和を継続。</p> <p>2022/02/22 ギラン・バレー症候群、自律神経ニューロパチー、全身痛、及び脱力のため入院。</p> <p>2022/02/24 入院後、Venilon-I 5,000 mg を 6 回/日で投与。疼痛管理のため、ロキソプロフェン、ジクロフェナク座薬の投与開始。</p> <p>2022/03/02 免疫グロブリン静注の効果なく、ステロイドパルスが開始。追加で芍薬甘草湯を 3 包/回、3 回/日で投与開始。</p> <p>2022/03/03 芍薬甘草湯の効果が著しく、疼痛が消失。</p> <p>2022/03/07 経過良好のため、退院。</p> <p>ギラン・バレー症候群の再発の転帰は、不明。</p>

			報告者の協力が得られず、追跡調査不能。
22448	意識レベルの低下； 死亡； 脳梗塞	慢性腎臓病； 糖尿病； 血液透析	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034692）である。</p> <p>脳梗塞、意識レベル低下は、企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/06/25 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：37.0 。</p> <p>2022/03/15 14:00 本剤3回目接種。16:00頃 38 台の発熱。</p> <p>日付不明 39 から 40 台の発熱が継続。カロナール服用を勧めるが、拒否。</p> <p>2022/03/17 水分摂取不足を認めたため点滴開始。呼びかけに応じ、会話可能であった。</p> <p>2022/03/18 朝、意識レベル低下、血圧低下を認めた。原因検索のため頭部、胸部から腹部にかけてCTを施行。胸から腹部には、意識レベル低下の原因となるものは認められなかった。ただし、頭部CTで左前頭部に急性期と見られる脳梗塞が認められた。気管内挿管、点滴を施行。</p> <p>11:10 死亡。</p>

			<p>発熱、意識レベル低下、血圧低下、脳梗塞の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22450	<p>発熱； 起立障害</p>	<p>糖尿病</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034656）である。</p> <p>2021/07/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/27 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/11 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/03/12 16:00頃 発熱。立位困難となる。入院し、加療。</p> <p>2022/03/16 症状の回復を認めた。</p> <p>発熱、立位困難の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22458	<p>チアノーゼ;</p> <p>出血性膀胱炎;</p> <p>発熱;</p> <p>血圧低下;</p> <p>頻脈</p>	<p>脳梗塞;</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034678）である。</p> <p>2021/05/26 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/16 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/02/28 15:30 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/01 12:30 急性出血性膀胱炎が発現。血尿、37.2の発熱を認めた。</p> <p>2022/03/02 体温39.2、血尿持続し、血圧低下傾向、頻脈、末梢チアノーゼ出現。CBP 94/68、HR 106/分、SpO2 93%。病院へ救急搬送し、そのまま緊急入院。バイアスピリン休薬、尿道カテーテル留置、抗生剤点滴施行。</p> <p>2022/03/07 膀胱鏡施行。腫瘍病変はなく、粘膜浮腫、発赤所見より出血性膀胱炎と診断。尿培養では緑膿菌（1+）同定された。</p> <p>日付不明 症状改善後、自力排尿不可能となり、尿道カテーテル留置のままとなった。</p> <p>2022/03/14 後遺症として排膿障害が残る。退院。</p> <p>急性出血性膀胱炎の転帰は、後遺症あり。発熱、血圧低下、頻脈、末梢チアノーゼの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	--	------------------------	--

22463	心不全	喘息; 大動脈弁狭窄; 慢性心不全; 脊椎圧迫骨折; 関節リウマチ; 高血圧	本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034698）である。 2022/05/10 医師より追加情報を入手した。 心不全増悪は企業により重篤と判断された。 以前より大動脈弁狭窄による心不全で経過観察しており、腰椎圧迫骨折で入院していた被接種者。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。 2022/02/21 本剤3回目接種。接種後、呼吸困難感が出現。脇の痛みが発現し、1週間持続。 2022/02/22 心不全増悪。 2022/03/03 呼吸困難感が増悪するため、当科受診。BNP 177.7と上昇。心臓超音波検査では1.2 cm ² の弁口面積で軽度大動脈弁狭窄症を認め、左室駆出率78%、壁運動は良好。 2022/04/07 BNP 166.9。サムスカ OD 7.5 mg、ダイアート 30-60 mg、メインテート 5 mg、カルデナリン 4 mg、バルサルタン 80 mg、ジャデイアンス 10 mgの内服で経過観察中。症状は未回復。 心不全増悪の転帰は、未回復。 追跡調査予定なし。
-------	-----	---	--

22464	呼吸困難； 心不全	僧帽弁逸脱； 脂質異常症； 高血圧	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034697）である。</p> <p>2022/05/10 医師より追加情報を入手した。</p> <p>僧帽弁逸脱症候群で経過観察中であり、1年に1度当科で定期的にフォローアップしている被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/18 本剤3回目接種。接種後から息切れの増悪を認めた。</p> <p>日付不明 BNPは高値であるが、以前と変わらない。</p> <p>2022/03/03 心エコー検査では、逸脱による僧帽弁逆流は変化なし。BNP 54.9。同様の症状があるが軽快傾向である。</p> <p>息切れの増悪、心不全増悪の可能性の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22472	アナフィラキシー反応		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034774）である。</p> <p>アナフィラキシーは企業により重篤と判断された。</p> <p>安定剤内服中の被接種者。</p> <p>2021/07/31 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p>

			<p>日付不明 接種前の体温:36.7 。</p> <p>2022/03/11 14:30 本剤3回目接種。アナフィラキシーが発現。接種後15分程度で嘔気出現。発赤、咽頭の違和感なし。バイタルサイン正常。ベッド上安静で嘔気は軽快。抗不安薬内服しており影響の可能性は否定できないが、グレード1のアナフィラキシーを考えた。その後15分程度で症状は消失。回復を認めたため、帰宅可とした。</p> <p>アナフィラキシーの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22473	<p>不整脈；</p> <p>心筋梗塞；</p> <p>心肺停止；</p> <p>溺水</p>	<p>糖尿病；</p> <p>脂質異常症；</p> <p>良性前立腺肥大症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034863）である。</p> <p>2022/04/13 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温:36.5 。</p> <p>2022/03/09 19:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/10 頭痛、倦怠感を認めたものの、日常生活は通常通り行っていた。</p> <p>22:00頃 入浴。</p> <p>22:40 浴槽で心肺停止の状態で見つかる。</p> <p>2022/03/11 蘇生を試みるも、反応なく死亡。CTの結果、肺に水を飲み込んだ様子を認めた。死因は溺水。直接死因は溺水となったが、溺水に至った原因は不明であり、心筋梗塞や致死性不整脈が起こった可能性がある。</p>

			<p>頭痛、倦怠感の転帰は、不明。心肺停止、溺水、心筋梗塞の可能性、致死性不整脈の可能性の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22475	倦怠感； 疼痛		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師以外の接種者による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034764）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.8 。</p> <p>2022/02/12 午後、本剤3回目接種。18:00 全身倦怠、疼痛を認める。</p> <p>全身倦怠、疼痛の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22479	ラクナ梗塞； 起立障害	狭心症； 脂質異常症； 高血圧	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034699）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/28 本剤3回目接種。</p>

			<p>2022/03/01 起立困難、頭痛、食欲低下が出現。</p> <p>2022/03/09 頭部 MR 検査では、両側基底核にラクナ梗塞を認める。</p> <p>起立困難の転帰は、未回復。頭痛、食欲低下、ラクナ梗塞の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22490	心筋炎	<p>アトピー性皮膚炎；</p> <p>喘息</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034891）である。</p> <p>2022/04/22 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コヒナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コヒナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/02/16 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/17 22:00 頃 急性心筋炎が発現。胸部圧迫感、寝汗、動悸が発現し、1 時間持続。</p> <p>2022/02/18 15:00 頃 同様の症状が 1 時間半持続。夜間、同様の症状が 2 時間ほど持続。</p> <p>2022/02/19 脳神経外科受診。心電図検査で ST 変化を認めたため、当院に紹介。</p> <p>12:00 当院受診。来院時、心電図検査で ST 上昇、血液検査で炎症反応及び心筋酵素上昇を認めた。トロポニン I 36,344 ng/mL、CK 1,588 U/L、CK-MB 137 U/L、CRP 7.10 mg/dL、D-ダイマー1.38 mcg/mL 上昇。所見から本剤接種による急性心筋炎が疑われ、緊急冠動脈造影検査施行、冠動脈は病変を認めず狭窄なし。左室造影にて左室壁運動低下なし。心臓超音波検査で左室駆出率 50%、異常所見なし。経過観察のため</p>

			<p>入院。</p> <p>日付不明 心原性酵素は来院時がピークで、症状再燃を認めなかった。</p> <p>2022/02/20 心電図で T 波陰転化を認めた。症状なし。</p> <p>2022/02/21 心エコー検査で左室駆出率 65%、壁運動異常なし、心嚢液なし。</p> <p>2022/02/22 心電図は正常化。症状なし。</p> <p>2022/02/24 心臓 MRI 検査では遅延造影を認めなかった。症状の回復を認めた。</p> <p>2022/02/25 退院。</p> <p>2022/03/01 朝、接種部位の腫れが出現。</p> <p>2022/03/24 外来受診。症状なし。心電図正常。</p> <p>急性心筋炎の転帰は、回復。接種部位の腫れの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22494	呼吸困難	<p>肺気腫；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、当社 MR を介して薬剤師により報告された。</p> <p>2022/03/23 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて薬剤師による副反応報告症例 (TASK0022577) を入手した。</p> <p>2022/03/24 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2110034781) を入手した。</p> <p>2021/06/21 13:54 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p>

			<p>2021/07/12 13:42 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/07 13:30 本剤 3 回目の接種。</p> <p>22:00-23:00 頃 就寝。</p> <p>2022/03/08 03:00 頃 呼吸苦が発現。息が苦しそうなのに気づき救急要請。入院。</p> <p>日付不明 退院。</p> <p>呼吸苦の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22499	<p>意識レベルの低下；</p> <p>死亡</p>	<p>糖尿病；</p> <p>脳梗塞</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034946）である。</p> <p>2022/04/14 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/04 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/06/25 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.4 。</p> <p>2022/02/09 14:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/10 午後、意識レベル低下を認め、医療機関受診。採血し、点滴しようとするが入らず。入院をすすめられたが拒否し帰宅。意識レベル低下は軽快。</p> <p>2022/02/11 11:00 頃 家族が死亡を発見。解剖せず、死体検案。死因不詳。</p>

			<p>意識レベル低下の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22501	<p>振戦；</p> <p>歩行障害</p>		<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034911）である。</p> <p>2022/04/21 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.8 。</p> <p>2022/03/26 午後、本剤3回目接種。14:12 接種後10分程度、右手の振えを認めた。バイタルBP 200/107、SpO2 97%。その後約30分から40分後、BP 140に下がるが右手の振えは変わらず。左手にやや震えを認めた。歩行のふらつきも認め、救急搬送。</p> <p>日付不明 症状は軽快しているものの残存しているため精査、経過観察中。</p> <p>両上肢（手）の振え、歩行のふらつきの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22503	脊髄炎	重症筋無力症	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/03/25 当社 MR を通じて薬剤師により追加情報を入手した。</p> <p>2022/03/25 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて医師による副反応報告症例（TASK0022581）を入手した。</p> <p>2022/03/28 医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034897）を入手した。</p> <p>2021/07/18 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/14 10:00 本剤3回目接種。接種後、頭痛が発現したが、1週間で治癒。</p> <p>2022/03/15 脊髄炎が発現。足の違和感を認めた。</p> <p>2022/03/17 2022/03/18 両足に違和感を認め、尿も出にくくなった。</p> <p>2022/03/20 急に両足の筋力が低下。右足は以前からしびれていたが、左足もしびれを認め、つかまり立ちとなった。</p> <p>2022/03/24 当院受診。脊髄 MRI にて造影効果のない T2・FLAIR 高信号の病変を認めた。馬尾にも可能性あり。入院。</p> <p>2022/03/25 症状は未回復。</p> <p>頭痛の転帰は、回復。脊髄炎の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	-----	--------	---

22507	<p>意識消失; 死亡</p>	<p>大動脈弁狭窄; 糖尿病; 認知症; 譫妄; 高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110035008）である。</p> <p>2022/04/14 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2022/04/18 くすり相談窓口を通じて医療従事者より追加情報を入手した。</p> <p>定期的に通院していた被接種者。</p> <p>2021/07/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/13 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6。</p> <p>2022/03/28 11:30 本剤3回目接種。</p> <p>20:00 夕食後、就寝。</p> <p>2022/03/29 01:00頃 介助にてトイレに行く。</p> <p>03:00頃 家族がトイレに行くことを促そうと起こしたが、意識ない状態。すぐに救急依頼し、救急病院へ搬送。</p> <p>05:34 死亡確認。死因不詳。剖検なし。</p> <p>意識なかったの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	---------------------	--	---

22510	<p>ワクチン接種部位疼痛；</p> <p>動悸；</p> <p>感覚鈍麻；</p> <p>熱感；</p> <p>眼瞼浮腫；</p> <p>頭痛</p>	<p>喘息；</p> <p>季節性アレルギー；</p> <p>食物アレルギー</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110034913）である。</p> <p>2022/04/21 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.1 。</p> <p>2022/03/25 20:24 本剤3回目接種。</p> <p>20:50 動悸、頭痛、暑い感じ、接種部痛が発現。</p> <p>20:54 医師診察。状態落ち着いたら帰宅可能と説明。</p> <p>21:00 起立時に手足のしびれ、頭痛を認めた。</p> <p>21:15 眼瞼浮腫を認めた。SpO2 98%、KT 37.2 、PR 79/分、BP 119/76 mmHg。皮疹や呼吸器症状、血圧低下等見られないものの、夜間で症状変化に気付かれにくいという理由で救急要請。</p> <p>22:40 当院に救急搬送。SpO2 99%（RA）、KT 36.8 、PR 72/分、BP 110/77 mmHg。来院時に眼瞼浮腫は見られず、接種部痛、左手・腕のしびれ、頭痛のみ。頭痛は来院前より軽快。眼瞼浮腫はほぼ改善。咽頭浮腫、気道狭窄音、皮疹なし。Barre 徴候なし、mingazzini 徴候なし。</p> <p>22:59 アセリオ静注液 650 mg 点滴。</p> <p>23:50 アセリオ投与後、頭痛はさらに改善し、他の症状も悪化なし。血液検査でも急な炎症、血栓傾向を疑う所見もなし。症状の軽快を認め、自宅で様子を見る方針で帰宅。今後も症状悪化時は受診を勧めた。</p> <p>動悸、頭痛、暑い感じ、手足のしびれ、眼瞼浮腫、接種部痛の転帰は、軽快。</p>
-------	--	--	--

			追跡調査予定なし。
22513	幻聴; 幻覚		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者家族からの報告である。</p> <p>幻覚、幻聴は企業によって重篤と判断された。</p> <p>2021/04/12 SARS-CoV-2 (コミナティ 筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/05/03 SARS-CoV-2 (コミナティ 筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/12 本剤 3 回目の接種。</p> <p>日付不明 幻覚、幻聴が発現。</p> <p>日付不明 医療機関受診。MRI 検査や認知症の検査を実施したが、脳に異常なし。</p> <p>幻覚、幻聴の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

22517	意識消失	痙攣発作; 胃食道逆流性疾患	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/04/28 医師より追加情報を入手した。</p> <p>意識消失は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/23 17:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/02/24 09:30 頃 めまいがして、意識消失。体温 37.7 。</p> <p>2022/02/25 回復。</p> <p>めまい、意識消失、発熱の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22519	口腔帯状疱疹	糖尿病	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例 (TASK0022585) であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2110035000) である。</p> <p>2022/05/23 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/19 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/08/12 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/06 本剤 3 回目接種。</p>

			<p>2022/03/07 口腔帯状疱疹が発現。発熱、咽頭痛、口腔左側の発疹を認めた。</p> <p>2022/03 医療機関受診。口腔帯状疱疹と判断。内服・外用薬を処方。</p> <p>2022/03 症状は徐々に軽快。</p> <p>2022/03/24 症状の回復を認め、終診。</p> <p>口腔帯状疱疹の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22537	アナフィラキシーショック	<p>アナフィラキシー反応；</p> <p>コリン性蕁麻疹</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000029）である。</p> <p>2022/04/22 被接種者家族より追加情報を入手した。</p> <p>アナフィラキシーショックは企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/08 末日、SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/09/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5 。</p> <p>2022/03/31 13:40 本剤3回目接種。アナフィラキシーショックが発現。</p> <p>13:47 全身に蕁疹、かゆみを認めた。バイタルは問題なし。強力ネオミノファーゲンシーを投与。その後、症状の回復を認めた。</p> <p>アナフィラキシーショックの転帰は、回復。</p>

			追跡調査予定なし。
22539	低酸素症; 反応性関節炎; 肺炎	心房細動; 新生物; 脂質異常症; 関節リウマチ; 高尿酸血症; 高血圧	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2110035150）である。</p> <p>2021/06/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/29 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/12 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/13 突然四肢の多関節炎が発現。</p> <p>日付不明 多関節炎は血液炎症所見を伴った。関節リウマチに関連する自己抗体は陰性。関節外症状は、はっきりしなかったが、反応性関節炎を疑う。</p> <p>2022/03/18 入院。入院時、体温 36.5、呼吸数 16/分、脈拍 67/分、整、血圧 113/65 mmHg、SpO2 97%(room air)。眼瞼結膜に貧血なく、眼球結膜に黄染ない。呼吸音・心音に異常なし。腹部平坦、腸音異常なし。軟で圧痛なし。アセトアミノフェン服薬。</p> <p>日付不明 胸腹部 CT 検査を実施。左肺上葉に浸潤影を認め、急性肺炎の疑い。</p> <p>日付不明 食事を誤嚥して一過性に低酸素血症も認めしたが、抗菌剤は投与せず。</p> <p>2022/03/29 症状の軽快を認めた。</p> <p>反応性関節炎、低酸素血症、急性肺炎疑いの転帰は、軽快。</p>

追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。

検査所見

血液所見：CLcr 39.1 mL/min、尿白血球(-)、Hb 10.8 g/dL、白血球 6,200/mcL(Neu 77.0%)、血小板 20.8 万/mcL、PT-INR 1.31、APTT 36.3 秒(対照 27.9 秒)、FDP 5.7 mcg/mL。

血液生化学所見：TP 6.0 g/dL、BUN 22.4 mg/dL、Cr 1.07 mg/dL、ALP 70 U/L、AST 35 IU/L、ALT 27 IU/L、LDH 164 IU/L、CK 94 IU/L、CK-MB 9 IU/L、UA 4.0 mg/dL、Na 130 mEq/L、K 4.0 mEq/L、Cl 96 mEq/L、Ca 8.7 mg/dL、LDL 55 mg/dL、HDL 35 mg/dL、TG 84 mg/dL、Glu 169 mg/dL(食後 200 分)、HbA1c 6.0%、高感度心筋トロポニン 45.3 pg/mL。

免疫学所見：CRP 9.13 mg/dL、PCT 0.07 ng/mL。

感染症：RPR(-)、TPHA(-)、HBs ag(-)、HCV ab(-)、HIV 1/2 ab(-)。

心電図：洞調律、PR 0.220 秒、心室 2 段脈。

5 病日：ESR 36 mm/時、Fe 35 mcg/dL、ferritin 39 ng/mL、ACE 5.2 U/L、sIL-2R 827 U/mL、ANA(-)、ACA(-)、MMP-3 55.1 ng/mL、CCP(-)、ds-DNA(-)、IgG 731 mg/dL、IgA 103 mg/dL、IgM 48 mg/dL、IgE 19 IU/mL、IgG4 13.0 mg/dL、Ig 遊離 L 鎖 型 24.3 mg/dL、 / 1.47、RNP(-)、SS-A(-)、SS-B(-)、Scl-70(-)、RF(-)、ピルシカイニド 1.06 mcg/mL。

胸腹部 CT：左右肺野に広範囲に低吸収域、気腫性変化。2016 年と同様。左肺底部前方寄りにやや粗大嚢胞形成。両肺底部背側には線状、網状影が 2016 年より増加。左肺上葉に浸潤影、急性肺炎疑い。左優位に胸水、肝嚢胞、両腎嚢胞も 2016 年と著変なし。両腎萎縮傾向。前立腺全摘手術後、リンパ節腫大なし。腹水なし。

22547	器質化肺炎	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>2022/04/04 当社 MR を介して医師より追加情報を入手した。</p> <p>4 年前から禁煙し、健康に気を付けている被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/20 本剤 3 回目接種。</p> <p>日付不明 モデルナアームが発現。</p> <p>日付不明 倦怠感が発現。</p> <p>2022/02/26 労作時の息苦しさが発現。</p> <p>2022/02/27 37 から 38 台の発熱が発現。発熱は 1 週間継続。</p> <p>日付不明 近医受診。</p> <p>2022/03/19 当院に来院。来院時、労作時息切れ、咳、痰を認めた。発熱はなく、体温 36.0 。 SpO2 91%から 93%、レントゲン上肺炎像あり。CT 上、両側性びまん性すりガラス影、浸潤影を認めた。細菌性肺炎疑いで、抗生剤開始。入院治療となる。</p> <p>2022/03/28 気管支鏡検査にて肺洗浄を実施。突発性の急性好酸球性肺炎の診断。ステロイド (PSL) 60 mg 開始。労作時音息苦しさが残っていたため、安静時は 1 L/分、労作時 2 L から 3 L の酸素吸入を実施。</p> <p>2022/03/31 労作時も含め 24 時間 1 L/分の酸素吸入中。時々咳き込みあり、息苦しさを継続。</p> <p>日付不明 検査の結果、好酸球性肺炎は否定され、器質性肺炎疑い。</p> <p>モデルナアーム、倦怠感、器質性肺炎疑いの転帰は、不明。</p>
-------	-------	---

			追跡調査予定あり。
22548	高血圧緊急症	パニック障害	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000016）である。</p> <p>2022/04/22 薬剤師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/03/30 午後、本剤3回目接種。</p> <p>14:30 高血圧緊急症が発現。動悸を認めた。</p> <p>14:31 BP 225/124、リンデロン注4 mgを1A投与。</p> <p>14:38 ヘルベッサー注10 mg 1A×2投与開始。</p> <p>14:50 BP 178/82。</p> <p>15:40 エナラプリル5 mg内服。</p> <p>16:18 ヘルベッサー注終了。</p> <p>16:45 BP 168/88、SpO2 99%。その後、帰宅。</p>

			<p>2022/03/31 朝、エナラプリル内服。</p> <p>午後、受診。BP 167/94。</p> <p>14:15 アムロジピン内服。その後、降圧剤7日分処方され、帰宅。</p> <p>2022/04/06 受診時、血圧150/94。エナラプリル5mg、アムロジピン5mg/日処方継続。血圧改善傾向。</p> <p>2022/04/09 具合悪いとの事で受診。血圧183/112、PR 112。降圧剤をジルムロ配合錠HDへ変更。</p> <p>2022/04/15 受診時、血圧156/58、PR 68。ジルムロ継続処方。症状は未回復。</p> <p>高血圧緊急症の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22552	心筋心膜炎	喘息	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000030）である。</p> <p>2022/05/19 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.7。</p> <p>2022/02/26 16:00頃 本剤3回目接種。0.3mLを接種し、過量投与となった。</p> <p>2022/02/27 38.5まで発熱。持続し、カロナールで対応。</p> <p>2022/03/01 急性心膜心筋炎が発現。38.8の発熱。朝、頸部から前胸部に体動、深呼吸に伴う痛みを自覚。当院受診。心嚢液貯留を疑う</p>

			<p>身体診察所見なし。肩痛、上背部痛、間欠的な発熱を認めた。胸部 X 線検査で心拡大の所見なし。心電図で V2-V4 に広範な最大の上に凹型の ST 上昇、全般性に PR 低下所見。採血でもトロポニン I 0.28 ng/mL と上昇、CRP 11.11 mg/dL と炎症反応高値。心膜心筋炎と診断し入院。アスピリン 1.6 g 分 4、タケキャブ 20 mg 1 錠分 1 の服用開始。痛み強い時、ロキソニン 60 mg を頓用で対応。カロナール中止。</p> <p>2022/03 疼痛は軽快。インフルエンザ、コクサッキーの各種ウイルス抗体はいずれも陰性。</p> <p>2022/03/02 心臓超音波検査で異常な心嚢液貯留なし、心膜の炎症を疑う所見。体温 37.9 。</p> <p>2022/03/03 解熱し、痛みも改善。体温 36.4 。</p> <p>2022/03/08 心臓超音波検査で心嚢水貯留引き続きなし、心内膜の輝度上昇も消失。</p> <p>2022/03/09 痛みほぼ消失し、症状の軽快を認めた。</p> <p>2022/03/10 症状の再燃ないことを確認。退院。</p> <p>急性心膜心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22553	重症筋無力症	慢性胃炎； 頭痛； 高尿酸血症； 単径ヘルニア	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000020）である。</p> <p>2022/04/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>重症筋無力症は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p>

		<p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/12 本剤 3 回目接種。37.7 の発熱が発現。</p> <p>2022/02/21 重症筋無力症が発現。眼瞼下垂、複視が出現。</p> <p>2022/03/08 症状改善なく当科を紹介受診。精査の結果、日内変動を伴う両側眼瞼下垂を認め、テンシロンテスト陽性、抗 AchR 抗体陽性であり、重症筋無力症と診断。胸部 CT で胸腺腫は否定。</p> <p>2022/03/11 メスチノン内服開始。</p> <p>2022/03/15 眼瞼下垂の悪化、眼球運動症状悪化を認め、プレドニン (PSL10 mg) 内服開始。</p> <p>2022/04/08 眼瞼下垂はやや改善。眼症状の日内変動があるため、プレドニン増量。回復したが後遺症を認める。</p> <p>2022/04/21 外来加療を継続中。</p> <p>発熱の転帰は、不明。重症筋無力症の転帰は、回復したが後遺症あり。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22554	<p>嘔吐；</p> <p>悪心；</p> <p>浮動性めまい；</p> <p>頭痛；</p> <p>食欲減退</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例 (TASK0022586) であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2210000062) である。</p> <p>2022/04/21 薬剤師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.1 。</p>

			<p>2022/02/15 17:00 本剤3回目接種。接種後、下痢、嘔気、嘔吐、頭痛、浮遊性めまいを認めた。</p> <p>2022/02/17 00:10 嘔気嘔吐症、食思低下、めまいが発現。病院外来受診。胃腸炎（本剤副反応を除外）と診断され点滴、内服処方され帰宅。</p> <p>2022/02/18 症状改善せず、食事もとれないため、同院入院。頭部CTで急性期脳血管疾患なし。入院後は、絶食、点滴、整腸剤、制吐剤、点滴抗めまい薬で対応。</p> <p>日付不明 腹部症状改善。</p> <p>2022/02/21 昼、食事開始。</p> <p>2022/02/22 内服抗めまい薬へ変更。</p> <p>日付不明 めまい症状軽減したが、耳鳴も認める。</p> <p>2022/02/27 症状の軽快を認め、退院。退院後、耳鼻科へ紹介。</p> <p>嘔気嘔吐症、頭痛、浮遊性めまい、食思低下の転帰は、軽快。耳鳴りの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22567	小脳梗塞	糖尿病	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/04/19 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて薬剤師による副反応報告症例（TASK0022598）を入手した。</p> <p>2022/04/20 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000305）を入手した。</p>

			<p>2021/07/03 13:30 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/07/24 13:30 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.1 。</p> <p>2022/03/05 13:30 本剤 3 回目接種。嘔吐、右の腕に力が入らない、歩行障害が発現。</p> <p>15:00 病院を受診し、CT にて小脳梗塞を観察。入院。指の巧緻運動障害があり、箸をうまく使えない。閉眼立位ふらつきあり。立ち上がりは両手保持可能。アスピリン 100 mg+クロピドグレル 50 mg を 2 週間継続投与。</p> <p>日付不明 クロピドグレルのみに変更。</p> <p>日付不明 起位後の歩行にふらつきあり。杖歩行可能。</p> <p>2022/04/14 後遺症に歩行障害を認めた。</p> <p>小脳梗塞の転帰は、後遺症あり。</p> <p>報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22568	溶血性貧血	<p>肺の悪性新生物；</p> <p>2 型糖尿病</p>	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>溶血性貧血疑いは企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/27 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/28 めまいを認め、受診。</p>

			<p>2022/03/31 Hb 低下を認め、当院血液内科へ紹介受診。クームス試験陰性。溶血性貧血の疑い。脾臓に腫れを認める。</p> <p>めまい、Hb 低下、溶血性貧血疑いの転帰は、未回復。脾臓に腫れの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22569	不整脈； 発熱	食物アレルギー	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000108）である。</p> <p>2022/04/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/08/30 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/09/20 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/25 11:00頃 本剤3回目接種。問診異常なし。体温36.1。夜、39以上の高熱を認め、解熱剤服用しても解熱せず。不整脈が出現し、近医に救急搬送。血液検査でALP 115、LD 293、GOT 160、GPT 120、-GTP 57、CRP 4.6。肝機能障害を認めた。点滴実施。</p> <p>2022/03/26 点滴実施し、軽快した。</p> <p>2022/03/28 当院受診。熱なく、倦怠感あるも就労可能。</p> <p>2022/04/01 経過観察のため、当院にて再検査実施。ALP 122、LD 201、GOT 21、GPT 36、-GTP 59、CRP 0.21と肝機能改善。症状の回復を認めた。</p> <p>高熱、不整脈、肝機能障害の転帰は、回復。</p>

			追跡調査予定なし。
22577	傾眠; 悪心; 発熱; 脱水; 起立障害; 食欲減退		本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000149）である。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。 日付不明 接種前の体温：35.8 2022/03/31 14:49 本剤3回目接種。 2022/04/01 06:00頃 39の発熱、嘔気が発現。食事が全く入らず、ほぼ水飲み300 mL/日程度のみ経口摂取。 2022/04/02 ふらふらして歩行もわずかに何とか出来るのみの状態。脱水症を認めた。末梢静脈点滴実施。500 mLボトル2本計1000 mL輸液。ほとんど臥床状態で、起き上がれない状態であった。 2022/04/03 朝、自覚的に8割方回復。経口摂取できるようになる。 2022/04/04 症状の回復を認めた。 発熱、嘔気、食事が入らない、ふらふらする、脱水症、起き上がれない状態の転帰は、回復。 追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。

22580	<p>意識変容状態；</p> <p>末梢静脈疾患；</p> <p>痙攣発作；</p> <p>発熱；</p> <p>脳室拡張；</p> <p>落ち着きのなさ；</p> <p>譫妄；</p> <p>髄膜炎</p>	<p>四肢静脈血栓症；</p> <p>蜂巣炎；</p> <p>髄膜炎；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000395）である。</p> <p>2022/05/18 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/29 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/17 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/03/22 本剤3回目接種。0.3 mLを接種し、過量投与となる。</p> <p>2022/03/23 13:00頃 職場にて痙攣、意識障害を認めた。家族に連絡し、帰宅。</p> <p>14:00頃 自宅にて意識障害を認め、救急要請。当院に救急搬送。搬送時、BT 38.4、HR 83/分で洞調律、BP 163/117 mmHg、SpO2 94%(RA)、呼吸数 20/分、瞳孔 2 mm/2 mm、対光反射は両側 slow。GCS:E4V4M5 であり、発熱、意識障害を認めた。項部硬直なく、その他身体所見・神経学的所見に明らかな異常なし。軽度のせん妄・不穏を認めた。ミダゾラム 10 mg/2 mL 1A+生食 18 mLを計 5 cc 静脈注射しつつ、全身単純 CT、頭部単純 MRI 実施したが明らかな異常なし。発熱によるせん妄・不穏、意識障害と考えたが、髄膜炎の可能性も考え、入院し経過観察とした。抗菌薬・抗ウイルス薬投与なし。リクシアナ内服中の為、腰椎穿刺は実施せず。</p> <p>2022/03/24 09:00頃 意識清明、BT37.4。</p> <p>2022/03/25 09:00頃 意識清明、BT36.3 と発熱なし。血液培養採取。頭部 MRI で軽度の脳室拡大を認め、画像上、脳圧亢進、うっ血乳頭を認めたため、入院中は腰椎穿刺実施せず。</p> <p>2022/03/26 09:00頃 意識清明、発熱なし。症状の回復を認め、退院。</p> <p>2022/03/28 09:00頃 当科外来再診。意識清明、発熱なし。本人希望により腰椎穿刺実施。初圧 12.5 cmH2O、終圧 11.0 cmH2O。髄液所見に異常なし。ヘルペス DNA など培養提出。</p>
-------	--	--	---

2022/03/31 血液培養の結果は陰性。

2022/04/05 10:00 当科外来再診。意識清明、発熱なし。腰椎穿刺の結果を説明し、当科終診。

痙攣、意識障害、発熱、せん妄、不穏、髄膜炎の可能性の転帰は、回復。

うつ血乳頭、脳室拡大、左腎嚢胞の転帰は、不明。

追跡調査予定なし。

【頭部単純 CT】(検査日:2022/03/23)

・頭蓋内に出血や血腫を認めない。脳の形態に明らかな異常なし。

【胸腹部単純 CT】(検査日:2022/03/23)

・両肺にすりガラス影や浸潤影なし。胸水なし。左腎嚢胞を認める。肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、右腎臓、膀胱、前立腺に異常なし。腹水なし。

・わずかな動脈硬化があるが、解離や瘤形成は指摘できず。リンパ節腫大を認めない。

・画像診断：症状の原因は特定できない。

【頭部単純 MRI】(検査日:2022/03/23)

・頭蓋内に梗塞や出血、占拠性病変を認めない。脳の形態に明らかな異常なし。

・MRA で動脈に強い狭窄や拡張、動脈瘤はなし。左前大脳動脈近位部が低形成。両眼球および眼窩に異常を認めない。各副鼻腔と両乳突蜂巣の含気は保たれている。

			<ul style="list-style-type: none"> ・画像診断：症状の原因は特定できない。
22581	<p>多形紅斑； 発熱</p>		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医療関係者からの報告である。</p> <p>2022/04/11 当社 MR を通じて医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/05-2021/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06-2021/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/28 本剤 3回目接種。</p> <p>2022/04/05 多形滲出性紅斑が発現。全身に発疹、40 の発熱を認めた。当院受診し、多形滲出性紅斑と診断。入院。パルス療法を実施。</p> <p>2022/04/11 パルス療法を減量し、症状も軽快には向かっている。</p>

			<p>多形滲出性紅斑、発熱 40 の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22582	<p>深部静脈血栓症； 肺塞栓症</p>	<p>糖尿病； 脂肪肝； 脂質異常症； 高血圧</p>	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/04/28 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/21 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/22 当院整形外科受診。深部静脈血栓症の症状なし。</p> <p>2022/03/23 深部静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症を発症。右下肢の浮腫、血色不良が発現。</p> <p>2022/03/25 当科受診。右足背動脈触知するも、右下肢 > 左下肢の腫脹あり。呼吸苦あり。FDP 44.4 と上昇。D-ダイマー 9.0 と上昇。CAVI:問題なし。造影 CT にて、深部静脈血栓症、肺血栓あり。循環器内科へ紹介し、同日入院。ヘパリン開始。</p> <p>2022/03/29 リクシアナ服用開始。</p> <p>2022/03/30 ヘパリン中止。ADL 拡大。</p> <p>2022/04/11 症状の軽快を認め、退院。</p> <p>深部静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22584	<p>しゃっくり;</p> <p>てんかん;</p> <p>低ナトリウム血症;</p> <p>倦怠感;</p> <p>歩行障害;</p> <p>水分摂取量減少;</p> <p>発熱;</p> <p>頭痛;</p> <p>食欲減退</p>	<p>アトピー性皮膚炎;</p> <p>胃潰瘍</p>	<p>本例は、当社 MR を介して医師により報告された。</p> <p>2022/05/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/26 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/27 13:00 頭痛、発熱が発現。倦怠感を認めた。</p> <p>2022/03 頭痛、倦怠感、食欲不振、水分摂取ができない状態のため、入院。CRP 4.5。抗生剤の使用なし。アセトアミノフェンの反応が悪く、ロキソニン治療をしたところ、軽快。発汗できるようになり、解熱。</p> <p>2022/04/01 吃逆が出現。頭痛に対しロキソニン 1 錠 3 回/日、胃保護のためムコスタ 1 錠 3 回/日経口投与開始。</p> <p>2022/04/02 頭痛の回復、発熱の軽快を認めた。胃症状改善のためネキシウム 10 g 1 回/日、血圧・浮腫に対しフルイトラン 1 mg 1 回/日経口投与開始。退院。</p> <p>2022/04 退院後、吃逆が酷くなり、夜も眠れなくなるくらい出るようになった。何度か意識が飛んでいるようなことがあったとのこと。</p> <p>2022/04/07 吃逆が止まらなくて辛いことを主訴に、来院。歩行困難なぐらい憔悴。</p> <p>10:00 てんかん発作が発現。治療中、座位にて突然の意識障害、強直を認めた。ジアゼパム 10 mg 挿肛し、改善。10 分ぐらいで意識が戻り、発作後の麻痺は認めなかった。CRP 1.4。入院。その後出現することなし。てんかん発作は回復。ロキソニン、ムコスタ、ネキシウム、フルイトラン投与終了。柿蒂湯の内服開始。</p> <p>2022/04/08 トイレまで歩行でき、昼食は摂取できた。吃逆に対し芍薬甘草湯 3.0 g 1-3 回/日経口投与開始。</p> <p>2022/04/09 芍薬甘草湯投与終了。吃逆、不眠、てんかん予防のため</p>
-------	--	-----------------------------	---

		<p>デパケン R 20 g 1 回/日経口投与開始。</p> <p>2022/04/10 高血圧に対しアジルバ 20 g 1 回/日を経口投与開始。</p> <p>2022/04/15 吃逆は回復。</p> <p>2022/04 再入院時より柿蒂湯の内服にて改善。低ナトリウム血症を認め、水制限にて改善。</p> <p>2022/05/15 デパケン R 投与終了。</p> <p>2022/05/23 倦怠感は未回復。</p> <p>発熱、食欲不振、水分摂取できない状態、低ナトリウム血症、歩行困難の転帰は、軽快。頭痛、吃逆、てんかん発作の転帰は、回復。高血圧の転帰は、不明。倦怠感の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22585	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000166）である。</p> <p>経口避妊薬を服用中の被接種者。</p> <p>2021/06/02 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/06/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.2 。</p> <p>2022/02/24 18:00 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/01 左胸に痛み、息苦しさあり。他院にて検査し、異常なし。</p> <p>2022/03/03 当院受診。心筋炎疑いにて、CK-MB など採血で上昇しており、夕方には息苦しく立ってられないとして病院へ紹介。心筋炎の</p>

		<p>診断で入院。</p> <p>2022/03/07 症状軽快し、退院。</p> <p>心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22587	<p>大動脈解離破裂；</p> <p>突然死</p>	<p>大動脈弁狭窄；</p> <p>慢性腎臓病；</p> <p>血液透析；</p> <p>被嚢性腹膜硬化症；</p> <p>食物アレルギー</p> <p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000205）である。</p> <p>2022/05/12 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.4。</p> <p>2022/04/02 14:40頃 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/03 21:00頃 死亡推定。突然死であった。</p> <p>2022/04/04 17:30頃 血液透析に来院せず、連絡をとったが通じず。</p> <p>20:00 家人が訪問し、脱衣所で倒れているのを発見。検死の結果、死亡推定時刻は2022/04/03の21:00頃であった。CT検査施行し、死因は大動脈解離破裂の疑いであった。剖検なし。</p> <p>大動脈解離破裂の疑いの転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>

22596	骨端症	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>軟骨等の欠損は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/13 左腕に本剤 3 回目接種。左半身のしびれが発現。</p> <p>日付不明 悪寒が発現。解熱剤を服用。3 日程継続。</p> <p>2022/04/04 医療機関を受診。レントゲン、MRI 検査を実施。医師より、軟骨等の欠損など年齢的なものの可能性を指摘。</p> <p>2022/04/08 左半身のしびれが継続。</p> <p>左半身のしびれの転帰は、未回復。悪寒、軟骨等の欠損の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22599	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2210000212) である。</p> <p>2021/08/19 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/09/09 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.5 。</p> <p>2022/03/26 15:30 本剤 3 回目接種。</p>

			<p>2022/03/28 発熱。</p> <p>2022/03/29 胸部不快感が出現し、受診。心電図変化及び心筋逸脱酵素の上昇を認めた。</p> <p>2022/03/30 00:33 急性心筋炎として、入院。薬物療法を実施。</p> <p>2022/04/04 経過良好。症状の回復を認め、退院。各種心筋炎スクリーニングで特記所見なく、本剤関連心筋炎疑いと判断し、当科外来加療継続の方針。</p> <p>急性心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22603	<p>くも膜下出血；</p> <p>アナフィラキシー反応</p>	<p>知的能力障害；</p> <p>蕁麻疹；</p> <p>薬物過敏症；</p> <p>高安動脈炎</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000175）である。</p> <p>2022/04/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>高安動脈炎により、プレドニンの加療を受けていた被接種者。</p> <p>2021/09/01 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/09/22 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：35.6。</p> <p>2022/04/08 15:05 本剤3回目接種。接種時よりかゆみを認めた。</p> <p>15:35 アナフィラキシー反応が発現。身体のかゆみを訴える。両上肢、体幹、頸部と広範に蕁麻疹を認めた。体温 35.6、血圧 136/98 mmHg。</p> <p>15:45 頻回な咳、咽頭違和感が発現。サクシゾン、ポララミンを静脈</p>

		<p>注射。一時、咳、かゆみが軽減。</p> <p>16:15 再び咳が増加、かゆみ出現。喉のつまり感、飲み込み出来ないと訴える。アナフィラキシー中等症と判断。ボスミンを上腕に筋注後、アナフィラキシー症状低下したが、その後の強い頭痛を訴え、手の震え、血圧上昇を認めた。血圧 220/-。ニフェジピン舌下投与し、血圧 170/-になり、140/-と安定。救急搬送。咳は消失。搬送先病院にて意識低下を認めた。</p> <p>17:00 頃 アナフィラキシー反応が消失。</p> <p>18:30 頃 頭部 CT 検査施行。右側頭葉に限局性くも膜下出血を認めた。アナフィラキシーによるものではない。入院。</p> <p>20:00 頃 他院脳外科へ転院。</p> <p>2022/04/23 アナフィラキシー反応は回復しているが、くも膜下出血は加療のため入院中。</p> <p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復。右側頭葉くも膜下腔への出血の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22604	呼吸困難； 発熱； 頻脈	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師による報告であり、武田薬品工業株式会社が、モデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022591）である。</p> <p>2022/05/16 薬剤師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/08/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/09/04 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種後1ヶ月以内、発熱、病気等なし。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.9。</p>

2022/04/09 13:45 本剤3回目接種。

2022/04/10 午前、微熱が発現。パファリン2錠内服。

16:00頃 呼吸苦、頻脈、発熱を認めた。パファリン2錠内服。

21:03 救急搬送。体温38.7。経過観察入院。

21:08 ヴィンF 500 mL投与。カヌラ1 L/分で酸素吸入し、SpO₂ 97-98%。搬送前に100回/分とやや頻脈あるも、輸液投与にて90回/分へ改善。胸のドキドキがなくなる。搬送時胸の違和感の訴えがあったが、酸素投与にて改善傾向。呼吸苦も改善傾向だが、軽度認める。嘔気、嘔吐なし。肺音左右差なし、清、雑音なし。心音は整、雑音なし。心電図は洞調律、ST上昇等なし。胸部レントゲン検査は心拡大なし、C-P angle sharp。腹部レントゲン検査は左腹部にやや小腸ガスを認めた。コロナ陰性、インフルエンザA・B陰性。トロポニンは正常。

21:53 アセリオ1,000 mg投与。

23:07 パレプラス1 L+ヒシファーゲン20 mL×2、ファモチジン注20 mg 1Aを投与。

2022/04/11 朝食は常食1600 kcalを全量摂取。カロナール錠500 mg 3錠 分3 3回分処方。

10:30 症状の軽快を認め、退院。通院なし。

発熱、呼吸苦、頻脈の転帰は、軽快。左腹部にやや小腸ガスの転帰は、不明。

追跡調査予定なし。

22605	肝障害	<p>不眠症；</p> <p>子宮脱；</p> <p>白内障；</p> <p>胃食道逆流性疾患；</p> <p>胆石症</p>	<p>本例は、当社 MR とくすり相談窓口を介して医師により報告された。</p> <p>2022/04/27 当社 MR を介して医師により追加報告を入手した。</p> <p>2022/05/24 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/11 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/19 上腹部痛が発現。</p> <p>2022/03/20 発熱、咽頭痛が発現。</p> <p>2022/03/21 近医にて COVID-19 検査実施し、陰性。</p> <p>2022/03/26 肝障害が発現。皮膚黄染を自覚。近医受診。総ビリルビン 4.6。</p> <p>2022/03/29 前医へ紹介受診し、入院。造影 CT、MRI、バイタルサイン、肝炎マーカー等精査。ERCP も施行したが原因不明。元々内服していたデパス、ネキシウム、マイスリーを中止。上記精査でも原因不明であり、肝障害、黄疸の改善が得られないため当科へ転院となる。</p> <p>2022/04/20 当院へ転院。</p> <p>2022/04/21 肝生検を施行。薬剤性を疑う所見。</p> <p>2022/04/27 総ビリルビンが入院時の 9.5 から 5.1 に改善。検査値は徐々に改善した。</p> <p>2022/05/10 症状の軽快を認め、退院。</p> <p>上腹部痛、発熱、咽頭痛の転帰は、不明。肝障害の転帰は、軽快。</p>
-------	-----	---	---

			追跡調査予定なし。
22608	慢性心不全	<p>うっ血性心筋症；</p> <p>心障害；</p> <p>慢性心不全；</p> <p>糖尿病；</p> <p>肺気腫；</p> <p>虚血性心筋症</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022592）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000229）である。</p> <p>糖尿病、虚血性心筋症と拡張型心筋症の疑いで当院通院中の被接種者。</p> <p>2021/06/20 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日時不明 接種前の体温：35.9 。</p> <p>2022/03/11 14:45 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/14 02:00 慢性心不全増悪が発現し、呼吸苦、胸部違和感を自覚。朝まで様子を見ていたが改善しないため、当院へ救急搬送。入院。入院時の検査でCS1の心不全と診断され、ICU入室。非侵襲的陽圧換気(NPPV)による呼吸管理とニトログリセリン、利尿薬による治療を開始。</p> <p>2022/03/17 症状は改善傾向となり、ICUから一般病棟に転棟。</p> <p>2022/03/28 症状の軽快を認め、退院。</p>

		<p>慢性心不全増悪の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22609	ギラン・バレー症候群	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000216）である。</p> <p>2022/05/24 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/03 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06/24 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/02/17 14:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/02/19 10:00 眼瞼下垂、複視、右三叉神経感覚異常を認めた。</p> <p>2022/02/21 血液検査で抗 GM1 IgG 抗体陽性。</p> <p>2022/03/10 ギランバレー症候群が発現。嚥下障害を認めた。</p> <p>2022/03/14 当院入院し、ガンマグロブリン大量療法、ステロイド療法開始。</p> <p>2022/03/25 嚥下造影で嚥下困難、誤嚥を認めた。</p> <p>2022/03/31 症状改善。嚥下造影でも改善を認めた。</p> <p>2022/04/06 自宅退院。右三叉神経感覚異常残存。退院後は外来で経過を観察予定。ギランバレー症候群は未回復。</p> <p>2022/04/19 ギランバレー症候群再発。嚥下障害の再燃を認めた。</p>

2022/04/28 当院入院。ガンマグロブリン大量療法、ステロイド療法開始。抗 GM1 IgG 抗体陽性。

2022/05/18 当院退院。ギランバレー症候群再発は症状の軽快を認め、経過観察中。

ギランバレー症候群の転帰は、未回復。ギランバレー症候群再発の転帰は、軽快。

追跡調査予定なし。

【臨床症状】

- ・眼球運動障害、嚥下障害、右三叉神経感覚異常
- ・報告時点までの、症状の極期における Hughes の機能尺度分類 1：軽微な神経症候を認める

【疾患の経過】

- ・二相性のパターンで最初が 2 日、次が 22 日でその後安定

【鑑別診断】

- ・他の疾患に該当しない

【先行感染の有無】

- ・なし

22612	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000242）である。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/04/07 本剤3回目の接種。</p> <p>2022/04/08 10:00 心筋炎が発現。胸痛を認めた。</p> <p>2022/04/09 発熱が発現。当院受診。来院時、心電図でV2-V6、1、aVL誘導のST上昇。CK 989 U/L、CK-MB 73.0 U/L、Troponin-I 19.60 ng/mL、D-ダイマー 1.2 mcg/mLと上昇、CRP 7.18 mg/dLと炎症反応上昇を認めた。冠動脈検査でAch負荷試験実施し、結果は陰性。冠動脈造影検査で冠動脈に有意狭窄なく、急性心筋炎の診断。NSAIDs内服で経過フォロー。</p> <p>日付不明 入院。</p> <p>2022/04/11 心臓MRI検査で異常所見なし。心臓超音波検査で左室駆出率64%、異常所見なし。</p> <p>2022/04/12 胸痛は改善。</p> <p>2022/04/13 CK、CK-MB正常範囲内まで低下。</p> <p>2022/04/14 症状の軽快を認め、退院。</p> <p>急性心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	-----	---

22616	腎炎	<p>糖尿病；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000542）である。</p> <p>2022/05/27 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/06/21 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/12 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/11 本剤3回目接種。接種後、食欲低下、全身倦怠感が出現し持続。</p> <p>2022/04/01 ANCA関連腎炎発現。医療機関受診。CRP 15、Cr 2.85と高値を認め、当院を紹介受診。</p> <p>2022/04/05 WBC 10,500、CRP 14.58、Cr 5.27、eGFR 8.9、BS 335、Na 131、尿タンパク 0.39 g/gCr、尿潜血（3+）、MPO-ANCA 89.2、IgA 461と異常値を認めた。入院。</p> <p>2022/04/06 ANCA関連腎炎としてステロイド治療を開始。</p> <p>2022/04/14 症状は未回復。</p> <p>ANCA関連腎炎の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22618	強直性痙攣	<p>てんかん；</p> <p>痙攣発作；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000228）である。</p> <p>強直性けいれんは企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07/11 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p>

		<p>2021/08/01 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/01 時折けいれん発作を認めていたが、医療機関で精査は受けず。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.2 。</p> <p>2022/04/02 15:00 本剤 3 回目接種。0.3 mL を接種し、過量投与であった。</p> <p>15:10 経過観察中に興奮状態となり、強直性けいれんを繰り返し認めた。精神的に落ち着くころに発作の頻度は低下。症状の軽快を認めた。</p> <p>興奮状態、強直性けいれんの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22619	心筋炎	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/04/19 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて薬剤師による副反応報告症例 (TASK0022600) を入手した。</p> <p>2022/04/20 追加情報として、医療品医療機器総合機構を通じて薬剤師より副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2210000325) を入手した。</p> <p>2021/08/03 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/08/24 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/04/10 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/04/12 心筋炎が発現。注射後の発熱、胸痛、息苦しさを認めた。</p>

		<p>2022/04/13 医療機関を受診。血液検査でトロポニン I 2,707 ng/mL、CK 713 U/L、CRP 5.66 mg/dL、D-ダイマー 1.1 mcg/mLの上昇、AST 69 IU/L、ALT 73 IU/L。心臓超音波検査、心臓 CT 検査で異常所見なし。心電図検査で1、2、前胸部誘導でST上昇を認めたため、精査、加療目的に当院紹介受診。心筋炎の診断で入院となった。入院後、頭痛の訴えあり。</p> <p>2022/04/14 頭痛、胸痛は軽快。</p> <p>2022/04/18 採血、心電図施行。症状の軽快を認め、退院。</p> <p>心筋炎の転帰は、軽快。</p>
22625	SARS-CoV-2 検査陽性	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>コロナ陽性は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02-2022/03 頃 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/04 PCR 検査を受け、コロナ陽性を認めた。無症状で隔離中。</p> <p>コロナ陽性の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

			<p>リンパ球の出現の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22632	<p>心不全；</p> <p>横紋筋融解症；</p> <p>腎不全</p>	<p>尺骨骨折；</p> <p>悪性症候群；</p> <p>慢性腎臓病；</p> <p>統合失調症</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000258）である。</p> <p>統合失調症にて障害者資格を有し、慢性腎臓病で通院するも中断がある被接種者。</p> <p>2021/07/30 SARS-CoV-2（コロナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/19 SARS-CoV-2（コロナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.8。</p> <p>2022/03/12 15:00 本剤3回目接種。接種後、頭痛、39.7の発熱、倦怠感、悪寒が発現。夜のみ感冒薬服用。</p> <p>2022/03/14 18:00 横紋筋融解症、腎不全が発現。全身痛を認め、起き上がれなくなっているところを発見され、入院。GOT 1,440、GPT 240、CPK 20,000以上、LDH 4,378、Scr 1.36。ミオグロビン尿著明などから横紋筋融解症、腎不全の診断。大量輸液を3,500-4,000 mL/日で開始。尿道カテーテル留置。</p> <p>2022/03/15 GOT 1,321、GPT 262、CPK 57,890、LDH 2,405、Scr 1.46をピークに以後、改善。</p> <p>2022/03/20 GOT 253、GPT 152、CPK 6,148、LDH 549、Scr 1.14。輸液を3,000 mL/日に減量。尿量は3,500 mL/日。</p>

		<p>2022/03/21 心不全を認め、輸液を 1,500 mL/日に減量し、フロセミド開始。GOT 107、GPT 115、CPK 2,097、LDH 419、Scr 1.13。</p> <p>2022/03/26 尿道カテーテル抜去。</p> <p>2022/04/06 GOT 27、GPT 23、CPK 90、LDH 222、Scr 0.97。リハビリ介入にて短距離の歩行可能までに回復。</p> <p>2022/04/15 退院。</p> <p>横紋筋融解症、腎不全、心不全の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22633	アナフィラキシー反応	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000296）である。</p> <p>2022/05/30 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/10/13 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6。</p> <p>2022/04/17 16:17 本剤 3回目接種。</p> <p>16:20 アナフィラキシー反応が発現。頭痛、両上下肢に蕁麻疹、気分不良、広範にそう痒感、広範に発赤・紅斑が発現。血圧 137/73 mmHg。アドレナリン、アタラックス P、ファモチジン、リンデロン 2 mg を投与。</p> <p>17:00 血液検査実施。</p> <p>18:10 胸部レントゲン実施し、異常なし。入院。</p> <p>2022/04/18 退院。</p>

		<p>日付不明 症状は回復したが、後遺症として皮疹が継続。診察加療中である。</p> <p>アナフィラキシー反応の転帰は、回復したが後遺症あり。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22635	不整脈	<p>本例は、当社 MR を介して消費者により報告された。</p> <p>2022/04/19 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000549、v2210000553）を入手した。</p> <p>2022/04/20 当社 MR を介して医師より追加情報を入手した。</p> <p>2022/04/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>持病がない被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/02/06 午前中、本剤 3 回目接種。39 の発熱が発現。ロキソニンを服用し、その後解熱。</p> <p>2022/02/08 20:00 頃 生存を確認。その後、不整脈が発現し、死亡。</p> <p>2022/02/09 07:00 自室にて左側臥位で死亡しているのを発見。</p> <p>09:08-09:48 報告医により検死が行われた。死後 CT では特筆すべき所見なし。頭部 CT：くも膜下出血など器質的脳内病変なし。胸部 CT：特記すべき所見なし。冠動脈硬化なし。腹部 CT：脂肪肝、胃内食物残渣あり。</p> <p>突然死であること、CT で冠動脈を含めて特記すべき所見がないこと、</p>

		<p>検診で心電図は撮っていないため生前の心臓の状態は不明であることから、死因は不整脈死と判断。ご家族から承諾いただけず、剖検は未実施。</p> <p>発熱の転帰は、回復。不整脈の転帰は、死亡。脂肪肝の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p> <p>【検死所見】（実施日：2022/02/09）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直腸温 31 、室温 17 、外気温 7 。 ・死後硬直：顎（++）、首（++）、肩（+）、肘（++）、手首（++）、指（++）、股（++）、膝（++）、足関節（++）、足趾（++）。 ・死斑：半ば消える。 ・角膜：透明。 ・瞳孔：正円。 ・頸動脈怒張：右なし、左軽度。 ・溢血点：左右眼瞼に針先大 27、針頭大が 4 つ。
22639	心筋梗塞	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>2022/04/18 くすり相談窓口を通じて被接種者本人より追加情報を入手した。</p> <p>心筋梗塞の疑いは企業により重篤と判断された。</p>

		<p>精神科に通院している被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/12 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/17 精神科受診。血液検査実施。CPK の数値が通常 100 ぐらいだが 562 まで上昇を認めた。医師より本剤の影響と思われる心筋梗塞の疑いを指摘された。CPK の上昇に関して、薬の処方はない。</p> <p>2022/04/17 頃 再検査し、CPK の数値が 74 に下がっていた。</p> <p>心筋梗塞の疑いの転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22642	ギラン・バレー症候群	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例 (厚生労働省受付番号 : v2210000281) である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温 : 36.5</p> <p>2022/03/05 15:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/06 朝、両下肢の脱力があり動けず、食事も摂取出来ない状態になる。</p> <p>2022/03/08 救急要請にて当院へ搬送。症状・身体所見からギランバレー症候群と判断。入院。</p> <p>2022/03/14 自己抗体検査実施、陰性。先行感染なし。</p>

		<p>ギランバレ症候群の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p> <p>【臨床症状】</p> <p>両側性かつ弛緩性の上肢や下肢の筋力低下（発現日：2022/03/06）</p> <p>報告時点までの、症状の極期における Hughos の機能尺度分類 4: ベッド上あるいは車いすに限定（支持があっても 5 m の歩行が不可能）</p> <p>【疾患の経過】</p> <p>単相の疾患パターンを有し、筋力低下の発現から最悪の状態までの間隔が 12 時間から 28 日間であって、その後に臨床的安定期を迎えた（報告時点までの内容を元に選択）</p>
22643	意識消失	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>意識消失は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/07/31 12:30 頃 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/08/27 12:30 頃 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/04/16 12:30 頃 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/04/17 夜中、腕の痛み、接種部位の痛み・かぶれが発現。</p> <p>2022/04/18 歩いている途中で意識を失って倒れた。</p>

			<p>腕の痛み、接種部位の痛み・かぶれ、意識消失、倒れたことの転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22648	腸間膜動脈血栓症		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/03/24 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/28 医療機関受診。</p> <p>2022/03 上腸間膜動脈血栓症を認めた。</p> <p>2022/03/30 入院。</p> <p>上腸間膜動脈血栓症の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22649	体調不良	血圧上昇	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>胃の薬を服用している被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/27 本剤 3 回目接種。</p>

			<p>2022/03/26 体調不良を訴えた。</p> <p>2022/04/20 現在、入院し透析中。医師から、値が良くならないと言われている。</p> <p>体調不良の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22656	アナフィラキシー反応	<p>睡眠時無呼吸症候群；</p> <p>高血圧；</p> <p>SARS-CoV-2 検査陽性</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した保健師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000341）である。</p> <p>アナフィラキシーは企業により重篤と判断された。</p> <p>1 か月以内にコロナ陽性（中等症）のため入院歴のある被接種者。</p> <p>2021/07/11 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/08/01 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.6 。</p> <p>2022/02/27 09:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>10:20 接種後、アナフィラキシーが発現。全身倦怠感、呼吸困難感、前胸部発赤を認め、来所。血圧 141/104、脈拍 91 回/分、酸素飽和度 98%。医師の診察にて、グレード 1 のアナフィラキシーと診断。バイタル観察にて経過観察。</p> <p>10:30 ショック症状ないが、前胸部紅斑等の変化ないためポララミン 5 mg、ソルコーテフ 125 mg の点滴開始。</p> <p>10:50 ルパフィン 10 mg 1 錠内服。</p>

		<p>11:35 血圧 111/78、脈拍 59 回/分、酸素飽和度 96%。自覚的呼吸困難感改善。医師より点滴終了後帰宅の指示。</p> <p>11:51 点滴終了。血圧 118/81、脈拍 63 回/分、酸素飽和度 97%。前胸部紅斑、自覚症状軽快し、帰宅。</p> <p>2022/02/28 経過確認し、前日の自覚症状が軽快していることを確認。</p> <p>アナフィラキシーの転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22665	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000364）である。</p> <p>2021/06 頃 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/06 頃 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/04/02 17:30 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/04/03 体全体の痛みが発現。</p> <p>2022/04/05 06:30 微熱、前胸部痛、胸部違和感が発現。前医を受診。COVID-19 陰性確認。</p> <p>2022/04/06 前胸部痛が続き、前医受診。下壁誘導の ST 上昇様もあったため、心筋炎の可能性あり当院へ紹介。採血にて、トロポニン I、CK/CK-MB が高値であったため、心筋炎の診断となり、安静経過観察目的で入院。</p> <p>2022/04/07-2022/04/08 トロポニン I、CK/CK-MB の採血実施し、経過観察。それぞれの値は低下を認めた。</p> <p>2022/04/09 胸部症状はほぼ完解したため、退院。</p>

			<p>体全体の痛みの転帰は、不明。心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22670	脊髄炎	<p>糖尿病；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000365）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/03/08 08:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/09 38の発熱、全身痛あり。ロキソニン服用。</p> <p>2022/03/10 脊髄炎が発現。朝、両手首以遠及び両膝以遠のしびれ感、脱力感が出現。</p> <p>2022/03/13 夜、しびれが臍下まで上行。</p> <p>2022/03/15 当科紹介受診。不全対麻痺、Th8以遠の痛覚鈍麻、両下肢振動覚鈍麻を呈しており、脊髄MRIでTh5付近での脊髄炎を示唆する異常信号を認めた。</p> <p>2022/03/16 入院。ステロイドパルス5日間を施行。</p> <p>2022/03/17 施行2日目より、対麻痺改善を認めた。</p> <p>2022/03/21 対麻痺は軽快。感覚障害に関してはしびれ感は改善傾向も感覚鈍麻は残存。</p> <p>2022/03/26 自宅退院。外来通院治療となる。</p>

			<p>2022/04/19 症状の軽快を認めた。</p> <p>脊髄炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22671	<p>ブドウ球菌性敗血症；</p> <p>播種性血管内凝固；</p> <p>腰筋膿瘍；</p> <p>関節膿瘍</p>	<p>関節痛</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000382）である。</p> <p>2021/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/09 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/16 本剤3回目接種。元から痛みがあった股関節痛が増悪した。</p> <p>2022/03/30 食思不振。</p> <p>2022/04/01 救急搬送。ブドウ球菌（MSSA）敗血症、右肩・両側股関節・右腸腰膿瘍を認め、入院。血小板2.8万/mcL。その後、緊急処置としてRBC、血小板、FFP輸血施行。</p> <p>2022/04/02 緊急手術。ICU入室。</p> <p>日付不明 播種性血管内凝固症候群が発症。</p> <p>股関節痛増悪の転帰は、不明。ブドウ球菌（MSSA）敗血症、右肩・両側股関節・右腸腰膿瘍、播種性血管内凝固症候群の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22673	意識消失; 痙攣発作; 発熱; 脳出血	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した看護師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000402）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/04/13 14:00 本剤3回目接種。</p> <p>23:30 意識消失、痙攣、発熱が発現。その後も JCS 3-300、発熱が継続。点滴管理し、頭部 CT 上左側頭部位に高吸収認め、脳出血疑いで他院救急外来へ搬送。そのまま転院となる。</p> <p>2022/04/14 入院。</p> <p>意識消失、痙攣、発熱、脳出血疑いの転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22675	間質性肺疾患	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/06 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/08 胸がくすぐるような症状、咳が発現。</p> <p>日付不明 間質性肺炎と診断。入院。他に疑わしいものはない。</p> <p>2022/04/26 症状は改善傾向。退院を検討中。</p>

			<p>間質性肺炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22677	<p>下痢；</p> <p>倦怠感；</p> <p>嘔吐；</p> <p>末梢性ニューロパチー；</p> <p>発熱</p>	<p>腹部不快感；</p> <p>過敏症</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/04/25 追加情報として、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022603）を入手し、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000411）を入手した。</p> <p>2022/04/25 追加情報として、当社 MR を介した医師による報告を入手した。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/12 15:15 本剤3回目接種。発熱、倦怠感、接種部位の痛み、腕の痛み、末梢のしびれが発現。</p> <p>2022/03/14 23:00 末梢神経障害、食欲不振、下痢が発現。</p> <p>2022/03/16 発熱、下痢、嘔吐、しびれ、以前からあった胃部不快感のため入院。輸液、制吐剤、アセトアミノフェンで対症療法。</p> <p>2022/03 上部内視鏡をしたが、胃部不快感に特に問題なし。</p> <p>2022/03/31 胃部問題なく、退院。</p> <p>2022/04/21 腕のしびれが継続するため、外来受診。継続した末梢神経障害。症状は未回復。</p> <p>発熱、倦怠感、接種部位の痛み、食欲不振、嘔吐、下痢の転帰は、不</p>

		<p>明。末梢神経障害の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22683	<p>傾眠；</p> <p>四肢痛；</p> <p>感覚鈍麻；</p> <p>筋痙縮；</p> <p>筋緊張</p>	<p>食物アレルギー</p> <p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000424）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.4 。</p> <p>2022/04/12 15:30 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/15 22:00 右大腿から下肢の張り、つり感、疼痛、痺れ感が出現。</p> <p>日付不明 体温36.4 。</p> <p>起床の辛さがあり、立位はできても座位不可となった。</p> <p>日付不明 医療機関に相談。整形的と指摘された。</p> <p>2022/04/22 症状は未回復。</p> <p>下肢の張り・つり感・疼痛・痺れ感、起床の辛さの転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22695	心筋炎	<p>肥満; 自閉症スペクトラム 障害</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000688）である。</p> <p>2022/05/24 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/04/23 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/26 05:00 心筋炎が発現。胸痛、全身倦怠感が出現。近医受診。心電図変化及び血液検査でCK(-MB)の上昇を認めた。アセトアミノフェンの定時内服開始。</p> <p>2022/04/27 当院を救急受診。12誘導心電図では1、aVL誘導のST上昇を認めた。血液検査ではCK 251 U/L、CK-MB 8 U/L、CRP 2.07 mg/dLと高値であり、当院入院。</p> <p>2022/04/28 血液検査でトロポニンT 0.331 ng/mLの上昇を認めた。心臓超音波検査にて左室駆出率52%、軽度の心嚢液貯留を認めるも生理的貯留として矛盾しない量であり、異常を疑う所見。</p> <p>2022/05/13 症状の回復を認めた。</p> <p>心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	-----	---------------------------------	--

22702	<p>心肥大；</p> <p>心肺停止；</p> <p>無呼吸</p>	<p>僧帽弁修復；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000719）である。</p> <p>2022/06/01 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.4 。</p> <p>2022/04/25 10:00 KT 36.4 、BP 135/96、P 84。</p> <p>13:00 KT 36.2 。</p> <p>15:50 本剤3回目接種。</p> <p>16:15 問題ないことを話した。</p> <p>2022/04/26 07:30 KT 39.3 。発熱が発現。疼痛、倦怠感を認めた。カロナール300 mg 1錠内服。</p> <p>13:40 KT 39.9 。体熱感、倦怠感、悪寒を認めた。腕に力入らず起き上がれず、自立で起坐できない状態のため、介助。カロナール300 mg 1錠内服。</p> <p>14:18 尿意を訴え、対応中に失禁。ふらつくため尿器設置。</p> <p>14:55 職員が代理で水分購入。用紙記入できず、書字も困難。感謝の言葉を伝え、摂取する。</p> <p>16:30 言語聴覚士が訪問。会話した。</p> <p>17:47 心肺停止。うつ伏せでベッド上臥床。声かけ、肩を叩くが無反応。仰臥位にし、無呼吸状態。</p> <p>17:48 胸骨圧迫開始。アンビューバッグにて人工換気。</p> <p>17:58 右前腕24 G、生食500 mLにてルート確保。頸動脈触れず、呼吸再開せず。</p>
-------	-------------------------------------	--------------------------	--

18:00 生食 500 mL 点滴静脈注射開始。

18:03 脈触れず、呼吸再開せず。

18:06 気管挿管。

18:10 ボスミン 1 mg 混注。

18:15 酸素 10 L 投与開始。

18:17 ボスミン 1 mg 追加投与。挿管拔去し、アンビューバッグにて人工換気。

18:19 救急隊到着。

18:25 気管挿管。

18:32 三次救急へ搬送。

18:45 救急病院到着。救命処置。

19:03 死亡確認。

日付不明 剖検実施。血栓は否定、致死的な心肥大を認めた。

発熱、疼痛、倦怠感、体熱感、悪寒、腕に力が入らない、失禁の転帰は、不明。心肺停止、無呼吸、致死的な心肥大の転帰は、死亡。

追跡調査予定なし。

22706	<p>ギラン・バレー症候群；</p> <p>低アルブミン血症；</p> <p>呼吸不全；</p> <p>意識変容状態；</p> <p>栄養状態異常</p>	<p>心筋梗塞；</p> <p>結腸癌；</p> <p>腸閉塞；</p> <p>誤嚥性肺炎</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告である。</p> <p>2022/05/30 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/10 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/31 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/31 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/10 ギラン・バレー症候群が発現。下肢優位の四肢脱力、構音障害が出現。</p> <p>2022/04/11 症状が増悪。嚥下障害も出現し、当院当科外来を受診。四肢の筋力はMMT 3レベルで立位・歩行不可能。構音・嚥下障害、四肢腱反射消失も認め、精査加療目的で緊急入院。誤嚥性肺炎の合併もあり、抗生剤（ユナシン 12 g/日）投与開始。</p> <p>夜、2型呼吸不全によるCO2ナルコーシス、意識障害を認め、NIPPV装着の上CCUに入室。2022/04/12 四肢筋力低下はさらに増悪し、手指がわずかに動く程度になった。神経伝導検査を施行し、最重症の脱髄型のギラン・バレー症候群（AIDP）と診断。大量免疫グロブリン療法を開始し、5日間実施。腰椎穿刺にてタンパク細胞解離も確認。</p> <p>2022/04/13 朝、四肢の動きは全く見られなくなり、NIPPVでは呼吸状態が保てなくなり緊急に挿管、呼吸器装着となった。自律神経障害も合併し、高度の血圧変動（収縮期血圧60-220台を変動）も認めため、CCU管理を継続。</p> <p>2022/04/15 自発呼吸はほとんど見られず、呼吸器管理が長くなることが予想され、気管切開術を施行。</p> <p>2022/04/26 四肢麻痺と呼吸筋麻痺の改善は乏しかったが、血圧変動はやや改善あり、一般病棟へ転棟。</p> <p>2022/04/27 栄養状態悪化が進行し、Alb 2.0と低アルブミン血症が進行。それによる胸水貯留・全身浮腫・呼吸状態悪化を認めた。3日間アルブミンを投与した。</p> <p>日付不明 アルブミン投与後、リハビリテーションを継続。</p>
-------	---	---	--

2022/05 初旬、自発呼吸が見られるようになり、呼吸器離脱に向けて徐々に呼吸器のウイーニングを開始。

2022/05 頸部、両肩の動きが見られるようになった。

2022/05/26 四肢の麻痺は高度のまま推移している。

ギラン・バレー症候群の転帰は、未回復。2型呼吸不全、意識障害、栄養状態悪化、低アルブミン血症の転帰は、不明。

追跡調査予定なし。

【臨床症状】

- ・両側性かつ弛緩性の上肢や下肢の筋力低下。（発現日：2022/05/10）
- ・筋力低下を来した上肢や下肢における深部腱反射の低下または消失。
- ・報告時点までの、症状の極期における Hughes の機能尺度分類は 5。補助換気を要する。

【疾患の経過】

- ・单相の疾患パターンを有し、筋力低下の発現から最悪の状態までの間隔が 12 時間から 28 日間であって、その後に臨床的安定期を迎えた。

【鑑別診断】

- ・他の疾患に該当しない。

【自己抗体の検査】

- ・医療機関に検体を送付し、結果待ちである。

			<p>【先行感染の有無】</p> <p>・なし。</p>
22712	キャッスルマン病	キャッスルマン病	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000704）である。</p> <p>2022/05/26 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/18 11:45 本剤3回目接種。TAFRO症候群再燃が発現。接種後、発熱を認めた。</p> <p>2022/04/04 発熱は継続し、当院受診。全身性浮腫を認め、採血では貧血、血小板減少の進行を認めた。外来にて治療強化。</p> <p>2022/04/21 発熱及びTAFRO症候群再燃と思われる症状が継続し、腹水が著明に貯留したため当院入院加療。</p>

			<p>2022/04/25 腹水穿刺を施行。</p> <p>2022/04/27 38 を超える発熱は改善。採血上炎症反応はピークアウトし、貧血、血小板減少が進行しないため自宅退院とした。症状の軽快を認めた。</p> <p>TAFRO 症候群再燃の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22724	ミラー・フィッシャー症候群	上咽頭炎	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた薬剤師からの報告であり、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（TASK0022607）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000746）である。</p> <p>2021/08/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/08/26 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03 中旬-下旬、咳嗽、発熱を伴う風邪をひいた。</p> <p>2022/03/31 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/03 起床時、フィッシャー症候群が発現。両下肢の脱力感を自覚し、階段を降りる時に力が抜けるような感じがあった。夕、両手のしびれ感も出現し、複視も自覚。</p> <p>2022/04/04 症状改善せず。</p> <p>2022/04/05 朝、歩行時のふらつき、口内のしびれ感を自覚するようになったため、病院に救急搬送。採血や頭部MRIでは異常なく、経過から神経筋疾患が疑われ、当院に転院搬送。経過からギラン・バレー症候群が疑われたが、筋力低下や感覚障害は目立たず、神経伝導検査でも脱髄や軸索障害を示唆する所見は得られなかった。非常に軽微なフィッシャー症候群と判断し、外来で経過観察を行うかグロブリン治</p>

		<p>療か相談したところ治療を選択。入院。</p> <p>2022/04 入院時採血の GQ1b 抗体が陽性と判明し、フィッシャー症候群と診断。</p> <p>2022/04 自覚的に軽度改善が見られた。</p> <p>2022/04/19 症状の軽快を認め、退院。以後外来で症状の確認をする。</p> <p>フィッシャー症候群の転帰は、軽快。</p> <p>報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22725	<p>心肺停止；</p> <p>急性心不全</p>	<p>糖尿病；</p> <p>高血圧</p> <p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000745）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/04/22 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/04/23 体調不良を認めた。</p> <p>2022/04/29 急性心不全が発現。救急要請し、心肺停止状態から心拍再開。心不全と診断。入院。</p> <p>体調不良、急性心不全、心肺停止の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22726	心筋炎	心筋梗塞; 狭心症	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000775）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/03/12 11:15 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/13 00:00 発熱が発現。</p> <p>2022/03/14 09:00 急性心筋炎が発現。胸痛を自覚。夕方、他院受診。血液検査、XPにて異常なし。本剤副反応診断にて、カロナール錠500mg内服。</p> <p>2022/03/15 11:00頃 胸痛増悪を認めた。夜間、改善なく救急要請。当院搬送。搬送時、胸痛はNRS 10/10。</p> <p>2022/03/16 未明、ST上昇、CK-MB 21.5 ng/mL、トロポニン 6,111.7 pg/mLを認め、副反応疑いによる急性心筋炎の診断にて入院。ヘパリンNa持続投与開始。</p> <p>03:30 胸痛はNRS 0/10と自然軽快し、自覚症状消失。冠動脈造影CTでは狭窄なし。</p> <p>13:00 心筋逸脱酵素は採血時点でピークアウトを確認。</p> <p>2022/03/20 症状の回復を認め、退院。</p> <p>急性心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	-----	--------------	--

22730	<p>ショック； 急性心筋梗塞</p>		<p>本例は、くすり相談窓口を通じた医師からの報告である。</p> <p>2021/07/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/26 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/04/13 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/14 00:00頃 ショック状態となり、搬送され入院。急性心筋梗塞の可能性がある。かなり厳しい様子。</p> <p>ショック、急性心筋梗塞の可能性の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22731	<p>倦怠感； 肝機能異常； 食欲減退</p>	<p>うっ血性心筋症； 下垂体出血； 下垂体機能低下症； 人工心臓植込み； 低カリウム血症； 尿崩症； 心不全； 肺高血圧症； 胃食道逆流性疾患； 貧血； 高コレステロール血症；</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000755）である。</p> <p>2022/06/01 医師より追加情報を入手した。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.2。</p> <p>2022/04/12 11:00頃 体調に異常なく、本剤3回目接種。</p> <p>18:00頃 38.9の発熱、食思不振が出現。</p> <p>2022/04/14 自宅で安静にしていたが、徐々に食思不振、嘔気が出現。食事摂取できず。</p> <p>2022/04/15 肝機能障害、全身倦怠が発現。発熱が回復。夕、嘔吐が出現。全身倦怠が悪化。</p>

		<p>高血圧</p>	<p>22:37 救急車で来院。生化学的に肝機能障害、炎症反応を認めた。食思不振が持続し、食事摂取できず。飲水は可能。入院。</p> <p>2022/04/18 採血にて、肝機能障害が回復。炎症反応も改善傾向。</p> <p>2022/04/19 入院安静にて徐々に食事摂取可能となる。</p> <p>2022/04/20 食事全量摂取可能。食思不振、全身倦怠が回復。</p> <p>2022/04/22 退院。</p> <p>発熱、全身倦怠、食思不振、肝機能障害の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
22736	心筋炎	ウイルス性心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001007）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/04/09 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/10 39の発熱が発現。</p> <p>2022/04/12 心筋炎発現。起床時、胸痛を認めた。近医受診。心筋炎疑いで当院紹介受診。心電図では広範誘導でST上昇、採血で高感度トロポニンI 32,398 pg/mL、CK-MB 45.6 U/Lの心筋逸脱酵素上昇を認め、心筋炎の診断で入院。</p> <p>2022/04 冠動脈CTで冠動脈病変なし、心臓造影MRIで心尖部中心としたT2高信号、LGE陽性を認めた。採血で一般的な心筋炎の原因となりうるウイルス抗体価の上昇なく、本剤関連心筋炎の確定診断。</p> <p>2022/04/23 退院。</p>

			<p>2022/04/28 症状の軽快を認めた。</p> <p>日付不明 心電図変化の残存があり、現在も外来通院で経過観察中。</p> <p>心筋炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22740	COVID - 19	脳梗塞	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>コロナ感染は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/01/07 脳梗塞で入院。</p> <p>2022/03 初旬、入院中に本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/03/10 退院。</p> <p>日付不明 退院後、コロナ感染を認めた。</p> <p>コロナ感染の転帰は、不明。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>

22746	<p>徐脈；</p> <p>心突然死；</p> <p>心肺停止；</p> <p>意識レベルの低下；</p> <p>散瞳；</p> <p>胸部不快感；</p> <p>落ち着きのなさ；</p> <p>血圧低下；</p> <p>酸素飽和度低下</p>	<p>便秘；</p> <p>出血性胃潰瘍；</p> <p>心不全；</p> <p>慢性腎臓病；</p> <p>糖尿病；</p> <p>脂質異常症；</p> <p>頸動脈硬化症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した看護師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000814）である。</p> <p>2021/06/14 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/05 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/27 10:15 本剤3回目接種。接種直後から副反応等の症状なく経過。</p> <p>22:00 就寝。</p> <p>2022/02/28 00:55頃 就寝中、急に胸苦を訴えたため、当院の救急外来に救急搬送。</p> <p>01:10 救急隊が到着した際はJCS 3程度の意識レベル低下であったが、酸素10L投与下でSpO2値87%と酸素化不良を認め、補助換気を開始。</p> <p>01:25 当院に到着直前から不穏状態となり、来院後、直ぐに血圧低下、徐脈、瞳孔散大と状態が悪化。自発呼吸なく、頸動脈触知できず、心肺停止と判断し、胸骨圧迫開始とBVM換気を継続。有効な心肺蘇生を継続したが、家族より心肺蘇生中止の申し出あり。</p> <p>01:40 死亡確認。CT施行したが死因は不明。原因究明のため病理解剖を勧めたが希望されず、直接の死因は急性心臓死となった。</p> <p>胸苦、意識レベル低下、酸素化不良、不穏状態、血圧低下、徐脈、瞳孔散大、心肺停止の転帰は、死亡。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	--	---	---

22750	心筋炎	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001074）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5。</p> <p>2022/04/22 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/23-2022/04/24 39 程度の発熱を認めた。</p> <p>2022/04/25 07:00 心筋炎発現。胸痛を認めたため、循環器内科を受診。心電図や心臓超音波検査では明らかな心筋炎を疑う所見は認めなかったが、採血にてCK 381 U/L、CK-MB 29.1、トロポニンI 2,393.5 pg/mLと心筋逸脱酵素の上昇を認めたため、経過から本剤による副反応としての急性心筋炎が疑われた。新型コロナウイルス抗原定量検査は陰性。心不全や不整脈は認めなかったが大事をとり、入院加療。入院後の冠動脈CT検査では冠動脈病変は認めなかった。心臓MRIを施行。急性心筋炎として、慎重に経過観察を行った。</p> <p>2022/04/28 胸痛症状が消失。心筋逸脱酵素の上昇はピークアウトとCKは正常化し、トロポニンIは173.9 pg/mLまで低下。心不全徴候や不整脈の出現なく、経過良好のため退院。</p> <p>2022/05/10 当科再診。症状再燃はなく、心臓超音波検査再検でも心機能低下などの出現はなく、採血ではトロポニンIは正常化。症状の回復を認めた。</p> <p>急性心筋炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	-----	--

22753	皮膚粘膜眼症候群	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000811）である。</p> <p>皮膚粘膜眼症候群は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/09/21 SARS-CoV-2（コヒナテイ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/10/12 SARS-CoV-2（コヒナテイ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.3。</p> <p>2022/04/27 16:35 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04 末、皮膚粘膜眼症候群が発現。徐々に前額部・目・鼻の周囲に腫脹と痛みを自覚していたが、痛みや発熱、頭部リンパ節腫脹なく、部活動含む学校生活は送れていた。</p> <p>2022/05/09 17歳に3回目接種し、誤接種であったことが判明。家族へ連絡。</p> <p>2022/05/10 診察。症状は軽度顔のみである。</p> <p>皮膚粘膜眼症候群の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	----------	---

22754	<p>冠動脈炎；</p> <p>冠動脈狭窄；</p> <p>循環虚脱；</p> <p>心筋炎；</p> <p>脱水</p>	<p>虚血性大腸炎；</p> <p>高尿酸血症；</p> <p>高血圧</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000835）である。</p> <p>2022/05/31 医師より追加情報を入手した。</p> <p>2021/07/10 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/31 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/24 出勤時、腹痛、下痢の訴えあり。</p> <p>2022/03/25 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/28 無断欠勤。</p> <p>2022/03/29 無断欠勤。17:00頃 寒気の訴えあり、救急車呼ぶも拒否。</p> <p>2022/03/30 10:00頃 心筋炎が発現。その後、死亡発見。突然死であった。</p> <p>2022/03/31 死後約27時間後、行政解剖実施。死因は脱水を伴う急性循環不全。急死所見あり。心重量386g。心筋小静脈周囲間質の多中心性巣状炎症細胞浸潤（M主体）、浮腫、心筋好酸性・波状変性を認め、心筋炎（心筋間質炎）の所見。右冠状動脈・左前下行枝の中流域外膜の小血管周囲に軽度の炎症細胞浸潤（M主体）を認め、冠状動脈外膜小血管周囲炎の所見。解剖時、LMT:25%、LAD:25%、CX:25%、RCA:25%であり、冠動脈狭窄を認めた。血液検査ではNT-proBNP 15,900 pg/mL。CoV-2 S-IgG抗体陽性であり、濃度31,200 AU/mL。CTでは異常所見なし。</p> <p>心筋炎、脱水を伴う急性循環不全の転帰は、死亡。冠状動脈外膜小血管周囲炎、冠動脈狭窄の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定なし。</p>
-------	---	---	---

22756	末梢性ニューロパチ —	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000834）である。</p> <p>末梢神経障害は企業により重篤と判断された。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/23 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/24 末梢神経障害が発現。接種部位より指先まで疼痛を認め、鈍痛、重い感じの症状。左第4指の薬指を曲げると痛みを認めた。</p> <p>2022/05/10 当院受診。血液検査でWBC 4,800、CRP<0.50。その他血液検査異常なし。末梢神経疼痛疑い。タリージェ投与。</p> <p>2022/05 現在、症状持続。</p> <p>末梢神経障害の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査を試みたが、報告者の協力が得られず、追跡調査不能。</p>
22759	末梢性ニューロパチ —	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000846）である。</p> <p>2022/05/20 追加情報として、医薬品医療機器総合機構を通じて医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000910）を入手した。</p> <p>2021/10/08 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p>

			<p>2021/10/29 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/04/29 本剤 3 回目接種。</p> <p>2022/05/06 05:00 頃 末梢神経障害が発現。左上肢の筋力低下を認めた。午前、左肩甲骨部から左上腕部の疼痛、左上肢のしびれ感、左肩甲骨周囲、左肩注射部の腫脹、圧痛著明。左肩・肘・手関節の拘縮、左上肢・正中・尺骨・橈骨神経の刺激症状を認めた。</p> <p>2022/05/09 外来で痛みに対する投薬加療を行うも軽快せず。</p> <p>2022/05/16 入院。</p> <p>2022/05/19 ペインコントロールを主たる目的とする治療のため、他医療機関へ紹介。</p> <p>末梢神経障害の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22762	<p>失見当識；</p> <p>幻覚；</p> <p>徘徊癖；</p> <p>激越；</p> <p>譫妄</p>	認知症	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000842）である。</p> <p>2021/05/08 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1 回目接種。</p> <p>2021/05/29 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2 回目接種。</p> <p>2022/02/12 本剤 3 回目接種。接種後から急に夜間徘徊、見当識低下など BPSD が出現し、せん妄となった。</p> <p>2022/02/13 幻覚、興奮が発現。</p> <p>2022/03/12 かかりつけ医よりコントミン処方。</p> <p>2022/03/28 認知判断力低下及び強い興奮、幻覚は継続したため、当科初診。初診時、幻覚、興奮を認めた。</p>

		<p>日付不明 本剤接種後である訴えを重視して少量のプレドニンを内服し、軽快。</p> <p>2022/05/12 症状の回復を認めた。</p> <p>幻覚、興奮、夜間徘徊、見当識低下、せん妄の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22763	<p>心筋炎； 心膜炎</p>	<p>本例は、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022638）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000869）である。</p> <p>心筋炎、心膜炎は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/10 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/05/07 本剤3回目接種。心筋炎、心膜炎が発現。夜、発熱、胸痛を認めた。</p> <p>2022/05/11 数日しても改善しないため、医療機関受診。採血で異常値があり当院紹介。循環器内科医診察し、CPK 766 U/L、CK-MB 51 U/L、CRP 2.5 mg/dLの上昇、心電図でST上昇を認めた。心臓超音波検査・胸部X線検査では、異常所見なし。内服処方され、帰宅。</p> <p>2022/05/13 再診にてCPK、CK-MBの低下、トロポニンT陽性、心電図でのSTの緩和が認められ、本剤による副反応と診断。</p> <p>2022/05/16 症状の回復を認めた。</p>

			<p>心筋炎、心膜炎の転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22769	<p>ネフローゼ症候群；</p> <p>全身性エリテマトーデス；</p> <p>脳炎；</p> <p>脳症；</p> <p>認知障害</p>	<p>シェーグレン症候群；</p> <p>十二指腸潰瘍；</p> <p>大動脈瘤；</p> <p>子宮脱；</p> <p>浮動性めまい；</p> <p>皮膚嚢腫；</p> <p>結腸直腸腺腫；</p> <p>頸椎部脊髄損傷；</p> <p>頭部下垂症候群</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001125）である。</p> <p>独居で認知症の無い被接種者。</p> <p>2021/06/29 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/07/20 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2021/11 当院尿検査で尿蛋白陰性。</p> <p>2022/01/27 普段と変わりなし。</p> <p>2022/03/05 本剤3回目接種。</p> <p>2022/3 全身性エリテマトーデスが発現。</p> <p>2022/03/16 認知機能障害、脳炎・脳症、ネフローゼ症候群が発現。何度も同じことを聞く、眼鏡などなくして探す、曜日感覚がなくカレンダーをじっと見ている、トイレの水を流さず尿・便失禁することに気付いた。食事を作るが生活に気力がなくなり、着物の着付け、計算や伝票記載、携帯電話の操作が出来なくなった。</p> <p>2022/03/25 外で転倒し、杖を借りた。自動車自損事故を繰り返したため、免許返納。</p> <p>2022/03/28 神経内科を受診。検査や入院を拒否し帰宅。</p> <p>2022/03/30 歩けなくなる。</p>

2022/04/01 不安が強く、救急搬送。入院。

日付不明 認知機能障害に関して、呼吸、循環不全、血糖異常はなかった。神経学的診察に局在所見なく脳 MRI でも中枢神経系病変がはっきりしなかった。電解質異常、肝腎障害なく、入院して薬剤を管理しても変わらなかった。梅毒定性 RPR 陽性で神経梅毒を疑ったが、定量 RPR、髄液トレポネーマ抗体も陰性。CMV IgM 抗体上昇から腎障害も合わせてサイトメガロウイルス脳炎も疑ったが、CMV 抗原検出から血中に感染細胞なく、髄液 CMV も検出できず診断できなかった。精神症状、尿蛋白、抗核抗体、抗 ds-DNA 抗体、抗リン脂質抗体、低補体など臨床、免疫項目を有し、全身性エリテマトーデスと診断。脳脊髄液や脳画像で他疾患を示唆する所見なく、全身性エリテマトーデスに伴う神経精神症状と判断。蛋白尿に関して、ループス腎炎を想定。ネフローゼ症候群に至っていた。サイトメガロウイルス感染症もないと判断して、メチルプレドニゾロン大量静注療法とプレドニゾロン 50 mg/日を継続。

2022/05/02 シクロホスファミド大量静注療法施行。プレドニゾロン併用し 6 か月継続予定とした。

2022/05/12 尿蛋白 0.22 g/gCr、C3 97mg/dL、C4 17 mg/dL、赤沈 50 mm/時など改善傾向を得た。後遺症として失禁、観念運動失行が残る。数年かけて改善することを期待して治療を継続。

認知機能障害、全身性エリテマトーデス、脳炎・脳症、ネフローゼ症候群の転帰は、後遺症あり。転倒、自動車自損事故の転帰は、不明。

追跡調査予定あり。

【検査結果】

CLcr 75.6 mL/分、尿蛋白 4.66 g/gCr、尿 2-MG 24,600 mcg/L、赤沈 85 mm/時。

血液:Hb 10.2 g/dL、白血球 4,400/mcL、血小板 22.4 万/mcL、PT-INR 0.87、APTT 34.8 秒(対照 27.9 秒)、FDP 8.8 mcg/mL。

		<p>生化学:TP 6.7 g/dL(Alb 49.8、 1 4.4、 2 11.9、 10.6、 23.3%、 M(-))、 BUN 13.4 mg/dL、 Cr 0.53 mg/dL、 ALP 45 U/L、 AST 53 IU/L、 ALT 25 IU/L、 LDH 250 IU/L、 UA 6.0 mg/dL、 CK 97 IU/L、 Na 132 mEq/L、 K 3.5 mEq/L、 Cl 98 mEq/L、 Ca 7.8 mg/dL、 LDL 86 mg/dL、 HDL 39 mg/dL、 TG 128 mg/dL、 Glu 94 mg/dL(食前)、 HbA1c 6.8%、 Fe 30 mcg/dL、 Fertin 525 ng/mL、 VitB1 44.3 ng/mL、 VitB12 1,500 pg/mL、 葉酸 20.2 ng/mL。</p> <p>免疫学:CRP 1.24 mg/dL、 CryoII(-)、 抗甲状腺 POD(-)、 抗甲状腺 TG(-)、 ACE 9.0 U/L、 sIL-2R 901 U/mL、 CH50 38.4/mL、 C3 73 mg/dL、 C4 16 mg/dL、 ANA 640(homogeneous/speckled)、 GAD(-)、 LAC 1.3、 CL IgG(-)、 CL 2(-)、 ACA(-)、 MMP-3 143.8 ng/mL、 CCP(-)、 ds-DNA 159 IU/mL、 MPO-ANCA(-)、 PR3-ANCA(-)、 IgG 1,427 mg/dL、 IgA 420 mg/dL、 IgM 130 mg/dL、 IgE 95 IU/mL、 IgG4 6.0 mg/dL、 RNP(-)、 Sm(-)、 SS-A(-)、 SS-B(-)、 Scl-70(-)、 RF(-)、 GQ1b-IgG(-)。</p> <p>感染症:RPR(-)、 TPHA(-)、 HBs ag(-)、 HBs ab(+)、 HBc ab(+)、 HBV DNA pending、 HCV ab(-)、 HIV 1/2 ab(-)、 D グルカン(-)、 結核菌特異的 IFN (-)、 CMV IgM 1.48、 CMV C10.C11(-)、 EB 抗 VCA IgM(-)。</p> <p>髄液:細胞数 12/3/mcL(単核球 50%)、 蛋白 41 mg/dL、 糖 50 mg/dL、 CK 7 IU/L、 RPR(-)、 FTA-ABS IgG(-)、 CMV(PCR)(-)、 OCB(-)。</p> <p>心電図:洞調律、 QTc 0.483。</p> <p>脳 MRI:2022/01 と著変なし。テント上脳室脳溝拡大。両頭頂葉、 大脳半球白質・基底核、 右視床・中脳に flair 高/低信号多数、 血管周囲腔の拡大や慢性虚血性変化、 一部は梗塞。異常増強効果なし。</p>
22770	間質性肺疾患	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001188）である。</p> <p>2年前の健診では NSIP 様の肺病変の指摘ない被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/03/16 本剤 3 回目接種。発熱、 食不振、 倦怠感を認めた。</p>

		<p>2022/03/18 間質性肺炎が発現。</p> <p>2022/04 咳嗽、労作時の呼吸困難を認めた。</p> <p>2022/05 近医でXP検査実施したところ、広範囲の両側間質影を認め 当院紹介。</p> <p>2022/05 CT実施し、NSIP様の肺病変を認めた。精査にて、IgG4高値 でありIgG4関連疾患の背景が疑われるが、本剤接種前は症状や画像所 見を認めていなかった。</p> <p>2022/05/13 症状は未回復。</p> <p>間質性肺炎の転帰は、未回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
22783	感音性難聴	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者家族からの報告である。</p> <p>感音性難聴は企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>2021/06 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/02/02 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03 上旬、耳の調子が悪く、音楽を聴いたときに半音下がって聞 こえるようになった。</p> <p>2022/03/24 補聴器の交換時に検査した際、聞こえのバランスが悪い と言われた。</p> <p>2022/04 耳鼻咽喉科を受診。</p>

		<p>2022/05/09 他院受診。低音性の感音性難聴と診断。医師より、薬品によってこういうこともあると言われる。</p> <p>2022/05/17 感音性難聴の後遺症が残る。3種類の薬を服用中。</p> <p>感音性難聴の転帰は、未回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22785	アナフィラキシー反応	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000912）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>日付不明 接種前の体温：36.5。</p> <p>2022/04/30 14:25 本剤3回目接種。15分間、特変なく帰宅。</p> <p>14:45 アナフィラキシーが発現。ドライな咳が出始め、咽頭のかゆみも出現。会場の救護部へ戻る。診察時、ドライな咳持続するも、聴診にて喉頭、主気管支部に閉塞、狭窄音なし。RAでSpO2 99%、HR 86、血圧149/88 mmHg、前胸部に少し発赤を認めた。アナフィラキシーと判断。ハイドロコートン 100 mgを点滴静脈内注射して補液を行い、医療機関へ救急搬送。入院。</p> <p>2022/05/01 症状の回復を認め、退院。</p> <p>アナフィラキシーの転帰は、回復。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>

22794	呼吸不全； 多臓器機能不全症候群； 細菌感染； 肺炎； 肺胞出血； 血管炎	背部痛； 認知症； 高血圧	本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000952）である。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。 日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。 2022/02/27 本剤3回目接種。 日付不明 重度の血管炎が発現。 2022/03/01 びまん性肺胞出血、呼吸不全が発現。38.3 の発熱を認めた。 2022/03/02 重症肺炎の診断で近医より紹介入院となる。入院時のCTで両肺上肺野を中心にびまん性に浸潤影を認めた。 2022/03/03 急激に呼吸状態が悪化。酸素15 L/分でもSpO ₂ 70-80%となったため、挿管し、人工呼吸開始。挿管チューブより泡沫状血性痰が多量に吸引。びまん性肺胞出血と診断。ステロイドパルス療法を開始。 2022/03/15 人工呼吸より離脱。 2022/03/22 再度呼吸状態悪化し、再挿管。画像上、両下葉の肺炎を認めた。培養でMRSA検出。細菌感染を認めた。抗生剤治療を実施。 日付不明 多臓器不全となる。 2022/04/11 死亡。 重症肺炎、血管炎の転帰は、不明。びまん性肺胞出血、呼吸不全、多臓器不全、細菌感染の転帰は、死亡。 追跡調査予定あり。
-------	--	---------------------	--

22798	呼吸不全; 肺胞出血; 血管炎	肺線維症; 間質性肺疾患	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000953）である。</p> <p>間質性肺炎、肺線維症のため呼吸器科に通院中であり、在宅酸素投与中、抗凝固剤内服中の被接種者。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/24 本剤3回目接種。</p> <p>2022/03/29 06:00頃、急に呼吸困難が出現し、医療機関に救急搬送。</p> <p>13:00 高度の呼吸不全状態のため、当院にNIPPV装着状態で救急転院。入院時、SpO₂ 25.4であったため挿管。挿管時、チューブより血性泡沫状の痰が排出された。人工呼吸開始したが酸素100%でもSpO₂ 44 torr。</p> <p>18:00 び慢性肺胞出血を認めた。本剤の副反応により、肺毛細管レベルの血管炎を発症、抗凝固剤の内服中であったため、び慢性肺胞出血を発症と想定された。</p> <p>2022/03/30 16:15 死亡。</p> <p>呼吸不全、び慢性肺胞出血の転帰は、死亡。血管炎の転帰は、不明。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	-----------------------	-----------------	---

22809	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した薬剤師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210000959）である。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/20 13:00 本剤3回目接種。</p> <p>2022/04/20頃 接種後1か月後頃、手の力が入らなくなることを自覚。</p> <p>2022/04 慢性炎症性脱髄性多発神経炎が再燃。</p> <p>日付不明 神経伝達検査（NCS）では2019年に見られていたF波が消失。神経伝達速度検査（NCV）も低下していた。個々の筋線維の活動電位の合計（CMPA）や神経線維の活動電位の合計（SNAP）共に低下していたため、慢性炎症性脱髄性多発神経炎の再燃と診断。</p> <p>2022/05/17 入院。IVIg投与開始。</p> <p>2022/05/18 握力15 kg。</p> <p>2022/05/19 握力25 kgとなり改善傾向を示した。</p> <p>2022/05/20 症状の軽快を認めた。</p> <p>2022/05/21 IVIg投与終了。</p> <p>2022/05/22 退院。</p> <p>慢性炎症性脱髄性多発神経炎の再燃の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
-------	--------------------	--------------------	--

<p>22854</p>	<p>呼吸不全； 急性好酸球性肺炎</p>	<p>本例は、当社 MR を介して入手した医師による報告であり、武田薬品工業株式会社がモデルナ副反応報告サイトを通じて入手した医師による副反応報告症例（TASK0022650）であり、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001107）である。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1 回目接種。</p> <p>2021/日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2 回目接種。</p> <p>2022/05/10 本剤 3 回目接種。発熱は認めなかった。</p> <p>2022/05/15 咳嗽、発熱が発現。</p> <p>2022/05/16 近医を受診し、感冒として処方を受け経過観察となる。</p> <p>2022/05/18 症状改善せず、呼吸困難のため他院を受診。両側の肺炎と呼吸不全を指摘され入院。肺炎として抗菌薬投与を受ける。</p> <p>2022/05/20 症状改善せず、当院へ転院。転院時、NIPPV では呼吸状態が保てず人工呼吸管理を開始し、抗菌薬に加えてステロイドパルス療法を開始した。入院時、呼吸状態及び循環動態が不安定であり気管支鏡検査は施行できなかったが、血液検査で血中好酸球数の上昇を認めしており、ステロイドに速やかに反応した経過から、急性好酸球性肺炎と判断。</p> <p>2022/05/26 状態が改善し、人工呼吸管理を離脱。</p> <p>2022/06/01 症状の軽快を認めた。現在はステロイドによる治療を継続中。</p> <p>呼吸不全、急性好酸球性肺炎の転帰は、軽快。</p> <p>追跡調査予定あり。</p>
--------------	---------------------------	---

22857	呼吸停止； 呼吸障害； 四肢麻痺； 失神； 意識変容状態； 感覚障害； 眼運動障害； 脳幹出血； 顔面麻痺	高血圧	本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001108）である。 2021/08/22 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。 2021/09/12 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。 2022/04/17 本剤3回目接種。 2022/04/25 午後、呼吸障害、感覚障害が発現。卒倒し、呼吸停止。心肺蘇生術を受け、当院に搬送。搬送時にJCS 20を認めた。自発呼吸は回復。左顔面神経麻痺、右上下肢の高度麻痺、感覚の脱失、眼球運動制限（複視）の症状を認めた。頭部CTでは橋背側やや左寄りの脳出血を認めた。入院。脳幹出血であるため保存的に経過を見たが、呼吸状態が悪化。 2022/04/27 後頭下減圧開頭、可及的な脳幹血腫除去、両側脳室ドレナージ術を施行。 2022/04/28 気管切開術を施行。集中治療室にて治療継続。 日付不明 意識障害が徐々に改善。呼吸状態も改善。後遺症として眼球運動制限、左顔面神経麻痺、右上下肢高度麻痺、感覚障害は高度に残遺。リハビリを施行中である。 呼吸停止の転帰は、回復。卒倒、脳幹出血の転帰は、不明。呼吸障害、感覚障害、意識障害、左顔面神経麻痺、右上下肢高度麻痺、眼球運動制限の転帰は、後遺症あり。 追跡調査予定あり。
-------	---	-----	---

<p>22858</p>	<p>意識消失; COVID-19の 疑い</p>	<p>本例は、くすり相談窓口を通じた被接種者本人からの報告である。</p> <p>2022/05/30 くすり相談窓口を通じて被接種者本人から追加情報を入手した。</p> <p>2022/06/01 くすり相談窓口を通じて被接種者本人から追加情報を入手した。</p> <p>2022/06/03 くすり相談窓口を通じて被接種者本人から追加情報を入手した。</p> <p>2022/06/06 くすり相談窓口を通じて被接種者本人から追加情報を入手した。</p> <p>意識が飛んだ、コロナ感染疑いは企業により重篤と判断された。</p> <p>2021/09/02 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 1回目接種。</p> <p>2021/09/27 SARS-CoV-2 (コミナティ筋注) 2回目接種。</p> <p>2022/05/14 15:00 本剤3回目接種。道端で意識が飛んだ。その後、体調が悪い。倦怠感を自覚。</p> <p>2022/05 腕の軽い痛み、ひどい頭痛が発現。熱は平熱。</p> <p>2022/05 1日半睡眠し、腕の軽い痛み、ひどい頭痛は治まった。</p> <p>2022/05/30 2週間症状が継続。頭痛、倦怠感、胸が苦しくなる。歩くのもきつい。</p> <p>日付不明 病院への電話相談では、コロナ感染を疑われた。</p> <p>2022/06/01 症状が継続。体調が悪く、病院受診できないまま経過。</p> <p>2022/06/03 内科および脳神経外科を受診。CT、レントゲン検査を実施。医師より意識が飛んだ際は危なかったと言われた。副反応が長期化することもあるとのこと。休みながらゆっくりのペースでないと歩けない。</p>
--------------	-----------------------------------	---

			<p>2022/06/06 頭痛が治まらないため、鎮痛薬を服用し続けている。</p> <p>意識が飛んだ、腕の痛み、コロナ感染疑いの転帰は、不明。頭痛、倦怠感、胸が苦しい、歩行困難の転帰は、未回復。</p> <p>非医療従事者による報告のため、追跡調査不能。</p>
22870	<p>両眼球運動障害；</p> <p>急性散在性脳脊髄炎；</p> <p>抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患；</p> <p>状態悪化；</p> <p>複視</p>	<p>抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患</p>	<p>本例は、医薬品医療機器総合機構を通じて入手した医師による副反応報告症例（厚生労働省受付番号：v2210001505）である。</p> <p>併用薬剤：ステロイド 6 mg</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）1回目接種。</p> <p>日付不明 SARS-CoV-2（コミナティ筋注）2回目接種。</p> <p>2022/03/26 本剤 3回目接種。</p> <p>2022/03/29 急性散在性脳脊髄炎（ADEM）が発現。突然、眼球運動制限、複視が出現。</p> <p>2022/04/04 眼科を受診し、MRIにて脳内に多発のT2高信号な病変を認めた。本剤接種後のADEMもしくはMOG抗体関連疾患の増悪が考えられた。</p> <p>2022/04/05 加療目的に当院神経内科に入院。MRIでは大脳皮質、白質や視床、脳幹、右三叉神経などの多数の部位に病変を認めたが、自覚症状は複視のみであった。</p> <p>日付不明 入院中、ステロイドパルスを行い複視は改善傾向であったが、不十分であったため2回目のステロイドパルスを実施。その後、</p>

プレドニン 60 mg から内服開始し、漸減した。

2022/05/06 症状の増悪なく改善傾向であり、プレドニン 30 mg まで減量したところで退院。症状の軽快を認めた。外来フォローとした。

眼球運動制限、複視、急性散在性脳脊髄炎、MOG 抗体関連疾患の増悪の転帰は、軽快。

追跡調査予定あり。

【臨床症状】

- ・炎症性脱髄が原因と推定される。
- ・これまでに中枢神経系の脱髄疾患である視神経炎の既往がある。
- ・臨床的に多巣性の中枢神経系の障害（事象）である。
- ・中枢神経系に帰することのできる限局性または多発性所見として、2022/03/29 に脳神経の単一または複数の異常、深部腱反射の変化（反射減弱または亢進、反射の非対称性）、小脳の機能障害（運動失調症、測定障害、小脳性眼振など）のいずれかが発現。

【疾患の経過】

- ・発症から最終観察までの期間は 1 か月
- ・疾患の単相パターンを示すには観察期間が不十分であり、発症後の観察期間が 3 か月以内である。

【鑑別診断】

- ・病気を説明できる、他の明らかな急性感染症や他の疾患が存在する。

【自己抗体の検査】（検査日：2021/07/09）

			<ul style="list-style-type: none"> ・抗 AQP4 抗体陰性、抗 MOG 抗体陽性
22879	発熱； 頭痛		2021 年 2 月か 3 月 1 回目のワクチン（他社製）で髄膜炎を発症。 2021 年 9 月 30 日（発現日） 髄膜炎のため 1 回しか打てなかったため、2 回目は本剤を接種。 その後、のたれまわるほどの頭痛と発熱を起こし、入院。 2021 年 10 月 のたれまわる頭痛・発熱は回復し、退院。 血栓症の発現、および血小板数減少なし。

<p>22882</p>	<p>アナフィラキシー反応; 呼吸窮迫; 過換気</p>		<p>2021/09/18</p> <p>1 回目他社製コロナワクチン接種後、本人曰く全身性の痙攣と呼吸苦あり。アナフィラキシーと診断され、アドレナリン筋注し他院に搬送。アドレナリン、ポララミン、ソルコーテフを他院で投与された。数時間の経過観察で入院はしなかった。その後無処置で帰宅。アレルギーはなし。</p> <p>2021/10/20 (発現日)</p> <p>午後 2 時頃 集団接種会場にて、本剤 2 回目接種。</p> <p>午後 2 時 5 分頃 息苦しさ訴えあり。接種会場の医師が診察し経過観察していた。</p> <p>午後 2 時 30 分 ワクチン接種後、経過観察中に咽喉異和感、呼吸苦、動悸の訴えあり。喘鳴なく、アレルギーよりも過換気症候群を疑い経過観察していたが、本人の呼吸困難感は改善を認めず、過換気によると思われる両上肢のしびれを認めた。</p> <p>午後 2 時 55 分頃 気道狭窄音あり、呼吸が浅く、冷汗が著明であり、アナフィラキシーへの移行としても判断がつかないことから、ボスミン 0.3mg 筋注、ポララミン静注を投与して救急搬送とした。</p> <p>午後 3 時 1 分 救急要請。</p> <p>午後 3 時 29 分 搬送。</p> <p>午後 3 時 45 分 当院に転院搬送された。</p> <p>来院時意識清明、血圧 169/99、心拍数 90 回、SP02 97% (室内気)、体温 36.6 。呼吸苦なし、胸部圧迫感のみ軽度残存。皮疹なし、消化器症状なし。症状が遅れて出現する可能性もあるため入院となった。</p> <p>日時不明</p> <p>過換気症候群の転帰は不明。</p> <p>2021/10/21</p> <p>アナフィラキシー、呼吸苦症状軽快され退院。</p>
--------------	--------------------------------------	--	---

			<p><アナフィラキシー質問票></p> <ul style="list-style-type: none"> ・アナフィラキシーの症例定義：突然発症 ・Minor 基準：呼吸器系症状（喘鳴もしくは上気道性喘鳴を伴わない呼吸困難） ・治療：2021年10月20日（アドレナリン0.3mL、抗ヒスタミン薬5mg） ・その他の被疑薬：なし（薬剤中止後、当該事象は回復したか：該当なし） ・既往歴 / 合併症 <p>ワクチン、ワクチン成分に対するアレルギーの既往歴：ファイザーのワクチン（2021年9月18日発現）</p> <p>喘息、湿疹の既往、蕁麻疹の既往、低血圧：不明</p> <p>過敏症反応、急性アレルギー反応及びアナフィラキシー反応、ワクチンによる注射部位反応、添加剤、その他の薬剤による過敏症反応の発現：あり</p> <p>（2021年9月18日ファイザー製ワクチンでけいれん、アナフィラキシー反応あり、詳細不明）</p>
22884	アナフィラキシー反応	うつ病； 化学物質アレルギー； 脂質異常症； 薬物過敏症； 造影剤アレルギー； 食物アレルギー； 高血圧	日時不明 他社ワクチン1回目接種。 2021/11/08（発現日） 13：44 ワクチン2回目として本剤接種。 14：00 咳、喘鳴、顔面発赤を認め、アドレナリン0.3mgを右大腿に筋注。 搬送最終のバイタルは、Sat99%、BP130/90、HR110、RR16-20 15：08 遅発性のアナフィラキシーを生じる可能性もあり入院となっ

た。

ソルメドロール 125mg、ファモチジン注 20mg、ポララミン注 5mg 投与。

19 : 38 ソルメドロール 125mg2 回目投与。

2021/11/09

1 : 15 左顔面の違和感あり。

ポララミン 5mg、ファモチジン 20mg 点滴投与。

6 : 53 左顔面の違和感消失。

11 : 00 退院。

プレドニン 20mg/1×朝、ファモチジン 20mg/1×夕 3日分を処方。

アナフィラキシーは軽快。

アレルギー歴

化学物質過敏症：化粧品など

食物アレルギー：エビ、カニ、海藻類、りんご、さくらんぼ、メロン、キウイ、アボカド、パイン、トマト、大根、キュウリ

薬物アレルギー：ピリン系

22888	アナフィラキシー反応		<p>2021/09/19</p> <p>1 回目モデルナ（新型コロナワクチン）（mRNA ワクチン）で接種 20 分後に動悸、SpO2 低下、末梢冷感がありアドレナリン、ステロイド投与後に入院で経過観察して退院した。</p> <p>2021/12/18（発現日）</p> <p>午前 10 時 00 分</p> <p>集団接種会場にて、新型コロナワクチンとして本剤投与（接種部位：左上腕）。</p> <p>午前 10 時 05 分</p> <p>SpO2 低下や血圧のバイタルは問題なかった。</p> <p>午前 10 時 19 分頃</p> <p>口腔内のしびれがあり、当院救急外来へ移動した。</p> <p>アナフィラキシー発現。</p> <p>日時不明</p> <p>生食 50mL で治療開始した。</p> <p>午前 10 時 30 分</p> <p>体動時に SpO2 低下もありアドレナリン筋注を行った。</p> <p>その後抗ヒスタミン剤を投与し、家族の希望もあり経過観察目的で入院した。</p> <p>入院したがアレルギー症状の増悪なし。</p> <p>2021/12/19</p> <p>1 日入院し、経過観察し、アナフィラキシーは回復。</p> <p>問題なく患者は退院した。</p>
-------	------------	--	--

< 予防接種後副反応調査票 >

合併症・既往歴：無

家族歴：不明

副反応の診断・評価に関連した検査結果：無

< バキサゼブリア筋注 アナフィラキシー 質問票 >

アナフィラキシーの症例定義：徴候及び症状の急速な進行

【Major 基準】

呼吸器系症状：上気道腫脹（唇、舌、喉、口蓋垂、喉頭）

【Minor 基準】

呼吸器系症状：咽喉閉塞感

【受けた治療の内容】

- ・輸液（生理食塩水）開始日：2021/12/18、終了日：2021/12/19
- ・アドレナリン（0.3mg）開始日：2021/12/18、終了日：2021/12/18
- ・抗ヒスタミン薬（ポララミン 5mg）開始日：2021/12/18、終了日：2021/12/18

【既往歴/合併症】

ワクチン、ワクチン成分に対するアレルギーの既往歴：有 詳細：モデルナ接種 2021/09/19（発現時期：2021/09/19、終了時期：2021/09/19）

過敏症反応、急性アレルギー反応及びアナフィラキシー反応、ワクチンによる注射部位反応、添加剤、その他の薬剤による過敏症反応の発現：有（モデルナ 2021/09/19、20 分後から動悸、SP02 低下、末梢冷

感)

過敏症/アナフィラキシー/アレルギー反応に対する抗ヒスタミン薬、ステロイド、又はその他の薬剤による治療歴：有(02投与、ステロイド、アドレナリン投与)