

スパイクバックス筋注3回目接種後 抗スパイクタンパク質抗体価の推移

新型コロナウイルス追加接種（3回目接種）にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）



	接種前幾何平均抗体価 (U/mL)	接種後幾何平均抗体価 (U/mL)	幾何平均抗体価倍率 (倍)
スパイクバックス筋注 (95%信頼区間)	454 (417 - 494)	29,422 (27,495 - 31,483)	64.8 (60.3 - 69.7)


スパイクバックス筋注追加接種

年齢階級	男	女
20	40	83
30	46	74
40	48	79
50	41	50
60以上	13	11
小計	188	297
合計	485	


抗N抗体が陰性の者482人を集計 (SPSS Ver.28)

	接種前幾何平均抗体価 (U/mL)	接種後幾何平均抗体価 (U/mL)	幾何平均抗体価倍率 (倍)
男	377 (329 - 431)	30,855 (27,601 - 34,493)	81.9 (73.9 - 90.8)
女	511 (459 - 568)	28,549 (26,209 - 31,098)	55.9 (50.8 - 61.5)


接種前抗S抗体価



接種28日後抗S抗体価



28日後幾何平均抗体価倍率



エラーバーは母平均の95%信頼区間を示す
各年齢階級の左は男性、右は女性

