


コミナティ筋注3回目接種後（スパイクバックス筋注初回接種シリーズ） 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



3回目接種前、接種1か月後、接種3か月後の抗スパイクタンパク質抗体価を測定した193人の集計。抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体の値にかかわらず集計しています。

	人数	接種前	N抗体	1か月後	N抗体	3か月後	N抗体	6か月後	N抗体
全体	193	1,180 (1,012 - 1,376)	9	18,331 (16,625 - 20,213)	12	9,281 (8,257 - 10,432)	20	8,532 (7,179 - 10,139)	64
20歳代	9	1,202 (878 - 1,646)	0	14,967 (11,014 - 20,339)	0	7,396 (4,675 - 11,702)	0	8,203 (2,979 - 22,586)	3
30歳代	53	1,538 (1,170 - 2,024)	4	18,729 (15,929 - 22,021)	4	9,329 (7,618 - 11,425)	8	8,198 (6,123 - 10,976)	20
40歳代	81	1,241 (999 - 1,543)	3	19,479 (17,004 - 22,316)	6	9,663 (8,178 - 11,419)	9	9,027 (6,912 - 11,789)	28
50歳以上	50	818 (563 - 1,188)	2	16,842 (13,010 - 21,804)	2	9,007 (6,701 - 12,106)	3	5,511 (12,142 - 8,444)	13
抗N抗体陽性者割合			4.7%		6.2%		10.4%		33.2%

N抗体：抗N抗体陽性者数(人)
抗S抗体価(U/mL)

