

2023(令和5)年1月20日

令和4年度 厚生労働省委託事業 新型コロナワクチン接種後健康状況調査

中間報告 (2021/11/2～2022/12/25)

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

ワクチン接種会場にてリーフレット配布しアプリより回答



令和4年度 厚生労働省委託事業

新型コロナウイルスワクチン
接種後の健康状況調査に
ご協力をお願いします

追加接種対応

この調査では、調査期間中に新型コロナウイルスワクチン接種（初回接種又は追加接種）をされた方に接種後一定期間の症状・疾病等健康状況をお聞きします。この結果を集計・分析し、ワクチン接種後の健康状況に関する情報を公表してまいります
アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはありません

待機時間内にかんたんエントリー！

1 ダウンロード・登録

アンケート回答には
アプリ「Door.」が必要です
※会員登録は無し、本人確認書類は不要です

Door.



2 回答フォーム取得

【一般の方】 【医師の方】



下記の英数字または QR コード
でアンケート用回答キーを登録




3 アンケート



【ご家族などの複数の回答をご希望の方】 <https://mhlw.key.medoor.com> 【一般の方】のみ左記のサイトより別途回答キーを発行することができます
※上記を除き、同一の方から複数の回答がなされた場合には、すべての回答が無効になる場合があります
【一般の方】については、ワクチン接種当日中のエントリーおよびアンケート回答で接種後の体調不安など医師にチャットで健康相談ができます



アンケート回答 & 医師相談について



アンケート回答手順



医師相談手順

【一般の方】については当日エントリーおよび回答後に医師への相談キーをお取りします
相談への回答は、MRT株式会社が提供するサービス「Door.」に登録する医師によるものであり、厚生労働省が委託するものではありません

- 1 「相談・回答」を選択 当日アンケート回答後にホーム画面より選択
- 2 「健康相談キー」を選択 「Door.」のロゴが入ったキーを選択
- 3 「相談内容」の入力 事前に医師に相談したい内容を入力
- 4 「相談」開始 相談内容に合わせて医師が回答

《本調査における Door. の使い方・登録方法等について》


Door. 事務局 (MRT株式会社 | 東証マザーズ 証券コード: 6034) |
URL: <https://medoor.com/webmed/survey/mhlw>

メール: mhlw@medoor.com


Door. の使い方




接種日アンケート有効（回答日＝接種日）を母数とする



接種日アンケート有効（回答日＝接種日）を母数とする



回答フェーズで全体、メーカー別、性別、世代別に分析



本調査の特性及び本資料掲載データの閲覧にあたっての留意点

■調査の特性

本調査は被接種者のうち、参加に同意いただいた者が任意で回答したものについて集計し、公表している。

■留意点

- 本調査の開始時期や、本調査の実施形態（スマートフォン上で動作するオンラインツールを活用した調査）に鑑み、参加者の年齢や属性等に偏りが生じる可能性があることに留意する必要がある。
- 本調査においては、症状が出なかった場合にも、「症状が出なかった」ことについて回答を求めているが、症状が出た方が回答しやすい（症状が出なかった方は回答を棄権しやすい）可能性が考えられる。
- 症状の発現頻度の算出にあたっては、回答が得られた者のうち、症状が出た者を症状の発現頻度としていることから、結果として、発現頻度が高く算出される傾向が想定されることについて留意が必要である。
- 本調査においては、接種当日中のエントリー及びアンケート回答を有効回答として取り扱っているが、2022年3月27日データロックの中間報告分より、算定の基準としていた時刻が協定世界時（UTC）から日本標準時（JST）に変更された。このため、それ以前の中間報告において有効回答とされていた一部のデータが無効回答に、あるいは逆に無効回答とされていた一部のデータが有効回答に変更されていることに留意が必要である。

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目


II. 症状別

1-2.分析の対象（接種1回目当日）

接種1回目接種日アンケート

凡例：
自分...本人が回答
自分以外...家族が代理で回答
有効...回答日=接種日
無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 4334人（内 有効回答者数:3607人 無効回答者数:727人）

1-3.特性_全体（接種1回目当日）

年代別-接種1回目当日




性別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者:N=3607

1-4.特性_全体（接種1回目当日）

ワクチンメーカー別-接種1回目当日




都道府県別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者:N=3607

1-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種1回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=3163

1-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=346

1-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=5

1-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



接種1回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=91

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

2-2.分析の対象（接種1回目1週間後）


接種1回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 3607人 内 回答有:1493人 回答無:2114人(回答率41.4%)

2-3.特性_全体（接種1回目1週間後）

年代別-接種1回目1週間後




性別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

2-4.特性_全体（接種1回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目1週間後




都道府県別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者:N=1493

2-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種1回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=1298

2-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=136

2-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

2-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=56

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

3-2.分析の対象（接種1回目2週間後）


接種1回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 3607人 内 回答有:1394人 回答無:2213人(回答率38.6%)

3-3.特性_全体（接種1回目2週間後）

年代別-接種1回目2週間後




性別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394

3-4.特性_全体（接種1回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目2週間後




都道府県別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者: N=1394

3-5.特性_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種1回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=1218

3-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=119

3-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

3-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス）)-接種1回目2週間後



性別（武田（ノババックス）)-接種1回目2週間後



接種1回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））:N=55

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者


1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

4-2.分析の対象（接種2回目当日）

接種2回目接種日アンケート


凡例：
自分...本人が回答
自分以外...家族が代理で回答
有効...回答日=接種日
無効...回答日≠接種日




接種日当日中エントリー・回答: 1076人（内 有効回答者数:737人 無効回答者数:339人）

4-3.特性_全体（接種2回目当日）

年代別-接種2回目当日




性別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者:N=737

4-4.特性_全体（接種2回目当日）

ワクチンメーカー別-接種2回目当日




都道府県別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者:N=737

4-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種2回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=651

4-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=57

4-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

4-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



接種2回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=27

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
- 5. 接種2回目1週目**
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

5-2.分析の対象（接種2回目1週間後）


接種2回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 737人 内 回答有:550人 回答無:187人(回答率74.6%)

5-3.特性_全体（接種2回目1週間後）

年代別-接種2回目1週間後




性別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者:N=550

5-4.特性_全体（接種2回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目1週間後




都道府県別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者: N=550

5-5.特性_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種2回目1週間後）

年代別(ファイザー社1価ワクチン(起源株))-接種2回目1週間後




性別(ファイザー社1価ワクチン(起源株))-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者(ファイザー社1価ワクチン(起源株)):N=486

5-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目1週間後）

年代別(モデルナ社1価ワクチン(起源株))-接種2回目1週間後




性別(モデルナ社1価ワクチン(起源株))-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者(モデルナ社1価ワクチン(起源株)):N=40

5-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

5-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種2回目1週間後



接種2回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=23

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
- 6. 接種2回目2週目**
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

6-2.分析の対象（接種2回目2週間後）

接種2回目2週目アンケート




接種2週間後アンケート回答日


接種より2週間経過回答対象者: 737人 内 回答有:513人 回答無:224人(回答率69.6%)

6-3.特性_全体（接種2回目2週間後）

年代別-接種2回目2週間後




性別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者:N=513

6-4.特性_全体（接種2回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目2週間後




都道府県別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者:N=513

6-5.特性_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種2回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=452

6-6.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=39

6-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

6-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



接種2回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=21

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者


1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
- 7. 接種3回目当日**
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

7-2.分析の対象（接種3回目当日）

接種3回目接種日アンケート


凡例：
自分...本人が回答
自分以外...家族が代理で回答
有効...回答日=接種日
無効...回答日≠接種日




接種日当日中エントリー・回答: 2389人 (内 有効回答者数:2010人 無効回答者数:379人)

7-3.特性_全体（接種3回目当日）

年代別-接種3回目当日




性別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者：N=2010

7-4.特性_全体（接種3回目当日）

ワクチンメーカー別-接種3回目当日




都道府県別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者:N=2010

7-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=338

7-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=4

7-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=3

7-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=1436

7-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=5

7-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=0

7-11.特性_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種3回目当日）

年代別（武田（ノバボックス））-接種3回目当日



性別（武田（ノバボックス））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（武田（ノバボックス））：N=222

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
- 8. 接種3回目1週目**
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

8-2.分析の対象（接種3回目1週間後）


接種3回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 2010人 内 回答有:853人 回答無:1157人(回答率42.4%)

8-3.特性_全体（接種3回目1週間後）

年代別-接種3回目1週間後




性別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者: N=853

8-4.特性_全体（接種3回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目1週間後




都道府県別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者: N=853

8-5.特性_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=142

8-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=1

8-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=1

8-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=581

8-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=2

8-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=0

8-11.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=126

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

9-2.分析の対象（接種3回目2週間後）


接種3回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 2010人 内 回答有:831人 回答無:1179人(回答率41.3%)

9-3.特性_全体（接種3回目2週間後）

年代別-接種3回目2週間後




性別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=831

9-4.特性_全体（接種3回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目2週間後




都道府県別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=831

9-5.特性_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=142

9-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=1

9-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=1

9-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=568

9-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=2

9-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=0

9-11.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=117

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
- 10. 接種4回目当日**
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目


II. 症状別

10-2.分析の対象（接種4回目当日）

接種4回目接種日アンケート

凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日=接種日
 無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 845人（内 有効回答者数:698人 無効回答者数:147人）

10-3.特性_全体（接種4回目当日）

年代別-接種4回目当日




性別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=698

10-4.特性_全体（接種4回目当日）

ワクチンメーカー別-接種4回目当日




都道府県別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=698

10-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=52

10-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=49

10-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種4回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=65

10-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=425

10-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=88

10-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=15

10-11.特性_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種4回目当日）

年代別(武田(ノバボックス))-接種4回目当日



性別(武田(ノバボックス))-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者(武田(ノバボックス)): N=3

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

11-2.分析の対象（接種4回目1週間後）


接種4回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 689人 内 回答有:285人 回答無:404人(回答率41.4%)

11-3.特性_全体（接種4回目1週間後）

年代別-接種4回目1週間後




性別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者: N=285

11-4.特性_全体（接種4回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目1週間後




都道府県別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者: N=285

11-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=26

11-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=16

11-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=32

11-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=158

11-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=48

11-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=4

11-11.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種4回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス）)-接種4回目1週間後



性別（武田（ノババックス）)-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=1

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
- 12. 接種4回目2週目**
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

12-2.分析の対象（接種4回目2週間後）


接種4回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 679人 内 回答有:293人 回答無:386人(回答率43.2%)

12-3.特性_全体（接種4回目2週間後）

年代別-接種4回目2週間後




性別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者: N=293

12-4.特性_全体（接種4回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目2週間後




都道府県別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者: N=293

12-5.特性_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=26

12-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=20

12-7.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=30

12-8.特性_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=163

12-9.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=50

12-10.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=2

12-11.特性_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種4回目2週間後）

年代別（武田（ノバボックス）)-接種4回目2週間後



性別（武田（ノバボックス）)-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者（武田（ノバボックス））：N=2

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
- 13. 接種5回目当日**
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目


II. 症状別

13-2.分析の対象（接種5回目当日）

接種5回目接種日アンケート

凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日=接種日
 無効...回答日≠接種日

■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種当日アンケート回答日


接種日当日中エントリー・回答: 108人 (内 有効回答者数:92人 無効回答者数:16人)

13-3.特性_全体（接種5回目当日）

年代別-接種5回目当日




性別-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者:N=92

13-4.特性_全体（接種5回目当日）

ワクチンメーカー別-接種5回目当日




都道府県別-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者:N=92

13-5.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））:N=5

13-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種5回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））:N=60

13-7.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=15

13-8.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））:N=12

13-9.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））:N=0

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
- 14. 接種5回目1週目**
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

14-2.分析の対象（接種5回目1週間後）

接種5回目1週目アンケート




接種1週間後アンケート回答日


接種より1週間経過回答対象者: 77人 内 回答有: 46人 回答無: 31人(回答率59.7%)

14-3.特性_全体（接種5回目1週間後）

年代別-接種5回目1週間後



性別-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者:N=46

14-4.特性_全体（接種5回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種5回目1週間後




都道府県別-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者:N=46

14-5.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目1週間後）

性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=3

14-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=26

14-7.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=11

14-8.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=6

14-9.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））:N=0

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別

15-2.分析の対象（接種5回目2週間後）

接種5回目2週目アンケート




接種2週間後アンケート回答日


接種より2週間経過回答対象者: 66人 内 回答有:38人 回答無:28人(回答率57.6%)

15-3.特性_全体（接種5回目2週間後）

年代別-接種5回目2週間後




性別-接種5回目2週間後




接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38

15-4.特性_全体（接種5回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種5回目2週間後




都道府県別-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者: N=38

15-5.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））:N=3

15-6.特性_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種5回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）)-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））:N=21

15-7.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=10

15-8.特性_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））:N=4

15-9.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=0

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目

II. 症状別


16-2.症状_性別（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1493 男性:820 女性:670 その他:3

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=550 男性:291 女性:259 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1394 男性:767 女性:624 その他:3


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=513 男性:281 女性:232 その他:0


16-3.症状_性別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=853 男性:458 女性:394 その他:1


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=831 男性:431 女性:400 その他:0


16-4.症状_性別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=285 男性:152 女性:133 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=293 男性:158 女性:134 その他:1


16-5.症状_性別（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=46 男性:31 女性:15 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=38 男性:27 女性:11 その他:0


16-6.症状_性別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 男性:23 女性:26 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 男性:4 女性:4 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 男性:22 女性:28 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 男性:3 女性:4 その他:0

16-7.症状_性別：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-8.症状_性別：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 男性:111 女性:109 その他:2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 男性:27 女性:35 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 男性:93 女性:95 その他:2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=63 男性:29 女性:34 その他:0


16-9.症状_性別：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=34 男性:22 女性:11 その他:1


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=24 男性:16 女性:8 その他:0

16-10.症状_性別：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-11.症状_性別：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-12.症状_性別：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=268 男性:155 女性:112 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=105 男性:62 女性:43 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=237 男性:143 女性:93 その他:1


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=91 男性:56 女性:35 その他:0


16-13.症状_性別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=119 男性:63 女性:56 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=105 男性:48 女性:57 その他:0


16-14.症状_性別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=14 男性:7 女性:7 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=12 男性:5 女性:7 その他:0


16-15.症状_性別：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


16-16.症状_性別：30代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=353 男性:180 女性:173 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=150 男性:67 女性:83 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=333 男性:164 女性:169 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=133 男性:62 女性:71 その他:0


16-17.症状_性別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=197 男性:101 女性:96 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=187 男性:96 女性:91 その他:0


16-18.症状_性別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=34 男性:18 女性:16 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=32 男性:18 女性:14 その他:0


16-19.症状_性別：30代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:2 女性:3 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


16-20.症状_性別：40代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=322 男性:187 女性:135 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=119 男性:66 女性:53 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=308 男性:184 女性:124 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=111 男性:64 女性:47 その他:0


16-21.症状_性別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=267 男性:148 女性:119 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=267 男性:139 女性:128 その他:0


16-22.症状_性別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=52 男性:17 女性:35 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=57 男性:22 女性:35 その他:0


16-23.症状_性別：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=7 男性:4 女性:3 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 男性:3 女性:4 その他:0


16-24.症状_性別：50代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=210 男性:119 女性:91 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=78 男性:47 女性:31 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=207 男性:116 女性:91 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=81 男性:49 女性:32 その他:0


16-25.症状_性別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=202 男性:108 女性:94 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=218 男性:116 女性:102 その他:0


16-26.症状_性別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=66 男性:32 女性:34 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=72 男性:36 女性:35 その他:1


16-27.症状_性別：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=10 男性:8 女性:2 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 男性:5 女性:2 その他:0


16-28.症状_性別：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 男性:41 女性:21 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=28 男性:18 女性:10 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=64 男性:42 女性:22 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 男性:18 女性:9 その他:0


16-29.症状_性別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=32 男性:16 女性:16 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=28 男性:15 女性:13 その他:0


16-30.症状_性別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=104 男性:66 女性:38 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=106 男性:65 女性:41 その他:0


16-31.症状_性別：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=19 男性:14 女性:5 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=19 男性:15 女性:4 その他:0


16-32.症状_性別：70代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=3 男性:3 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

16-33.症状_性別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-34.症状_性別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=11 男性:9 女性:2 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=13 男性:11 女性:2 その他:0


16-35.症状_性別：70代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=3 男性:2 女性:1 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=3 男性:2 女性:1 その他:0

16-36.症状_性別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-37.症状_性別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-38.症状_性別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-39.症状_性別：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-40.症状_メーカー別①（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=1493 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1298 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 136 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 56 その他: 1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=550 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 486 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 40 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 23 その他: 0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=1394 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1218 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 119 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 55 その他: 0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=513 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 452 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 39 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 21 その他: 0


16-41.症状_メーカー別②（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=1493 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1298 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 136 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 56 その他: 1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=550 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 486 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 40 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 23 その他: 0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=1394 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 1218 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 119 アストラゼネカ: 2 武田(ノババックス): 55 その他: 0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体: N=513 ファイザー社1価ワクチン(起源株): 452 モデルナ社1価ワクチン(起源株): 39 アストラゼネカ: 1 武田(ノババックス): 21 その他: 0

16-42.症状_メーカー別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-43.症状_メーカー別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-44.症状_メーカー別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-45.症状_メーカー別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-46.症状_メーカー別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-47.症状_メーカー別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
 ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=46 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):26 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):6 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
 ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=38 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):21 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):10 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):4 武田(ノババックス):0

16-48.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

接種1・2回目	接種3回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	95	46.3%(44人)	42.1%(40人)	1.1%(1人)	8.4%(8人)	46.3%(44人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	20	35%(7人)	40%(8人)	0%(0人)	10%(2人)	55%(11人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	262	67.9%(178人)	42%(110人)	1.5%(4人)	9.5%(25人)	62.2%(163人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	178	59.6%(106人)	54.5%(97人)	2.2%(4人)	6.7%(12人)	57.9%(103人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	68	7.4%(5人)	32.4%(22人)	2.9%(2人)	10.3%(7人)	33.8%(23人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	30	20%(6人)	16.7%(5人)	0%(0人)	0%(0人)	20%(6人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(1人)	0%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(1人)	0%(0人)	0%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-49.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

接種1・2回目	接種3回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	95	18.9%(18人)	32.6%(31人)	2.1%(2人)	11.6%(11人)	12.6%(12人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	20	15%(3人)	30%(6人)	5%(1人)	15%(3人)	20%(4人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	262	19.5%(51人)	48.1%(126人)	2.7%(7人)	9.2%(24人)	10.7%(28人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	178	18%(32人)	47.2%(84人)	1.1%(2人)	6.2%(11人)	7.3%(13人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	68	13.2%(9人)	16.2%(11人)	1.5%(1人)	4.4%(3人)	10.3%(7人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	30	13.3%(4人)	10%(3人)	0%(0人)	3.3%(1人)	6.7%(2人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)	0%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-50.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

接種1・2回目	接種3回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	95	0%(0人)	1.1%(1人)	1.1%(1人)	8.4%(8人)	9.5%(9人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	20	5%(1人)	5%(1人)	5%(1人)	10%(2人)	10%(2人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	262	0.4%(1人)	0.8%(2人)	2.3%(6人)	9.5%(25人)	14.5%(38人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	178	1.1%(2人)	1.1%(2人)	1.1%(2人)	6.7%(12人)	10.1%(18人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	68	0%(0人)	0%(0人)	2.9%(2人)	10.3%(7人)	5.9%(4人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	30	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-51.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

接種1・2回目	接種3回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	95	3.2%(3人)	0%(0人)	0%(0人)	9.5%(9人)	4.2%(4人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	20	0%(0人)	5%(1人)	0%(0人)	10%(2人)	5%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	262	3.8%(10人)	3.1%(8人)	1.1%(3人)	8%(21人)	3.1%(8人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	178	1.7%(3人)	3.4%(6人)	0.6%(1人)	3.9%(7人)	6.2%(11人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	68	2.9%(2人)	2.9%(2人)	0%(0人)	14.7%(10人)	4.4%(3人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	30	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	6.7%(2人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-52.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

接種1-2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	8	37.5%	37.5%	0.0%	50.0%	50.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	9	55.6%	44.4%	0.0%	44.4%	33.3%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	4	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-53.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	8	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	9	0.0%	33.3%	0.0%	11.1%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	4	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-54.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目 ▲	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	15	60.0%	73.3%	0.0%	73.3%	46.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	60	36.7%	50.0%	5.0%	65.0%	41.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	43	46.5%	48.8%	0.0%	58.1%	32.6%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-55.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	15	26.7%	26.7%	0.0%	6.7%	6.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	60	6.7%	26.7%	0.0%	11.7%	1.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	43	4.7%	18.6%	0.0%	2.3%	4.7%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-56.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-57.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-58.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	6	83.3%	66.7%	0.0%	66.7%	66.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	8	62.5%	50.0%	12.5%	37.5%	50.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-59.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	6	33.3%	33.3%	0.0%	16.7%	16.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	8	0.0%	37.5%	0.0%	12.5%	12.5%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-60.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1-2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	5	20.0%	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	9	66.7%	44.4%	0.0%	88.9%	88.9%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	11	9.1%	27.3%	0.0%	63.6%	18.2%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-61.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	5	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	9	22.2%	55.6%	0.0%	22.2%	22.2%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	11	18.2%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-62.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	16	62.5%	81.3%	6.3%	81.3%	56.3%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	4	25.0%	25.0%	0.0%	75.0%	50.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	21	52.4%	38.1%	4.8%	81.0%	57.1%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-63.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	16	12.5%	43.8%	0.0%	6.3%	18.8%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	21	4.8%	42.9%	0.0%	4.8%	23.8%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-64.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1-2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-65.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-66.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

接種1-2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	9	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	22.2%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-67.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	8	12.5%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	9	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-68.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	15	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	60	1.7%	0.0%	1.7%	8.3%	8.3%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	43	2.3%	2.3%	0.0%	4.7%	2.3%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-69.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	15	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	60	1.7%	1.7%	0.0%	5.0%	1.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	43	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-70.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-71.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目武田（ノババックス）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-72.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	6	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-73.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	6	16.7%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	8	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-74.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1-2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	9	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	22.2%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	11	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-75.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	9	22.2%	11.1%	11.1%	11.1%	33.3%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	11	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-76.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	16	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	18.8%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	21	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%	14.3%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-77.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	4	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	21	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-78.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-79.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）

接種1・2回目	接種3回目	接種4回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-80.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

接種4回目	接種5回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	5	20.0%	60.0%	0.0%	40.0%	20.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	13	0.0%	30.8%	0.0%	38.5%	15.4%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	8	12.5%	62.5%	0.0%	50.0%	12.5%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-81.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

接種4回目	接種5回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	5	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	13	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	8	12.5%	25.0%	0.0%	12.5%	12.5%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

16-82.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

接種4回目	接種5回目	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	5	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%


16-83.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

接種4回目	接種5回目	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	武田(ノババックス)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA1)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	その他	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%


16-84.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(起源株):49

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 ファイザー社1価ワクチン(起源株):50


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(起源株):7


16-85.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(起源株):49

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=8 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=50 ファイザー社1価ワクチン(起源株):50


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(起源株):7

16-86.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-87.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-88.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 ファイザー社1価ワクチン(起源株):213 モデルナ社1価ワクチン(起源株):8 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 ファイザー社1価ワクチン(起源株):183 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


16-89.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=222 ファイザー社1価ワクチン(起源株):213 モデルナ社1価ワクチン(起源株):8 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:1

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=190 ファイザー社1価ワクチン(起源株):183 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=63 ファイザー社1価ワクチン(起源株):59 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

16-90.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-91.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=34 ファイザー社1価ワクチン(起源株):22 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):10 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):2

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=24 ファイザー社1価ワクチン(起源株):19 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):2

16-92.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-93.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=3 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-94.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-95.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


16-96.症状_メーカー別①：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=268 ファイザー社1価ワクチン(起源株):233 モデルナ社1価ワクチン(起源株):31 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):3 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=105 ファイザー社1価ワクチン(起源株):92 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=237 ファイザー社1価ワクチン(起源株):207 モデルナ社1価ワクチン(起源株):25 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):4 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=91 ファイザー社1価ワクチン(起源株):78 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0


16-97.症状_メーカー別②：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=268 ファイザー社1価ワクチン(起源株):233 モデルナ社1価ワクチン(起源株):31 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):3 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=105 ファイザー社1価ワクチン(起源株):92 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=237 ファイザー社1価ワクチン(起源株):207 モデルナ社1価ワクチン(起源株):25 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):4 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=91 ファイザー社1価ワクチン(起源株):78 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

16-98.症状_メーカー別①：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-99.症状_メーカー別②：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=119 ファイザー社1価ワクチン(起源株):15 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):99 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=105 ファイザー社1価ワクチン(起源株):12 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):88 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):5

16-100.症状_メーカー別①：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-101.症状_メーカー別②：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):6 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=12 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-102.症状_メーカー別① : 20代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)

■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

16-103.症状_メーカー別②：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


16-104.症状_メーカー別① : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=353 ファイザー社1価ワクチン(起源株):298 モデルナ社1価ワクチン(起源株):44 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=150 ファイザー社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=333 ファイザー社1価ワクチン(起源株):283 モデルナ社1価ワクチン(起源株):39 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=133 ファイザー社1価ワクチン(起源株):115 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

16-105.症状_メーカー別② : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=353 ファイザー社1価ワクチン(起源株):298 モデルナ社1価ワクチン(起源株):44 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=150 ファイザー社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=333 ファイザー社1価ワクチン(起源株):283 モデルナ社1価ワクチン(起源株):39 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):11 その他:0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)




全体:N=133 ファイザー社1価ワクチン(起源株):115 モデルナ社1価ワクチン(起源株):13 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):5 その他:0

16-106.症状_メーカー別① : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-107.症状_メーカー別②：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=197 ファイザー社1価ワクチン(起源株):39 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):133 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):25

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=187 ファイザー社1価ワクチン(起源株):37 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):126 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):24

16-108.症状_メーカー別① : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




16-109.症状_メーカー別② : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=34 ファイザー社1価ワクチン(起源株):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):9 モデルナ社1価ワクチン(起源株):7 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=32 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):8 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):11 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-110.症状_メーカー別① : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-111.症状_メーカー別② : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=5 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


16-112.症状_メーカー別① : 40代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=322 ファイザー社1価ワクチン(起源株):282 モデルナ社1価ワクチン(起源株):24 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=119 ファイザー社1価ワクチン(起源株):105 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):7 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=308 ファイザー社1価ワクチン(起源株):269 モデルナ社1価ワクチン(起源株):26 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):12 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=111 ファイザー社1価ワクチン(起源株):101 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):5 その他:0


16-113.症状_メーカー別② : 40代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=322 ファイザー社1価ワクチン(起源株):282 モデルナ社1価ワクチン(起源株):24 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=119 ファイザー社1価ワクチン(起源株):105 モデルナ社1価ワクチン(起源株):6 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):7 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=308 ファイザー社1価ワクチン(起源株):269 モデルナ社1価ワクチン(起源株):26 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):12 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=111 ファイザー社1価ワクチン(起源株):101 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:1 武田(ノババックス):5 その他:0

16-114.症状_メーカー別①：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-115.症状_メーカー別②：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=267 ファイザー社1価ワクチン(起源株):36 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):185 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):45

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=267 ファイザー社1価ワクチン(起源株):38 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):189 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):39

16-116.症状_メーカー別①：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-117.症状_メーカー別②：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=52 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):10 モデルナ社1価ワクチン(起源株):19 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=57 ファイザー社1価ワクチン(起源株):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):6 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):11 モデルナ社1価ワクチン(起源株):21 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


16-118.症状_メーカー別①：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0

16-119.症状_メーカー別② : 40代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):3 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0


16-120.症状_メーカー別① : 50代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=210 ファイザー社1価ワクチン(起源株):173 モデルナ社1価ワクチン(起源株):25 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):12 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=78 ファイザー社1価ワクチン(起源株):71 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):3 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=207 ファイザー社1価ワクチン(起源株):176 モデルナ社1価ワクチン(起源株):17 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):14 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=81 ファイザー社1価ワクチン(起源株):75 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):3 その他:0


16-121.症状_メーカー別② : 50代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=210 ファイザー社1価ワクチン(起源株):173 モデルナ社1価ワクチン(起源株):25 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):12 その他:0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=78 ファイザー社1価ワクチン(起源株):71 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):3 その他:0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=207 ファイザー社1価ワクチン(起源株):176 モデルナ社1価ワクチン(起源株):17 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):14 その他:0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=81 ファイザー社1価ワクチン(起源株):75 モデルナ社1価ワクチン(起源株):3 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):3 その他:0

16-122.症状_メーカー別① : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-123.症状_メーカー別② : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=202 ファイザー社1価ワクチン(起源株):26 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):138 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):36

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=218 ファイザー社1価ワクチン(起源株):31 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):149 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):36

16-124.症状_メーカー別① : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




16-125.症状_メーカー別② : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=66 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):4 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):8 モデルナ社1価ワクチン(起源株):30 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):15 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=72 ファイザー社1価ワクチン(起源株):8 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):8 モデルナ社1価ワクチン(起源株):32 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):18 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0

16-126.症状_メーカー別① : 50代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-127.症状_メーカー別② : 50代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=10 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):2 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=7 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):0


16-128.症状_メーカー別①：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=62 ファイザー社1価ワクチン(起源株):43 モデルナ社1価ワクチン(起源株):4 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):15 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=28 ファイザー社1価ワクチン(起源株):18 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=64 ファイザー社1価ワクチン(起源株):45 モデルナ社1価ワクチン(起源株):5 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):14 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(起源株):17 モデルナ社1価ワクチン(起源株):2 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):8 その他:0

16-129.症状_メーカー別②：60代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-130.症状_メーカー別①：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



16-131.症状_メーカー別②：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=32 ファイザー社1価ワクチン(起源株):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):16 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):12

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=28 ファイザー社1価ワクチン(起源株):5 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):10

16-132.症状_メーカー別①：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




16-133.症状_メーカー別② : 60代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=104 ファイザー社1価ワクチン(起源株):9 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):2 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):89 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=106 ファイザー社1価ワクチン(起源株):9 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):3 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社1価ワクチン(起源株):89 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):1 武田(ノババックス):2

16-134.症状_メーカー別① : 60代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-135.症状_メーカー別② : 60代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)



全体:N=19 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):15 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):3 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):0 武田 (ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン (BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5) ■ 武田 (ノババックス)




全体:N=19 ファイザー社2価ワクチン (BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン (BA.4-5):14 モデルナ社2価ワクチン (BA.1):4 モデルナ社2価ワクチン (BA.4-5):0 武田 (ノババックス):0

16-136.症状_メーカー別① : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




16-137.症状_メーカー別② : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




16-138.症状_メーカー別① : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-139.症状_メーカー別② : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):1

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):1

16-140.症状_メーカー別① : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-141.症状_メーカー別② : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=11 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):10 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):12 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-142.症状_メーカー別① : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-143.症状_メーカー別② : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):2 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=3 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):2 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-144.症状_メーカー別① : 80代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-145.症状_メーカー別②：80代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(起源株):2 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
■ アストラゼネカ ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 アストラゼネカ:0 武田(ノババックス):0 その他:0

16-146.症状_メーカー別① : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-147.症状_メーカー別② : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


- 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(起源株) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1)
- ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5) ■ モデルナ社1価ワクチン(起源株)
- モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-148.症状_メーカー別① : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




16-149.症状_メーカー別② : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(起源株):1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(起源株):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社1価ワクチン(起源株):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-150.症状_メーカー別① : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



16-151.症状_メーカー別② : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):1 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.1) ■ ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)
■ モデルナ社2価ワクチン(BA.1) ■ モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5) ■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社2価ワクチン(BA.1):0 ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.1):0 モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5):0 武田(ノババックス):0

16-152.症状別：発症日①（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

16-153.症状別：発症日①（接種3回目）

接種3回目




接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=677

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

16-154.症状別：発症日①（接種4回目）


接種4回目



接種4回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=228

16-155.症状別：発症日①（接種5回目）

接種5回目




接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=35


* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

16-156.症状別：発症日②（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

16-157.症状別：発症日②（接種3回目）


接種3回目



接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=677

16-158.症状別：発症日②（接種4回目）


接種4回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

16-159.症状別：発症日②（接種5回目）


接種5回目



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=35


16-160.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=550

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513


16-161.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=853


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831


16-162.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293


16-163.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38

16-164.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目



接種1回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=1156

接種2回目




接種2回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=477

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。


* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

16-165.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種3回目）




* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

16-166.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種4回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

16-167.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種5回目）




接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=35

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


16-168.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=550

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513

16-169.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=853


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831


16-170.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293


16-171.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38


16-172.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=550

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513


16-173.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=853


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831


16-174.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293

16-175.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38


16-176.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=550

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513


16-177.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=853


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831


16-178.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293


16-179.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38


16-180.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1493

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=550

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


16-181.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=853

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


16-182.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

16-183.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）


該当者なし

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

16-184.症状別：受診状況（接種1・2回目）


接種1回目



接種当日	2人	0.1%
接種翌日	2人	0.1%
3日目	1人	0.1%
4日目	4人	0.3%
5日目	0人	0.0%
6日目	3人	0.2%
7日目	3人	0.2%
8日目	3人	0.2%
9日目	7人	0.5%
10日目	4人	0.3%
11日目	1人	0.1%
12日目	3人	0.2%
13日目	9人	0.6%
14日目	4人	0.3%
未受診	1,348人	96.7%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394

接種2回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	1人	0.2%
4日目	0人	0.0%
5日目	2人	0.4%
6日目	1人	0.2%
7日目	1人	0.2%
8日目	1人	0.2%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	1人	0.2%
13日目	1人	0.2%
14日目	1人	0.2%
未受診	504人	98.2%

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513

16-185.症状別：受診状況（接種3回目）

接種3回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	1人	0.1%
3日目	2人	0.2%
4日目	0人	0.0%
5日目	2人	0.2%
6日目	1人	0.1%
7日目	1人	0.1%
8日目	2人	0.2%
9日目	1人	0.1%
10日目	2人	0.2%
11日目	2人	0.2%
12日目	2人	0.2%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	815人	98.1%

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=831

16-186.症状別：受診状況（接種4回目）

接種4回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	1人	0.3%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	1人	0.3%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	3人	1.0%
12日目	1人	0.3%
13日目	0人	0.0%
14日目	3人	1.0%
未受診	284人	96.9%

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293

16-187.症状別：受診状況（接種5回目）

接種5回目



接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	0人	0.0%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	38人	100.0%

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38

16-188.症状別：診断結果①（接種1回目）

診断結果

風邪	6人
うつ病	2人
膀胱炎	1人
喘息	1人
腕の筋肉痛	1人
腹痛で受診。腸の動きが悪くなってる。すぐ治る	1人
腹痛	1人
不正脈、頻脈、最低血圧105、最高血圧155	1人
病名なし、問題ないと診断	1人
鼻骨折	1人
半身痺れはワクチン後遺症	1人
特になし。ワクチンの刺激と考えられる。	1人
頭痛	1人
潰瘍性大腸炎の定期検診でした。	1人
椎間板ヘルニア	1人
虫歯	1人
体調変化	1人
足の痛みがあり、整形外科を受診。コロナールを処方され、様子を見るようにと。病名は告げられず。	1人
整形受診してください。	1人
睡眠不足や過度のストレスにより、腕の痛みや息苦しさの増加。	1人

16-189.症状別：診断結果②（接種1回目）

診断結果

腎結石の疑いだったが何もなかった	1人
診断名は分かりませんが、口の中全体に口内炎が出来ました。	1人
診断なし	1人
食道がん	1人
痔	1人
歯肉の炎症	1人
腰痛	1人
喉が少し赤い	1人
巻爪	1人
夏風邪	1人
咽頭炎	1人
胃腸炎	1人
異常なし 定期受診のため	1人
てんかんの定期検診	1人
ただの勘違い	1人
ストレス性の胃炎	1人
コロナ陽性でした	1人
アレルギー定期	1人
ありません	1人
b型肝炎の検査の為	1人
未受診	1,348人

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394

16-190.症状別：診断結果（接種2回目）

診断結果

風邪	3人
胃腸炎	2人
扁桃腺炎	1人
不明	1人
咳喘息	1人
咳風邪	1人
未受診	504人

16-191.症状別：診断結果（接種3回目）

診断結果

蕁麻疹	2人
副反応や寒暖差による体調不良	1人
副作用に因る偏頭痛	1人
循環器内科：胸の圧迫感により受診。異常なし。泌尿器科：排尿時の痛みと残尿感により受診。膀胱炎の診断。	1人
検査中のためまだわかりません	1人
健診が17日にあり、血液マーカー検査で炎症反応がでて、泌尿器科のかかりつけ医を予約受診待ち	1人
緊張型頭痛	1人
筋肉痛	1人
気管支炎	1人
顔のかぶれ 腫れ	1人
胃炎	1人
ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)	1人
なし	1人
コロナウイルス陽性	1人
コリン性蕁麻疹	1人
未受診	815人

16-192.症状別：診断結果（接種4回目）

診断結果

膀胱炎	2人
不明	1人
検査をしてもらいましたがわからない	1人
経過観察	1人
群発頭痛	1人
一過性全健忘症	1人
ストレス？ 聞くのを忘れた	1人
コロナ感染	1人
未受診	284人

16-193.症状別：診断結果（接種5回目）

診断結果

未受診	38人
-----	-----

16-194.症状別：入院日（接種1・2回目）

接種1回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1394

接種2回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=513

16-195.症状別：入院日（接種3回目）

接種3回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種3回目2週間後アンケート回答者:N=831

16-196.症状別：入院日（接種4回目）

接種4回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種4回目2週間後アンケート回答者:N=293

16-197.症状別：入院日（接種5回目）

接種5回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38

16-198.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）

	接種1・2回目	接種3回目	接種人数	楽だった	変わらない	つらかった
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	114人	28.1%(32人)	42.1%(48人)	29.8%(34人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	27人	66.7%(18人)	29.6%(8人)	3.7%(1人)
3	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	319人	13.5%(43人)	25.4%(81人)	61.1%(195人)
4	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	237人	40.9%(97人)	33.3%(79人)	25.7%(61人)
5	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	74人	85.1%(63人)	9.5%(7人)	5.4%(4人)
6	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	33人	87.9%(29人)	6.1%(2人)	6.1%(2人)
7	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.1)	1人	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
8	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
9	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.4-5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
10	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
11	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.1)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
12	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.1)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
13	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
14	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-199.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社1価ワクチン（起源株）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	9人	33.3%(3人)	11.1%(1人)	55.6%(5人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	17人	52.9%(9人)	5.9%(1人)	41.2%(7人)
3	武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-200.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社1価ワクチン（起源株）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	19人	15.8%(3人)	42.1%(8人)	42.1%(8人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	144人	31.3%(45人)	14.6%(21人)	54.2%(78人)
3	武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-201.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目武田（ノババックス）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	2人	0%(0人)	0%(0人)	100%(2人)
3	武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-202.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	7人	14.3%(1人)	42.9%(3人)	42.9%(3人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	13人	61.5%(8人)	15.4%(2人)	23.1%(3人)
3	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-203.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	9人	44.4%(4人)	11.1%(1人)	44.4%(4人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	21人	57.1%(12人)	4.8%(1人)	38.1%(8人)
3	武田(ノババックス)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-204.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	6人	33.3%(2人)	50%(3人)	16.7%(1人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	44人	38.6%(17人)	25%(11人)	36.4%(16人)
3	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-205.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）


	接種3回目	接種4回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
3	武田(ノババックス)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
4	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
5	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
6	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
7	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-206.症状別：5回目の体調（4回目に比べて）

	接種4回目	接種5回目	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
1	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
2	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	3人	66.7%(2人)	0%(0人)	33.3%(1人)
3	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	6人	50%(3人)	16.7%(1人)	33.3%(2人)
4	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	14人	64.3%(9人)	0%(0人)	35.7%(5人)
5	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
6	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	9人	44.4%(4人)	11.1%(1人)	44.4%(4人)
7	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	2人	100%(2人)	0%(0人)	0%(0人)
8	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	2人	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)
9	ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
10	モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

16-207.症状別：4回目のインフルエンザ同時接種状況


接種4回目



接種4回目当日アンケート回答者：N=698
接種4回目1週間後アンケート回答者：N=285
接種4回目2週間後アンケート回答者：N=293

16-208.症状別：5回目のインフルエンザ同時接種状況

接種5回目



接種5回目当日アンケート回答者：N=92

接種5回目1週間後アンケート回答者：N=46

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=38