



# 小児（5-11歳）3回目追加接種 抗スパイクタンパク質抗体価の推移

エラーバーは  
母平均の95%信頼区間



抗体価を測定した追加接種（3回目）者のうち、接種前（2回目接種から5か月以降）の抗体価測定結果のある30人の結果

接種前	例数	抗N抗体	抗S抗体価
5-8歳	男	10	7 4,100 (1,333 - 12,610)
	女	6	3 3,743 (679 - 20,645)
9-11歳	男	8	3 1,970 (983 - 3,947)
	女	6	3 2,007 (312 - 12,888)
合計	30	16	2,870 (1,681 - 4,902)

抗体価を測定した追加接種（3回目）者のうち、接種1ヶ月後の抗体価測定結果のある19人の結果

	例数	接種前	1か月後	*GMTR
抗N抗体陰性	11	1,037 (536 - 2,007)	17,900 (8,953 - 35,790)	17.3 (10.6 - 28.0)
抗N抗体陽性	8	9,664 (4,336 - 21,537)	23,443 (14,892 - 36,904)	2.4 (1.4 - 4.3)
合計	19	2,654 (1,303 - 5,404)	20,053 (13,306 - 30,222)	7.6 (4.2 - 13.5)

抗N抗体：追加接種前抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体陽性者数(人)  
カッコ内は幾何平均抗スパイクタンパク質抗体価の95%信頼区間(U/mL)  
\* GMTR 幾何平均抗体価倍率 Geometric mean titer ratio

