


ヌバキソビッド筋注追加接種（3回目接種および4、5回目接種）

抗N抗体別 中和抗体および抗スパイクタンパク質抗体価の推移

抗体価
中和抗体（倍）
抗S抗体（U/mL）



接種前、接種1か月後、
接種3ヶ月後のいずれかの
中和抗体を測定した75人の結果
（抗S抗体はデータがある場合に
集計）
抗N抗体陽性は接種前から
接種3ヶ月後までのいずれかに
抗N抗体が陽性であった者

エラーバーは
母平均の95%信頼区間

抗N抗体陰性

抗N抗体陽性
（接種前から3ヶ月後まで）

		接種前		接種1か月後		接種3か月後	
		例数	抗体価	例数	抗体価	例数	抗体価
抗N抗体陰性	起源株中和抗体価	25	5.7 (4.3 - 7.6)	25	105.6 (68.7 - 162.1)	24	75.5 (46.7 - 122.0)
	BA.5中和抗体価	41	2.8 (2.5 - 3.0)	40	26.9 (19.0 - 38.0)	39	19.0 (12.9 - 27.9)
	抗S抗体価	42	446 (344 - 577)	40	10,903 (8,105 - 14,667)	40	7,614 (5,503 - 10,535)
抗N抗体陽性	起源株中和抗体価	17	30.1 (14.1 - 64.1)	18	122.2 (82.4 - 181.3)	17	153.6 (95.1 - 248.1)
	BA.5中和抗体価	32	14.1 (7.8 - 25.6)	33	50.4 (33.1 - 76.7)	32	60.4 (36.8 - 99.1)
	抗S抗体価	33	1,807 (919 - 3,554)	33	12,410 (9,263 - 16,628)	33	11,979 (8,239 - 17,418)