

Gửi các bé từ 5 đến 11 tuổi



Thông báo về việc tiêm chủng vắc-xin ngừa covid-19



Tại sao lại tiêm vắc-xin ngừa covid-19?

Nếu virus covid-19 xâm nhập vào trong cơ thể người và đồng bạn của chúng tăng lên thì sẽ xảy ra sốt, uể oải, ho, khó thở, đau đầu, thay đổi vị giác, v.v. và sức khỏe cơ thể xấu đi. Nếu tiêm vắc-xin thì trong cơ thể sẽ có phản ứng chiến đấu với virus covid-19 nên dù virus có xâm nhập vào cơ thể đi nữa, sức khỏe cơ thể cũng khó xấu đi.



Khi tiêm vắc-xin ngừa covid-19, nên chú ý điều gì?

<p>Trước khi tiêm</p>	<p>Khi sốt từ 37,5°C trở lên, và khi sức khỏe cơ thể xấu, thì không thể tiêm vắc-xin nên hãy cho người trong nhà biết về chuyện đó.</p>	
<p>Khi tiêm</p>	<p>Vắc-xin sẽ được tiêm vào gần vai. Hãy mặc áo để để lộ vai để đi tiêm.</p>	
<p>Sau khi tiêm</p>	<p>◎ Sau khi tiêm vắc-xin, hãy ngồi từ 15 phút trở lên để xem tình trạng sức khỏe. (Cũng có trường hợp xem tình trạng sức khỏe 30 phút)</p> <p>◎ Sinh hoạt như bình thường như tắm bồn ofuro vào ngày hôm đó không có vấn đề gì, nhưng hãy tránh vận động mạnh.</p>	<p>◎ Khi tiêm vắc-xin thì có thể xuất hiện các triệu chứng sau đây, nhưng như đã biết rằng sau 2, 3 ngày thì sẽ tự nhiên khỏe lại.</p> <p><input type="radio"/> Sốt <input type="radio"/> Khó chịu <input type="radio"/> Uể oải <input type="radio"/> Đau bụng <input type="radio"/> Đau đầu <input type="radio"/> Ốn lạnh</p>

Nếu có các triệu chứng như thế này, hãy cho người trong nhà hoặc người lớn ở xung quanh biết.

● Ngay sau khi tiêm

- Ngứa người
- Ho



● Ngày tiêm và trong khoảng 4 ngày

- Sốt Đau đầu Đau ngực Khó thở
- Uể oải Ốn lạnh Cảm thấy ngực hồi hộp



Hãy tiêm vắc xin này 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 tuần.



Điều quan trọng cần tuân theo.

Có nhiều người khác nhau, người tiêm vắc-xin sớm và người có lý do không thể tiêm vắc-xin. Tuyệt đối không được kỳ thị người xung quanh vì lý do họ tiêm hay chưa tiêm vắc-xin.

