

致60岁及以上人群、患有基础疾病的人群

4



新冠疫苗接种
第四剂接种通知

免费接种

全额公费

可以接种第四剂疫苗了。

接种第四剂可获得较高的重症化预防效果。



接种目标群体

基于目前已掌握的科学见解等，将在5月下旬后面向以下人群开始接种第四剂疫苗。

接种第三剂疫苗后已经过5个月

①60岁及以上人群 ②18岁及以上患有基础疾病的人群

其他被医生认为重症化风险较高的人群



※关于基础疾病（仅日语）

※符合①的人群，请携带地方政府邮寄的接种券前往接种点。

※关于是否符合②，

因基础疾病等接受医疗机构诊疗，或可以事先咨询医疗机构的人士，请咨询该医疗机构的医生。无法事先咨询医疗机构的人士，请于接种点在接种前问诊时咨询医生。此外，接种券的发放方法请查看您所在居住地当地政府发布的信息。

关于①②以外人群的第四剂接种事宜，将继续收集各类信息并加以研究。

使用的疫苗

无论第一剂到第三剂接种的是哪款疫苗，均可接种辉瑞公司或武田/莫德纳（Moderna）公司的疫苗。

新冠疫苗的

效果

- 海外研究显示，接种第三剂后经过4个月以上的60岁及以上人群在接种第四剂辉瑞公司疫苗后，在奥密克戎变异株流行期间，重症化预防效果在接种6周后也未见降低，而是维持原有水平。

引自：Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

新冠疫苗的

安全性

- 海外研究表明，在接种第四剂后21天内，未接到严重不良反应的报告。

18岁及以上人群在接种后21天内出现的症状

50%以上	疼痛 78.8%
10 - 50%	疲劳感 33.2% 肌肉疼痛 24.5% 头痛 21.5% 硬结、肿胀 12.0%
1 - 10%	关节疼痛 8.4% 37.5度以上发热 6.6% 淋巴结肿胀 4.7% 红斑、发红 8.0% 感觉障碍 1.5% 过敏反应 1.0%

（※）对象：274人（辉瑞公司：154人、莫德纳（Moderna）公司：120人）

引自：Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

◎在居民登记地（住址所在地）以外的地方接种疫苗

- 如果您是在住院的医疗机构或入住的养疗设施接种疫苗 → 请联系该医疗机构或设施。
 - 如果您是在接受基础疾病治疗的医疗机构内接种疫苗 → 请联系该医疗机构。
 - 如果您的住址所在地与实际住址不一致 → 您可能在您的实际住址所在地接种疫苗。
- 请您查阅实际居住的地方政府网站，或联系咨询窗口。

◎接种疫苗之前须经本人同意。

在接种疫苗时，请正确理解传染病预防效果和副作用风险这两个方面，并基于本人意愿判断是否接种疫苗。不会在未经本人同意的情况下接种疫苗。

不可强迫工作单位或周围的人等接种疫苗，也不可对未接种疫苗的人进行差别对待。

◎有因疫苗接种引发的健康损害救济措施。

疫苗接种可能会引起一些健康问题（例如疾病或残疾）。尽管这属于极端案例，但也不能完全消除其风险，所以已建立起一套针对该风险的救济措施。

相关保障的申请程序等，请咨询您的居民登记地的地方政府。

接种疫苗后，也请继续采取预防感染措施，佩戴口罩等。

新冠疫苗对于预防新型冠状病毒传染病的发病具有较大效果，但并不能100%预防。另外，还有因病毒变异带来的影响。

因此，请各位继续采取预防感染措施。具体来说，请坚持避免“3密（密集、密接、密闭）”、佩戴口罩、用肥皂洗手以及使用手部专用消毒酒精进行消毒等。

请继续采取
预防感染措施。



密集场所



密接场合



密闭空间

避免“3密（密集、密接、密闭）”



佩戴口罩



用肥皂洗手



坚持使用手部专用消毒酒精进行消毒

如果您无法浏览该网站，请联系您所在地的地方政府。

关于新冠疫苗的有效性和安全性等详细信息，请参阅厚生劳动省网站上的“关于新冠疫苗”网页。

厚生劳动省 新型冠状病毒疫苗

搜索

