

致60歲（含）以上者，以及患有基礎疾病者

4

新冠疫苗接種 第四劑接種通知

免費接種

全額公費

第四劑疫苗已開放接種。

接種第四劑在預防重症上可獲得較高的效果。



接種對象

基於目前獲得的科學知識等，預計在5月下旬針對以下對象，開始接種第四劑疫苗。

接種第三劑疫苗後已經過5個月之

① 60歲（含）以上者 ② 18歲（含）以上患有基礎疾病者

其他醫生認為重症化風險較高者



※關於基礎疾病（僅日文）

※符合①者，請攜帶居住地的當地政府郵寄的接種券，前往接種會場。

※關於是否符合②，

因基礎疾病等接受醫療機構診療，或可以事先諮詢醫療機構者，請諮詢該醫療機構的醫生。無法事先諮詢醫療機構者，請在接種會場的接種前問診時諮詢醫生。此外，接種券的郵寄方法請查看居住地的當地政府發佈的資訊。

關於①②以外者的第四劑接種事宜，將持續收集各種資訊並進行研究。

使用疫苗

無論第一劑到第三劑接種的是哪種疫苗，均接種輝瑞（Pfizer）公司或武田/莫德納（Moderna）公司的疫苗。

新冠疫苗的

效果

- 海外研究顯示，接種第三劑後經過4個月以上的60歲（含）以上者，在第四劑接種輝瑞（Pfizer）公司疫苗後，於Omicron變異株流行期間，預防重症的效果在接種6週後也未降低，維持原有水準。

出處：Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

新冠疫苗的

安全性

- 海外研究顯示，在接種第四劑後21天內，未收到嚴重不良反應出現的報告。

□ 18歲（含）以上者在接種後21天內出現的症狀

50%以上	疼痛 78.8%
10 - 50%	疲勞感 33.2% 肌肉痠痛 24.5% 頭痛 21.5% 硬結、腫脹 12.0%
1-10%	關節疼痛 8.4% 發燒37.5度以上 6.6% 淋巴結腫脹 4.7% 紅斑、泛紅 8.0% 感覺障礙 1.5% 過敏反應 1.0%

（※）對象：274人（輝瑞（Pfizer）公司：154人、莫德納（Moderna）公司：120人）

出處：Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

◎非在居民登記地（住址所在地）接種

- 要在住院治療中的醫療機構或安養機構接種 → 請洽詢醫療機構或安養機構。
- 基礎疾病患者要在治療中的醫療機構接種 → 請洽詢醫療機構。
- 居住地區和住址所在地不同的情況 → 有可能可在實際居住地區接種疫苗。
請上實際居住地區的市町村網站確認或洽諮詢窗口。

◎接種疫苗需本人同意

接種疫苗時，請本人針對預防感染症效果及不良反應風險兩者皆有正確理解之後，依照自身的意願決定是否接種。不會在未經本人同意的情況下進行接種。

不可強迫工作單位或周遭的人等接種疫苗、對未接種疫苗的人不可有歧視性待遇。

◎設有預防接種健康損害保障制度

預防接種有可能會引起健康損害（造成疾病或留下後遺症）。雖然發生機率極低，但仍有其潛在風險，因此設有一保障制度。

有關申請時所需的手續等，請洽詢居民登記地的市町村。

接種疫苗後，請持續配戴口罩等，採取防疫措施。

新冠疫苗對於預防新型冠狀病毒感染症的發病具有良好效果，但無法100%預防。另外，病毒變異亦會有所影響。

因此，請大家持續採取防疫措施。具體來說，請確實避免「3密（密集·密切接觸·密閉）」、戴口罩、用肥皂洗手及用手指專用消毒酒精進行消毒等。

請持續採取
預防感染措施。



密集場所



密切接觸場合



密閉空間

避免「3密（密集、密切接觸、密閉）」



戴口罩



用肥皂洗手



用手指專用消毒酒精
進行消毒

如果無法瀏覽該網站，請洽詢居住地的市町村政府。

關於新冠疫苗的有效性與安全性等詳細資訊，請瀏覽厚生
勞動省網站的「關於新冠疫苗」頁面。

厚生勞動省 新型冠狀病毒 疫苗

搜尋

