


# 만 60세 이상인 분 및 기저질환이 있으신 분에게


4

## 신종 코로나바이러스 백신 접종 4차 접종에 관한 안내



접종 비용 무료 전액 국비지원

4차 접종을 받을 수 있게 되었습니다.  
4차 접종으로 높은 중증화 예방 효과를 얻을 수 있습니다.



### 접종 대상

현시점에서 얻을 수 있는 과학적 지식 등을 감안하여 다음 분들을 대상으로 5월 하순경부터 4차 접종을 시작합니다.



※기저질환에 대하여(일본어)

3차 백신을 접종한 날로부터 **5개월이 경과한**

- ①만 60세 이상인 분
- ②만 18세 이상으로 기저질환이 있으신 분
- 기타 중증화 위험이 높다고 의사가 인정하는 분

※①에 해당하는 분은 거주지의 지방자치단체에서 우송된 접종권을 지참하시고 접종장으로 오시기 바랍니다.

※②의 해당 여부에 관하여

기저질환 등으로 의료기관에서 진료를 받고 있는 분이나 사전에 상담할 수 있는 의료기관이 있는 분은 해당 의료기관의 의사와 상담해 주십시오.

사전 상담할 수 있는 의료기관이 없는 분은 접종장으로 오셔서 예진 시 상담하시기 바랍니다. 또한, 접종권 배포 방법은 거주지의 지방자치단체에서 제공하는 정보를 확인해 주십시오.

①② 이외의 분들에 대한 4차 접종에 대해서는 계속해서 다양한 정보를 수집하면서 검토하겠습니다.

### 사용하는 백신

1~3차 접종에 사용한 백신의 종류와 상관없이  
화이자사 또는 다케다사/모더나사의 백신을 사용합니다.

### 신종 코로나바이러스 백신의 효과

- 해외 연구에서는 3차 접종 후 4개월 이상 경과한 만 60세 이상인 분에게 화이자사 백신을 4차 접종한 경우, 오미크론 변이 유행기에 있어서 접종 후 6주가 지나도 중증화 예방 효과가 저하되지 않고 유지된 것으로 보고되었습니다.

출처:Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

### 신종 코로나바이러스 백신의 안정성

- 해외 연구에서는 4차 접종 후 21일차까지 중대한 부작용은 나타나지 않은 것으로 보고되었습니다.

□만 18세 이상의 접종 후 21일차까지 나타난 증상

50% 이상	동통 78.8%
10~50%	권태감 33.2% 근육통 24.5% 두통 21.5% 경결·중창 12.0%
1~10%	관절통 8.4% 37.5도 이상의 발열 6.6% 림프절 종창 4.7% 홍반·발적 8.0% 지각장애 1.5% 알레르기 반응 1.0%

(※)대상: 274명(화이자사: 154명, 모더나사: 120명)

출처:Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

◎ 주민표가 있는 시정촌(주소지) 이외의 접종에 대하여

- 입원 및 입소 중인 의료기관이나 시설에서 백신을 접종하시는 분 → **의료기관이나 시설에 상담해 주십시오.**
- 기저 질환으로 치료 중인 의료기관에서 백신을 접종하시는 분 → **의료기관에 상담해 주십시오.**
- 거주지가 주소지와 다른 분 → **실제 거주하시는 지역에서 백신을 접종할 수 있는 경우가 있습니다.**  
실제 거주하시는 시정촌(市町村)의 홈페이지를 확인하시거나 상담 창구로 문의하시기 바랍니다.

◎ 백신을 접종하려면 본인의 동의가 필요합니다.

백신을 접종할 때는 감염증 예방 효과와 이상반응을 일으킬 위험 모두에 관한 올바른 지식을 습득한 후에 본인의 의사에 따라 접종 여부를 판단하시기 바랍니다. 접종 대상자의 동의 없이 접종하지 않습니다.

직장이나 주변 사람 등에게 접종을 강제하거나 접종을 받지 않았다는 이유로 차별적인 대응을 해서는 안 됩니다.

◎ 예방접종 건강 피해 구제 제도가 있습니다.

예방접종은 건강 피해(병에 걸리거나 장애가 남는 것)가 발생하는 경우가 있습니다. 매우 드물기는 하지만 완전히 없앨 수는 없기 때문에 구제 제도가 마련되어 있습니다.

신청에 필요한 절차 등에 관해서는 주민표가 있는 시정촌(市町村)에 문의하십시오.

백신 접종 후에도 마스크 착용 등 계속해서 감염 예방 대책에 힘써주시기 바랍니다.

신종 코로나 백신은 신종 코로나바이러스 감염증의 발병을 예방하는 높은 효과가 확인되었으나, 감염을 100% 예방하는 것은 아닙니다. 또한, 바이러스의 변이로 인한 영향도 있습니다.

이러한 이유로 여러분께서는 계속해서 감염 예방 대책에 힘써주시기 바랍니다. 구체적으로는 ‘3밀(밀집, 밀접, 밀폐)’ 피하기, 마스크 착용, 비누로 손씻기, 손 소독용 알코올 사용하기 등이 있습니다.

감염 예방 대책의 지속적인 노력을 부탁드립니다.



밀집된 장소



밀접된 장소



밀집된 장소

‘3밀(밀집, 밀접, 밀폐)’ 피하기



마스크 착용



비누로 손씻기



손 소독용 알코올 사용하기

홈페이지를 확인할 수 없는 경우는 거주하시는 시정촌(市町村) 등에 상담해 주십시오.

신종 코로나 백신의 유효성 및 안전성 등에 관한 자세한 정보는 후생노동성 홈페이지의 ‘신종 코로나 백신에 대하여’ 페이지를 확인해 주십시오.

후생노동성 코로나 백신 검색

