

للبالغين 60 عامًا فما فوق ومن يعانون من أمراض كامنة

4

التطعيم بلقاح فيروس كورونا
المستجد
إشعار الجرعة الرابعة

على نفقة الدولة بالكامل كلفة اللقاح: مجاني

أصبح بالإمكان تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح.
تتمتع الجرعة الرابعة بتأثير وقائي حيال تفاقم المرض.

لمن الجرعة

استنادًا إلى المعرفة العلمية المتاحة أمامنا حاليًا، سوف يبدأ تطعيم الأشخاص الموضحين أدناه بالجرعة الرابعة في نهاية شهر مايو/أيار.



المصابون بأمراض كامنة (إلإيانية فقط)

بعد مرور 5 أشهر على الجرعة الثالثة من اللقاح

① البالغون 60 عامًا أو أكثر ② البالغون 18 عامًا أو أكثر ويعانون من أمراض كامنة وسواهم ممن يعتبرهم الطبيب معرضين لخطر تفاقم المرض بشكل كبير

* على من يندرجون تحت رقم ① إحضار بطاقة التطعيم المرسله إليهم بالبريد من بلديتهم المحلية إلى مركز التطعيم.

* حول ما إذا كنت تندرج تحت رقم ② أم لا،

إذا كنت تعاني من مرض كامن وتخضع للفحص الطبي في إحدى المؤسسات الطبية، أو إذا كانت هناك مؤسسة طبية يمكنك استشارتها مسبقًا، فيرجى استشارة الطبيب فيها.
إذا لم تكن هناك مؤسسة طبية يمكنك استشارتها مسبقًا، فيرجى استشارة الطبيب أثناء الفحص الأولي في مركز التطعيم.
لمعلومات حول كيفية توزيع بطاقات التطعيم، يرجى الاطلاع على المعلومات التي ترسلها بلديتك المحلية.

بالنسبة للجرعة الرابعة لمن لا يندرجون تحت البندين ① و ②،
سوف نستمر بجمع مختلف المعلومات ودراسة الموضوع وتحليله.

اللقاح المستخدم

يتم استخدام لقاح شركة فايزر أو شركة تاكيدا/مودرنا
بغض النظر عن اللقاح المستخدم في الجرعات الثلاث الأولى.

تأثير لقاح كورونا المستجد

● أوضحت الدراسات التي أجريت في بلاد الخارج أن التأثير الوقائي لتفاقم المرض في من تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق استمر بدون انخفاض حتى بعد مرور 6 أسابيع على تلقي الجرعة الرابعة من لقاح فايزر بعد مرور 4 أشهر على الأقل على تلقي الجرعة الثالثة خلال فترة انتشار سلالة المصدر: بار-أون واي إم وآخرون. الحماية التي توفرها الجرعة الرابعة من BNT162b2 ضد سلالة أوميكرون في إسرائيل. مجلة نيو إنغلاند الطبية (NEJM). 2022. أوميكرون.

لقاح كورونا المستجد

سلامة

● أفادت دراسات تمت في بلاد الخارج عدم ملاحظة أي آثار جانبية خطيرة خلال 21 يومًا من تلقي الجرعة الرابعة.
□ الأعراض التي ظهرت خلال 21 يومًا من التطعيم في البالغين 18 عامًا أو أكثر

50% أو أكثر	الألم 78.8%
50 - 10%	التعب 33.2% آلام العضلات 24.5% الصداع 21.5% التصلب والتورم 12.0%
10 - 1%	آلام المفاصل 8.4% حمى تبلغ 73.5 درجة أو أكثر 6.6% تورم الغدد اللمفاوية 4.7% احمرار واحترقان الجلد 8.0% الاضطراب الحسي 1.5% رد الفعل التحسسي 1.0%

(*) المشاركون: 274 شخصًا (فايزر: 154 شخصًا، مودرنا: 120 شخصًا)

المصدر: جبلي ريغيف-يوتشاي وآخرون. فعالية الجرعة الرابعة من لقاح الرنا المرسل ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد. مجلة نيو إنغلاند الطبية (NEJM). 2022.

© حول التطعيم في غير المكان الذي يضم سجل الإقامة (مكان السكن)

- الأشخاص الذين سيتلقون التطعيم في المستشفى أو المؤسسة الطبية التي ينزلون فيها ← يرجى استشارة المؤسسة الطبية
- الأشخاص الذين سيتلقون التطعيم في المؤسسة الطبية التي يتلقون العلاج فيها لأمراض كامنة ← يرجى استشارة المؤسسة الطبية
- الأشخاص الذين يسكنون في مكان مختلف عن مكان تسجيل إقامتهم ← قد يكون بالإمكان تلقي التطعيم في منطقة السكن يرجى مراجعة موقع بلدية المنطقة التي تسكن فيها أو الاتصال بمكتب الاستفسارات.

© من المطلوب الحصول على موافقة الشخص الذي سيتلقى التطعيم.

عندما تريد تلقي التطعيم، يرجى الاطلاع بشكل صحيح على تأثيرات الوقاية من الأمراض المعدية وآثارها الجانبية أولاً ثم اتخاذ قرار بشأن التطعيم بإرادتك. لا يتم التطعيم بدون موافقة الشخص المعني.

لا يجوز إجبار الآخرين من حولكم أو في مكان العمل على تلقي التطعيم، كما لا يجوز التحيز ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

© يتوفر نظام إغاثة للأضرار الصحية الناتجة عن التطعيم الوقائي.

قد يتسبب التطعيم الوقائي في وقوع مشاكل صحية (الإصابة بمرض أو التعرض لإعاقة). تم تأسيس نظام الإغاثة لأنه لا يمكن القضاء على هذه المشاكل على الرغم من شدة ندرة وقوعها.

فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة البلدية التي تضم شهادة إقامتك.

يرجى الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة حتى بعد تلقي التطعيم

لقد ثبت بأن لقاح فيروس كورونا المستجد فعال للغاية في منع ظهور أعراض العدوى ولكن فعاليته ليست تامة. كما أنه يتأثر بسلاسل الفيروس الجديدة أيضاً. ولهذا نرجو منكم الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد العدوى. على وجه الخصوص يرجى تجنب تلك «الأمر الثلاثة» (الأماكن المزدحمة والتواصل القريب والأماكن المغلقة) وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالصابون وتعقيم اليدين بالكحول جيداً.

نرجو منكم

الاستمرار في اتخاذ
التدابير الوقائية
ضد العدوى.



الأماكن المزدحمة



التواصل القريب



الأماكن المغلقة



ارتداء الكمامة



غسل اليدين
بالصابون



تعقيم اليدين بالكحول جيداً

تجنب تلك «الأمر الثلاثة» (الأماكن المزدحمة والتواصل القريب والأماكن المغلقة)

يرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوزارة.

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا المستجد، يرجى الاطلاع على صفحة «حول لقاح فيروس كورونا المستجد» على موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وزارة الصحة والعمل والرعاية
الاجتماعية لقاح كورونا

بحث

