

ចំពោះអ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំឡើង អ្នកមានជំងឺមូលដ្ឋាន

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាក់លើកទី4

4



ចាក់តែគិតថ្លៃ ចំណាយសាធារណៈទាំងស្រុង

អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 4 បាន។

អាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការវិវឌ្ឍន៍ធ្ងន់ធ្ងរខ្ពស់ ដោយការចាក់លើកទី4។



អ្នកដែលអាចចាក់បាន

យោងតាមចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលបានបច្ចុប្បន្ន យើងចាប់ផ្តើម ការចាក់លើកទី4 នៅអំឡុងចុងខែឧសភាចំពោះបុគ្គលដូចខាងក្រោម។



*អំពីជំងឺមូលដ្ឋាន (មានតែភាសាជប៉ុន)

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលកន្លងបាន 5ខែក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3

- ① អ្នកអាយុ60ឆ្នាំឡើង
- ② អ្នកអាយុ18ឆ្នាំឡើងនិងមានជំងឺមូលដ្ឋាន ក្រៅពីនេះ អ្នកដែលគ្រូពេទ្យទទួលស្គាល់ថាមានហានិភ័យវិវឌ្ឍន៍ ធ្ងន់ធ្ងរខ្ពស់

※ អ្នកចូលលក្ខខណ្ឌ ① សូមយកបង្កាន់ដៃចាក់វ៉ាក់សាំងដែលធ្វើពីអាជ្ញាធរនៃកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ទៅទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង។

※ អំពីថាតើចូលលក្ខខណ្ឌ ② ឬទេ

ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលការពិនិត្យដោយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រដោយសារជំងឺមូលដ្ឋានជាដើម និងអ្នកដែលមានស្ថាប័ន វេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចពិគ្រោះជាមុន សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនៃគ្រឹះស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រនោះ។

ចំពោះអ្នកដែលមិនមានស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចពិគ្រោះជាមុនបាន សូមពិគ្រោះពេលត្រូវពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមនៅ ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង។ គួរបញ្ជាក់ថា របៀបចែកបង្កាន់ដៃចាក់វ៉ាក់សាំង សូមពិនិត្យការផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរនៃកន្លែង ដែលអ្នករស់នៅ។

ចំពោះការចាក់លើកទី4 សម្រាប់អ្នកក្រៅពី ① ② យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗហើយពិចារណាជាបន្តទៅទៀត។

វ៉ាក់សាំងដែលប្រើ

ប្រើវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬក្រុមហ៊ុន Takeda/Moderna មិនថាបាន ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទអ្វីនៅលើកទី1ដល់ទី3 ឡើយ។

ប្រសិទ្ធភាព

នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19

- ក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅបរទេស គេបានរាយការណ៍ថា ករណីបានចាក់លើកទី 4 ដោយវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer ចំពោះ អ្នកមានអាយុ 60ឆ្នាំឡើងដែលកន្លងផុតបាន 4ខែឡើងក្រោយចាក់លើកទី 3 ក្នុងពេលវិវាទរាលដាលវីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ក្រុង ទោះបីកន្លងផុត 6សប្តាហ៍ក្រោយចាក់ក៏ដោយ ក៏ប្រសិទ្ធភាពបង្ការការវិវឌ្ឍន៍ធ្ងន់ធ្ងរនៅតែមានមិនធ្លាក់ចុះ។

ប្រភព៖ Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

សុវត្ថិភាព

នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19

- ក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅបរទេស គេបានរាយការណ៍ថា ត្រឹមថ្ងៃទី21ក្រោយចាក់លើកទី4 មិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។

ធាតុសញ្ញាលេចចេញត្រឹមថ្ងៃទី21 នៃអ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើង

50%ឡើង	ឈឺចាប់ 78.8%
10 - 50%	ស្លឹកស្លែ 33.2% ឈឺសាច់ដុំ 24.5% ឈឺក្បាល 21.5% ឡើងរឹង/ហើម 12.0%
1 - 10%	ឈឺសន្លាក់ 8.4% ក្តៅខ្លួន37.5អង្សាឡើង 6.6% ឡើងកូនកណ្តុរ 4.7% កន្ទួលក្រហម/ស្បែកឡើងក្រហម 8.0% បញ្ហាផ្នែកវិញ្ញាណ 1.5% ប្រតិកម្មអាឡែកហ្សឺ 1.0%

(*) កម្មវត្ថុ៖ 274នាក់ (ក្រុមហ៊ុន Pfizer : 154នាក់ ក្រុមហ៊ុន Moderna : 120នាក់)

ប្រភព៖ Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

- អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងផ្សេងពីកន្លែងដែលមានក្នុងសំបុត្រស្នាក់នៅ (ទីលំនៅចុះបញ្ជី)
 - សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រឬមណ្ឌលចាស់ជរាដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅព្យាបាលឬកំពុងស្នាក់នៅ → សូមពិគ្រោះជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រឬមណ្ឌលចាស់ជរានោះ។
 - សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រដែលខ្លួនកំពុងព្យាបាលជំងឺមូលដ្ឋាន → សូមពិគ្រោះជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រនោះ។
 - សម្រាប់អ្នកដែលកន្លែងស្នាក់នៅខុសពីទីលំនៅចុះបញ្ជី → អាចមានករណីដែលអាចចាក់នៅតំបន់ដែលកំពុងស្នាក់នៅជាក់ស្តែងបាន។

សូមពិនិត្យនៅគេហទំព័រឬសាកសួរការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរៀបរយសង្កាត់ភូមិដែលអ្នកកំពុងស្នាក់នៅជាក់ស្តែង។


- ដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ចាំបាច់ត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីសាមីខ្លួន។
 - នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង សូមសម្រេចចិត្តថាចាក់ដោយផ្អែកលើឆន្ទៈសាមីខ្លួនបន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់ត្រឹមត្រូវអំពីទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងហានិភ័យនៃផលរំខាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររាងកាយ។ មិនមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីអ្នកទទួលបានការចាក់ទេ។
 - ហាមឃាត់ការបង្ខំឱ្យចាក់ឬការប្រព្រឹត្តិបែបរើសអើងចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់ ពីសំណាក់កន្លែងការងារឬអ្នកជុំវិញជាដើម។

- មានប្រព័ន្ធជំនួយចំពោះការរងផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ។
 - នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ អាចមានករណីកើតមានផលប៉ះពាល់សុខភាព(កើតជំងឺ ឬបន្ទុយនូវពិការភាព)។ វាក៏កម្របំផុតប៉ុន្តែមិនអាចបំបាត់ចោលទាំងស្រុងបានដែរ ហេតុនេះប្រព័ន្ធជំនួយត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 - អំពីបែបបទជាដើមដែលចាំបាច់ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមប្រឹក្សាជាមួយក្រុងស្រុកខណ្ឌរៀបរយសង្កាត់ភូមិដែលមានក្នុងសំបុត្រស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

សូមបន្តអនុវត្តវិធានការការពាររាងកាយដូចជាពាក់ម៉ាស់ជាដើម ទាំងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួច

វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ-19 ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនោះគឺមិនមែន 100% នោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏មានឥទ្ធិពលដោយសារការបំប្លែងរបស់វីរុសផងដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកអ្នកបន្តអនុវត្តវិធានការការពាររាងកាយ។ និយាយដោយជាក់លាក់ សូមអនុវត្តដូចជា ការជៀសវាង "3-Mitsu ("ជិត" ទាំង3) (កន្លែងកកកុញ ការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ កន្លែងបិទជិត)" ការពាក់ម៉ាស់ ការលាងដៃនិងសាប៊ូឬសម្លាប់មេរោគដោយអាល់កុលសម្លាប់មេរោគម្រាមដៃជាដើម។

សូមបន្តអនុវត្តវិធានការការពាររាងកាយ						
	កន្លែងកកកុញ ការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ កន្លែងបិទជិត ជៀសវាង "3-Mitsu ("ជិត" ទាំង3) (កន្លែងកកកុញ ការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ កន្លែងបិទជិត)"	ពាក់ម៉ាស់	លាងដៃនិងសាប៊ូ	សម្លាប់មេរោគដោយអាល់កុលសម្លាប់មេរោគម្រាមដៃ		

ករណីមិនអាចមើលគេហទំព័រនេះបាន សូមប្រឹក្សាជាមួយក្រុងស្រុកខណ្ឌរៀបរយសង្កាត់ភូមិជាដើមដែលអ្នករស់នៅ។	
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជាដើមនៃវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា សូមមើលគេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព ត្រង់ទំព័រ "អំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា"។	

សាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈ:

សុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព វីរុសកូរ៉ូណា វ៉ាក់សាំង **ស្វែងរក**