

لقاح ثنائي التكافؤ صنع من قبل شركة فايزر
(BA.4-5/BA.1)
(أيار/ مايو 2023)

إرشادات خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (الجرعة التنشيطية (بدأ التطعيم في ربيع عام 2023))

نبذة عن لقاح فيروس كورونا المستجد

يدخل هذا اللقاح في إطار برنامج الحكومات الوطنية والمحلية الخاص بمحاربة فيروس كورونا (السارس-كوفي-2)، بحيث تتكف الصناديق العمومية بتمويل هذا اللقاح، وهو متاح مجاناً لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح به.

الأثار الجانبية لهذا اللقاح وطريقة تدبيره

تم تصنيع هذا اللقاح الثنائي التكافؤ الخاص بسلالة أوميكرون (السلالة الأساسية (السلالة الأصلية) وسلالة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5) من قبل شركة فايزر، ويتم التطعيم به بهدف الوقاية من تفاقم المرض عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والوقاية من العدوى به والوقاية من ظهور المرض. في تجارب سريرية أجريت على أشخاص يزيد عمرهم على 55 عاماً، توضح بأن عيار الأجسام المضادة للقاح ثنائي التكافؤ الخاص بسلالة BA.1 بعد شهر واحد من تلقي التطعيم مساوٍ أو أعلى منه في الجرعات التنشيطية من اللقاح الأساسي أحادي التكافؤ (السلالة الأصلية)، ولذلك فإنه يمكن توقع درجة معينة من التأثير الوقائي من ظهور المرض وتفاقمه. كما توضح في تجارب غير سريرية أن الجرعات التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الخاص بسلالة BA.4-5 تحفز الأجسام المضادة ضد السلالة الأصلية وسلالة دلنا وسلالات أوميكرون (BA.1، BA.2، BA.4، BA.5... إلخ)، ومن المتوقع أن يكون له مجموعة واسعة من الأثار الوقائية ضد مختلف السلالات المتحورة.

اسم المنتج	كوميرناتي RTU. الحقن العضلي (ثنائي التكافؤ: السلالة الأصلية / سلالة أوميكرون BA.1 أو السلالة الأصلية / سلالة أوميكرون BA.4-5)
الفعالية والآثار الجانبية 2	الوقاية من الأمراض المعدية التي يتسبب فيها السارس-كوفي-2
تكرار التلقيح والفواصل الزمنية	مرة واحدة (بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة السابقة) *حقن عضلي
الفئات المستهدفة بالتلقيح	الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولية (الجرعة الأولى / الثانية) ① ممن يبلغون 65 عاماً فما فوق، ② ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 65 عاماً ممن يعانون من أمراض كامنة أو الذين رأى الطبيب بأنهم معرضون لخطر تفاقم المرض بشكل كبير، ③ الكوادر الطبية والعاملون في المرافق الطبية الخاصة بالمسنين وسوى ذلك
مقدار الجرعة	جرعة واحدة (0.3 مل (مرة واحدة))

- يمكن إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعات السابقة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الجرعة الأولى.
- إن تلقي هذا اللقاح لا يحول دون الإصابة بالعدوى بشكل تام، ولذلك يتوجب عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح

- يستثنى من التلقيح الأشخاص المشار إليهم أسفله، لذا يرجى التأكد من استشارة الطبيب إن كانت لديكم إحدى الحالات التالية قبل عملية التلقيح:
- أشخاص لديهم حمى واضحة (*1)
 - أشخاص يعانون من أمراض حادة
 - أشخاص لهم تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة تجاه أي عنصر مكون لهذا اللقاح (*2)
 - أشخاص بحالات أخرى لم تتطرق إليها أعلاه، والتي تجعل تلقي هذا اللقاح غير مناسب
- (*1) تُعرّف الحمى الواضحة بأنها 37.5 د أو أعلى. ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحالات التي يُحكم فيها على أنها حمى بالنسبة لدرجة حرارة الجسم العادية حتى ولو كانت تحت 37.5 درجة مئوية
- (*2) الحساسية المفرطة والأعراض المشيرة إليها، بما في ذلك من أعراض التهاب الغشاء المخاطي، والصفير، وضيق التنفس، وانعدام انتظام دقات القلب، وضغط الدم المنخفض. لا يمكن لمن عانوا من هذه الأعراض بعد الجرعات السابقة أن يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاح الذي يتضمن نفس المكونات.

الأشخاص الذين عليهم توخي الحذر بشأن تلقي اللقاح

- يجب على الأشخاص الذين لديهم أي من الحالات التالية توخي الحذر بشأن تلقي هذا اللقاح. إن كنت تعتقد أن إحدى الحالات تنطبق عليك، فتأكد من إطلاع الطبيب على حالتك أثناء استشارة ما قبل التلقيح
- أشخاص يخضعون للعلاج المضاد للتخثر، الأشخاص الذين يعانون من قلة الصفائح أو اضطرابات التخثر
 - أشخاص تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، أو أشخاص لهم أقارب مصابين بنقص المناعة الخلقي
 - أشخاص مصابون بأمراض رئيسية أو مزمنة، مثل القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات دموية أو اضطرابات في النمو
 - أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي المعمم في غضون يومين من تلقيهم لقاحات في الماضي
 - أشخاص عانوا من تشنجات في الماضي
 - أشخاص يحتمل أن تكون لديهم حساسية من مكونات هذا اللقاح

في حالة الحمل أو احتمالية الحمل أو الرضاعة، يرجى التأكد من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح. ولكن في حالة تعذر استشارة طبيب النسائية والتوليد فإن التطعيم يكون ممكناً إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك.

في حالة ظهور حساسية مفرطة أو كانت لديكم حساسية تجاه الأدوية في الماضي، تأكدوا من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.
(يُتبع على الوجه الخلفي)

ما يجب القيام به بعد تلقي التلقيح

- بعد التلقيح، يرجى الانتظار في نفس المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل (30 دقيقة على الأقل لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية الشديدة بما في ذلك الحساسية المفرطة في الماضي، أو أشخاص ظهر عليهم المرض، أو أصيبوا بالإغماء، إلخ.)، وفي حالة الإصابة بتوعك، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً. (هذا يفسح المجال أمام الاستجابة السريعة للأثار الجانبية المفاجئة)
- يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحقونة. بينما لا يشكل الاستحمام أي عائق في نفس يوم التلقيح، يرجى تفادي فرك أو حك المنطقة المحقونة
- يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الشاقة يوم إجراء التلقيح

الآثار الجانبية

- من الآثار الجانبية الرئيسية التي تظهر على متلقي اللقاح نجد: الألم في منطقة الحقن، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات، والإرهاق، والقشعريرة، والحمى. ومن الآثار الجانبية النادرة والخطيرة نجد كذلك الصدمة أو الحساسية المفرطة. بما أن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فهناك احتمال ظهور أعراض لم يتم توضيحها حتى الآن. في حالة ظهور أي أعراض مقلقة بعد التلقيح، ينصح استشارة الطبيب الذي أجرى التلقيح، أو طبيب الأسرة
- تم الإبلاغ عن حالات يشتبه فيها بالإصابة بالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم وهي بعض الحالات النادرة. إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- تم الإبلاغ عن الإصابة بمتلازمة غيلان باريه بعد التطعيم بلقاح الرنا المرسال في بعض الحالات النادرة. إذا ظهرت أعراض مثل ضعف الأطراف أو التشنج بعد التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.

معلومات حول نظام الإغاثة الخاص بالحالات المرضية الناجمة عن التلقيح

يمكن للتطعيمات أن تسبب مشاكل صحية (مرض أو إعاقة). رغم أن مثل هذه المشاكل الصحية نادرة للغاية، إلا أنه يستحيل وضع حدٍّ للمخاطر المصاحبة، ولهذا السبب قد تم إنشاء نظام إغاثة للتعاطي مع أي أمر طارئ في حالة حدوث أضرار صحية ناجمة عن لقاح فيروس كورونا، فالإعانة متاحة أيضاً بموجب قانون التحصين الخاص بالمناعة (وتشمل هذه الإعانة، النفقات الطبية، تعويضات معاش العجز، وما شابه). للاستفسار أكثر عن الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة بلدية مكان إقامتكم

معلومات حول عدوى فيروس كورونا المستجد

حين تتقدم عدوى ناجمة عن فيروس السارس-كوفي-2، تظهر أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، كالحمى والسعال. بينما يتعافى العديد من الأشخاص ذوي الأعراض الخفيفة من المرض، تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الأعراض الشديدة بظهور أعراض الالتهاب الرئوي، التي تتجلى في صعوبة التنفس، وقد تؤدي حتى إلى الوفاة

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح ثنائي التكافؤ خاص بسلالة أوميكرون (BA.4-5/BA.1) من صنع شركة فايزر) الذي سيستعمل هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح مرسل الحمض النووي الريبوزي أو "إم آر إن إيه mRNA"، وهو عبارة عن تركيبة يتم فيها تغليف الرنا المرسال في غشاء دهني، والرنا المرسال هو مخطط بروتين سبايك لفيروس السارس-كوفي-2 (السلالة الأساسية (السلالة الأصلية) وسلالة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5) (وهو بروتين ضروري لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية). عندما يدخل الرنا المرسال في الخلايا البشرية من خلال التلقيح بهذا الدواء، يتم إنتاج بروتينات سبايك الفيروسية في الخلايا بناءً على الرنا المرسال، وبالتالي يتم تحفيز الأجسام المضادة ضد البروتينات الشوكية والاستجابات المناعية الخلوية، والتي يُعتقد أنها تمنع العدوى التي يسببها السارس-كوفي-2

يحتوي هذا الدواء على العناصر المكونة التالية

العنصر النشط	
توزيناميران (الرنا المرسال الذي يشفر الجسم الكامل لبروتين سبايك في السلالة الأساسية (السلالة الأصلية))	◇
-ريلتوزيناميران أو فانتوزيناميران (كلاهما رنا مرسل يشفر الجسم الكامل لبروتين سبايك في سلالة أوميكرون BA.1 أو BA.4-5)	◇
أل-س-0315: [[هيدروكسي بيوتيل] أزنيديل] مكرر (هكسان-6، 1-دييل) مكرر (2-هيكسيديكاتوات)	◇
أل-س-0159: [[بولي إيثيلين جلايكول] -2000] ن، ن-ديتيراديسيل أسيتاميد	◇
دي-إس-بي-سي: 1، 2-ديستارويل-إس-إن-جليسرول-3-فسفتيديل كولين	◇
الكوليسترول	◇
تروميتامول	◇
هيدروكلوريد تروميتامول	◇
-السكروز	◇

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرفاهية

وزارة الصحة والعمل والرفاهية لقاحات فيروس كورونا المستجد

Search



إذا كنت لا تستطيع تصفح الموقع، يرجى الاتصال بمقر بلدتك.