


ヌバキソビッド筋注追加接種（3回目接種）初回シリーズ別 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



初回シリーズ 接種ワクチン	計	男	女	抗N 抗体	接種前	接種1か月後	接種3か月後	GMTR 1か月後	GMTR 3か月後
バキスゼブリア筋注	60	27	33	10	226 (155 - 329)	4,629 (3,694 - 5,800)	3,203 (2,277 - 4,506)	20.5 (14.3 - 29.5)	14.2 (9.5 - 21.2)
スパイクバックス筋注	19	10	9	6	1,949 (1,010 - 3,763)	11,392 (8,267 - 15,697)	10,455 (6,956 - 15,715)	5.8 (3.6 - 9.6)	5.4 (2.9 - 9.8)
コミナティ筋注	91	32	59	20	980 (711 - 1,352)	11,752 (9,154 - 15,087)	11,337 (9,309 - 13,808)	12.0 (8.2 - 17.5)	11.6 (8.1 - 16.6)
合計	170	69	101	36	630 (488 - 813)	8,429 (7,104 - 10,002)	7,192 (5,966 - 8,669)	13.4 (10.4 - 17.2)	11.4 (8.9 - 14.6)

カッコ内は幾何平均抗スパイクタンパク質抗体価の95%信頼区間(U/mL) 計 (人)

抗N抗体：接種前の抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体陽性者数(人)

* GMTR 幾何平均抗体価倍率 Geometric mean titer ratio

