

2023(令和5)年7月28日

# 令和5年度 厚生労働省委託事業 新型コロナワクチン接種後健康状況調査

## 中間報告 (2021/11/2～2023/06/25)

## ■ 調査概要

## ■ 調査結果

### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

### II. 症状別

# ワクチン接種会場にてリーフレット配布しアプリより回答



令和4年度 厚生労働省委託事業

新型コロナウイルス  
接種後の健康状況調査に  
ご協力をお願いします

追加接種対応

この調査では、調査期間中に新型コロナウイルスワクチン接種（初回接種又は追加接種）をされた方に接種後一定期間の症状・疾病等健康状況をお聞きします。この結果を集計・分析し、ワクチン接種後の健康状況に関する情報を公表してまいります。アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表されることはありません。

待機時間内にかんたんエントリー！

1 ダウンロード・登録

アンケート回答には  
アプリ「Door.」が必要です  
※会員登録無し、本人確認不要は不要です

Door.



2 回答フォーム取得

【一般の方】 【医師の方】



下記の英数字または QR コード  
でアンケート用回答キーを登録



3 アンケート



【ご家族などの複数の回答をご希望の方】 <https://mhlw.key.medoor.com> 【一般の方】 のみ左記のサイトより別途回答キーを発行することができます  
※上記を除き、同一の方から複数の回答がなされた場合には、すべての回答が無効になる場合があります  
【一般の方】については、ワクチン接種当日中のエントリーおよびアンケート回答で接種後の体調不安など医師にチャットで健康相談ができます



## アンケート回答 & 医師相談について



### アンケート回答手順



### 医師相談手順

「一般の方」については当日エントリーおよび回答後に医師への相談キーをお取りします  
相談への回答は、MRT 株式会社が提供するサービス「Door.」に登録する医師によるものであり、厚生労働省が委託するものではありません

- 1 「相談・回答」を選択 当日アンケート回答後にホーム画面より選択
- 2 「健康相談キー」を選択 「Door.」のロゴが入ったキーを選択
- 3 「相談内容」の入力 事前に医師に相談したい内容を入力
- 4 「相談」開始 相談内容に合わせて医師が回答

### 《本調査における Door. の使い方・登録方法等について》


Door. 事務局 (MRT 株式会社 | 東証マザーズ 証券コード: 60341)  
URL : <https://medoor.com/webmed/survey/mhlw>

メール : [mhlw@medoor.com](mailto:mhlw@medoor.com)

Door. の使い方




## 接種日アンケート有効（回答日＝接種日）を母数とする






## 接種日アンケート有効（回答日＝接種日）を母数とする



# 回答フェーズで全体、メーカー別、性別、世代別に分析



# 本調査の特性及び本資料掲載データの閲覧にあたっての留意点

## ■調査の特性

本調査は被接種者のうち、参加に同意いただいた者が任意で回答したものについて集計し、公表している。

## ■留意点

- 本調査の開始時期や、本調査の実施形態（スマートフォン上で動作するオンラインツールを活用した調査）に鑑み、参加者の年齢や属性等に偏りが生じる可能性があることに留意する必要がある。
- 本調査においては、症状が出なかった場合にも、「症状が出なかった」ことについて回答を求めているが、症状が出た方が回答しやすい（症状が出なかった方は回答を棄権しやすい）可能性が考えられる。
- 症状の発現頻度の算出にあたっては、回答が得られた者のうち、症状が出た者を症状の発現頻度としていることから、結果として、発現頻度が高く算出される傾向が想定されることについて留意が必要である。
- 回答者数（グラフや表に付されたNの値など）が少ない項目は、例えば、症状の発現率の信頼区間が広がっている等、結果の解釈に留意を要する。
- 本調査においては、接種当日中のエントリー及びアンケート回答を有効回答として取り扱っているが、2022年3月27日データロックの中間報告分より、算定の基準としていた時刻が協定世界時（UTC）から日本標準時（JST）に変更された。このため、それ以前の中間報告において有効回答とされていた一部のデータが無効回答に、あるいは逆に無効回答とされていた一部のデータが有効回答に変更されていることに留意が必要である。

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果

#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目


#### II. 症状別

## 1-2.分析の対象（接種1回目当日）

### 接種1回目接種日アンケート

凡例：  
自分...本人が回答  
自分以外...家族が代理で回答  
有効...回答日=接種日  
無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 4336人 (内 有効回答者数:3609人 無効回答者数:727人)

### 1-3.特性\_全体（接種1回目当日）

年代別-接種1回目当日




性別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者:N=3609

## 1-4.特性\_全体（接種1回目当日）

ワクチンメーカー別-接種1回目当日



都道府県別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者:N=3609




## 1-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種1回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=3165

## 1-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目当日



接種1回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=346

## 1-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=5

## 1-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



接種1回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=91

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 2-2.分析の対象（接種1回目1週間後）


### 接種1回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 3609人 内 回答有:1495人 回答無:2114人(回答率41.4%)

## 2-3.特性\_全体（接種1回目1週間後）

年代別-接種1回目1週間後



性別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1495




## 2-4.特性\_全体（接種1回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目1週間後




都道府県別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者:N=1495

## 2-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種1回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=1300

## 2-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=136

## 2-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

## 2-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=56

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 3-2.分析の対象（接種1回目2週間後）

### 接種1回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 3609人 内 回答有:1395人 回答無:2214人(回答率38.7%)




### 3-3.特性\_全体（接種1回目2週間後）

年代別-接種1回目2週間後




性別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

### 3-4.特性\_全体（接種1回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目2週間後




都道府県別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1395

### 3-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種1回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=1219

### 3-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種1回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種1回目2週間後



接種1回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=119

### 3-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

### 3-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種1回目2週間後



接種1回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=55

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果

#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別




## 4-2.分析の対象（接種2回目当日）

### 接種2回目接種日アンケート

凡例：  
 自分...本人が回答  
 自分以外...家族が代理で回答  
 有効...回答日=接種日  
 無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 1077人（内 有効回答者数:738人 無効回答者数:339人）

### 4-3.特性\_全体（接種2回目当日）

年代別-接種2回目当日




性別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者:N=738

## 4-4.特性\_全体（接種2回目当日）

ワクチンメーカー別-接種2回目当日




都道府県別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者:N=738

#### 4-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種2回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=652

#### 4-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=57

## 4-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

#### 4-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



接種2回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=27

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果

#### I. アンケート回答者


1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別



## 5-2.分析の対象（接種2回目1週間後）


### 接種2回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 738人 内 回答有:551人 回答無:187人(回答率74.7%)

### 5-3.特性\_全体（接種2回目1週間後）

年代別-接種2回目1週間後




性別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者:N=551

## 5-4.特性\_全体（接種2回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目1週間後




都道府県別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=551

## 5-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種2回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=487

## 5-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目1週間後



接種2回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=40

## 5-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

## 5-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種2回目1週間後



接種2回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=23

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果

#### I. アンケート回答者


1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別



## 6-2.分析の対象（接種2回目2週間後）


### 接種2回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 738人 内 回答有:514人 回答無:224人(回答率69.6%)

### 6-3.特性\_全体（接種2回目2週間後）

年代別-接種2回目2週間後




性別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者: N=514

## 6-4.特性\_全体（接種2回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目2週間後




都道府県別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者:N=514

## 6-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種2回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=453

## 6-6.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種2回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=39

## 6-7.特性\_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

## 6-8.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



接種2回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=21

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果

#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別




## 7-2.分析の対象（接種3回目当日）

### 接種3回目接種日アンケート

凡例：  
自分...本人が回答  
自分以外...家族が代理で回答  
有効...回答日=接種日  
無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 2402人（内 有効回答者数:2016人 無効回答者数:386人）

### 7-3.特性\_全体（接種3回目当日）

年代別-接種3回目当日




性別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者：N=2016

## 7-4.特性\_全体（接種3回目当日）

ワクチンメーカー別-接種3回目当日




都道府県別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者:N=2016

## 7-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=339

## 7-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=5

## 7-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=4

## 7-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=1436

## 7-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日



性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=6



## 7-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=2

## 7-11.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=222

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
- 8. 接種3回目1週目**
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 8-2.分析の対象（接種3回目1週間後）


### 接種3回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 2016人 内 回答有:856人 回答無:1160人(回答率42.5%)

### 8-3.特性\_全体（接種3回目1週間後）

年代別-接種3回目1週間後




性別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者: N=856

## 8-4.特性\_全体（接種3回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目1週間後




都道府県別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者: N=856

## 8-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=142

## 8-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後



性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=2



## 8-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=2

## 8-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=581

## 8-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=2

## 8-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=1

## 8-11.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=126

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 9-2.分析の対象（接種3回目2週間後）


### 接種3回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 2016人 内 回答有:834人 回答無:1182人(回答率41.4%)

### 9-3.特性\_全体（接種3回目2週間後）

年代別-接種3回目2週間後



性別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=834




## 9-4.特性\_全体（接種3回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目2週間後




都道府県別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=834

## 9-5.特性\_メーカー別：ファイザー社 1価ワクチン（起源株）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=142

## 9-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=2

## 9-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=2

## 9-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=568

## 9-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=2

## 9-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種3回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=1

## 9-11.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=117



■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
- 10. 接種4回目当日**
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目


II. 症状別

## 10-2.分析の対象（接種4回目当日）

### 接種4回目接種日アンケート

凡例：  
 自分...本人が回答  
 自分以外...家族が代理で回答  
 有効...回答日=接種日  
 無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 887人（内 有効回答者数:730人 無効回答者数:157人）

### 10-3.特性\_全体（接種4回目当日）

年代別-接種4回目当日




性別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=730

## 10-4.特性\_全体（接種4回目当日）

ワクチンメーカー別-接種4回目当日




都道府県別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=730

## 10-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=52

## 10-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=49

## 10-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=84

## 10-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日



性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=425




## 10-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=88

## 10-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=28

## 10-11.特性\_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種4回目当日）

年代別（武田（ノバボックス））-接種4回目当日



性別（武田（ノバボックス））-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者（武田（ノバボックス））：N=3

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
- 11. 接種4回目1週目**
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 11-2.分析の対象（接種4回目1週間後）


### 接種4回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 730人 内 回答有:304人 回答無:426人(回答率41.6%)

### 11-3.特性\_全体（接種4回目1週間後）

年代別-接種4回目1週間後




性別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者：N=304

## 11-4.特性\_全体（接種4回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目1週間後




都道府県別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者: N=304

## 11-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後



性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=26




## 11-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=16

## 11-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=43

## 11-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=158

## 11-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=48

## 11-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=12

## 11-11.特性\_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種4回目1週間後）

年代別（武田（ノバボックス））-接種4回目1週間後



性別（武田（ノバボックス））-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者（武田（ノバボックス））：N=1

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 12-2.分析の対象（接種4回目2週間後）

### 接種4回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 730人 内 回答有:313人 回答無:417人(回答率42.9%)




### 12-3.特性\_全体（接種4回目2週間後）

年代別-接種4回目2週間後




性別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者: N=313

## 12-4.特性\_全体（接種4回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目2週間後




都道府県別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者: N=313

## 12-5.特性\_メーカー別：ファイザー社1価ワクチン（起源株）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社1価ワクチン（起源株））：N=26

## 12-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=20

## 12-7.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=42

## 12-8.特性\_メーカー別：モデルナ社1価ワクチン（起源株）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




性別（モデルナ社1価ワクチン（起源株））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社1価ワクチン（起源株））：N=163

## 12-9.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=51

## 12-10.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種4回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後



性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=9



## 12-11.特性\_メーカー別：武田（ノバボックス）（接種4回目2週間後）

年代別（武田（ノバボックス）)-接種4回目2週間後



性別（武田（ノバボックス）)-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者（武田（ノバボックス））：N=2

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
- 13. 接種5回目当日**
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目


II. 症状別

## 13-2.分析の対象（接種5回目当日）

### 接種5回目接種日アンケート

凡例：  
 自分...本人が回答  
 自分以外...家族が代理で回答  
 有効...回答日=接種日  
 無効...回答日≠接種日


■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種日当日中エントリー・回答: 133人 (内 有効回答者数:107人 無効回答者数:26人)

### 13-3.特性\_全体（接種5回目当日）

年代別-接種5回目当日




性別-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者：N=107

## 13-4.特性\_全体（接種5回目当日）

ワクチンメーカー別-接種5回目当日




都道府県別-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者:N=107

### 13-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=6

## 13-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=69

### 13-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日



性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目当日




接種5回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=15



### 13-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=16

### 13-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種5回目当日



接種5回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））:N=1

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 14-2.分析の対象（接種5回目1週間後）


### 接種5回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 107人 内 回答有:55人 回答無:52人(回答率51.4%)

### 14-3.特性\_全体（接種5回目1週間後）

年代別-接種5回目1週間後



性別-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者:N=55

## 14-4.特性\_全体（接種5回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種5回目1週間後




都道府県別-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者:N=55

## 14-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=4

## 14-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後



性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後




接種5回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=32



## 14-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=11

## 14-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=8

## 14-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種5回目1週間後



接種5回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））:N=0

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

II. 症状別

## 15-2.分析の対象（接種5回目2週間後）

### 接種5回目2週目アンケート




接種2週間後アンケート回答日


接種より2週間経過回答対象者: 106人 内 回答有:54人 回答無:52人(回答率50.9%)

### 15-3.特性\_全体（接種5回目2週間後）

年代別-接種5回目2週間後




性別-接種5回目2週間後




接種5回目2週間後アンケート回答者: N=54

## 15-4.特性\_全体（接種5回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種5回目2週間後




都道府県別-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者: N=54

## 15-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後



性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後




接種5回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=4




## 15-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=32

## 15-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種5回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=10

## 15-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種5回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=8

## 15-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種5回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種5回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種5回目2週間後



接種5回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=0

■ 調査概要

■ 調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
- 16. 接種6回目当日**
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目


II. 症状別

## 16-2.分析の対象（接種6回目当日）

### 接種6回目接種日アンケート

凡例：  
 自分...本人が回答  
 自分以外...家族が代理で回答  
 有効...回答日=接種日  
 無効...回答日≠接種日

■ 自分以外/無効 ■ 自分/無効 ■ 自分以外/有効 ■ 自分/有効




接種当日アンケート回答日

接種日当日中エントリー・回答: 14人 (内 有効回答者数:14人 無効回答者数:0人)

### 16-3.特性\_全体（接種6回目当日）

年代別-接種6回目当日




性別-接種6回目当日




接種6回目当日アンケート回答者:N=14

## 16-4.特性\_全体（接種6回目当日）

ワクチンメーカー別-接種6回目当日



都道府県別-接種6回目当日




接種6回目当日アンケート回答者:N=14



## 16-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目当日



接種6回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 16-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目当日）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目当日




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目当日



接種6回目当日アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=3

## 16-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目当日



接種6回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 16-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目当日）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目当日




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目当日



接種6回目当日アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=11

## 16-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種6回目当日）

年代別(武田(ノババックス))-接種6回目当日



性別(武田(ノババックス))-接種6回目当日



接種6回目当日アンケート回答者(武田(ノババックス)):N=0

### ■ 調査概要

### ■ 調査結果


#### I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

#### II. 症状別

## 17-2.分析の対象（接種6回目1週間後）

### 接種6回目1週目アンケート




接種1週間後アンケート回答日

接種より1週間経過回答対象者: 12人 内 回答有:6人 回答無:6人(回答率50%)

### 17-3.特性\_全体（接種6回目1週間後）

年代別-接種6回目1週間後



性別-接種6回目1週間後




接種6回目1週間後アンケート回答者:N=6





## 17-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目1週間後



接種6回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 17-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目1週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目1週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目1週間後



接種6回目1週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=0

## 17-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目1週間後



接種6回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 17-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目1週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目1週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目1週間後



接種6回目1週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=6

## 17-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種6回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種6回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種6回目1週間後



接種6回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=0

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目

II. 症状別

## 18-2.分析の対象（接種6回目2週間後）

### 接種6回目2週目アンケート




接種2週間後アンケート回答日

接種より2週間経過回答対象者: 11人 内 回答有:6人 回答無:5人(回答率54.5%)



### 18-3.特性\_全体（接種6回目2週間後）

年代別-接種6回目2週間後



性別-接種6回目2週間後




接種6回目2週間後アンケート回答者:N=6



## 18-5.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目2週間後



接種6回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 18-6.特性\_メーカー別：ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目2週間後）

年代別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目2週間後




性別（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目2週間後



接種6回目2週間後アンケート回答者（ファイザー社2価ワクチン（BA.4-5））：N=0

## 18-7.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.1）（接種6回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））-接種6回目2週間後



接種6回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.1））：N=0

## 18-8.特性\_メーカー別：モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5）（接種6回目2週間後）

年代別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目2週間後




性別（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））-接種6回目2週間後



接種6回目2週間後アンケート回答者（モデルナ社2価ワクチン（BA.4-5））：N=6

## 18-9.特性\_メーカー別：武田（ノババックス）（接種6回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種6回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種6回目2週間後



接種6回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=0