

1回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月~4歳) | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5~11 | 2.2 | 0 | - | - | - | - |
| 12~14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15~19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20~24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25~29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30~34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35~39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 40~44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 45~49 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 50~54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 55~59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 60~64 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 65~69 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 70~74 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 75~79 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 80~ | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 総数 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

1回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月~4歳) | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5~11 | 2.2 | 0 | - | - | - | - |
| 12~14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15~19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20~24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25~29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30~34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35~39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 40~44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 45~49 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 50~54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 55~59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 60~64 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 65~69 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 70~74 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 75~79 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 80~ | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 総数 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月~4歳) | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5~11 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12~14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15~19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20~24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25~29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30~34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35~39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 40~44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 45~49 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 50~54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 55~59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 60~64 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 65~69 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 70~74 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 75~79 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 80~ | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月~4歳) | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------------|----|-------------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5~11 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12~14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15~19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20~24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25~29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30~34 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 35~39 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 40~44 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 45~49 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 50~54 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 55~59 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 60~64 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 65~69 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 70~74 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 75~79 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 80~ | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|-----|---------------------|----|-----------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 10.6 | 2.7 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 |
| 25～29 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0.9 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 小児用 (5~11歳) のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月~4歳) | |
|-----------|-----------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5~11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12~14 | - | - | - | - | - | - |
| 15~19 | - | - | - | - | - | - |
| 20~24 | - | - | - | - | - | - |
| 25~29 | - | - | - | - | - | - |
| 30~34 | - | - | - | - | - | - |
| 35~39 | - | - | - | - | - | - |
| 40~44 | - | - | - | - | - | - |
| 45~49 | - | - | - | - | - | - |
| 50~54 | - | - | - | - | - | - |
| 55~59 | - | - | - | - | - | - |
| 60~64 | - | - | - | - | - | - |
| 65~69 | - | - | - | - | - | - |
| 70~74 | - | - | - | - | - | - |
| 75~79 | - | - | - | - | - | - |
| 80~ | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|------|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 69.0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 3.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|-----|---------------------|----|-----------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 5.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 小児用 (5～11歳) | | ファイザー社 小児用 (5～11歳) のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳) | |
|-----------|-----------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5～11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12～14 | - | - | - | - | - | - |
| 15～19 | - | - | - | - | - | - |
| 20～24 | - | - | - | - | - | - |
| 25～29 | - | - | - | - | - | - |
| 30～34 | - | - | - | - | - | - |
| 35～39 | - | - | - | - | - | - |
| 40～44 | - | - | - | - | - | - |
| 45～49 | - | - | - | - | - | - |
| 50～54 | - | - | - | - | - | - |
| 55～59 | - | - | - | - | - | - |
| 60～64 | - | - | - | - | - | - |
| 65～69 | - | - | - | - | - | - |
| 70～74 | - | - | - | - | - | - |
| 75～79 | - | - | - | - | - | - |
| 80～ | - | - | - | - | - | - |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|-----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4 回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 小児用 (5~11歳) のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|-----|---------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|----|--------------------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5~11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12~14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15~19 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | - | - | - | - |
| 20~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25~29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 30~34 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | - | - | - | - |
| 35~39 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | - | - | - | - |
| 40~44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 45~49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 50~54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 55~59 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | - |
| 60~64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 65~69 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 70~74 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 75~79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 80~ | 0.7 | 0.2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 総数 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|-----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 小児用(5~11歳) | | ファイザー社 小児用(5~11歳) のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|-----|---------------------|----|-----------------------|-----|----------------------|----|-------------------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5~11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12~14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 20~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25~29 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 30~34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 35~39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 40~44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 45~49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 50~54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 55~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 60~64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 65~69 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 70~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 75~79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 80~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 総数 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 小児用 (5~11歳) | | ファイザー社 小児用 (5~11歳) のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|----|---------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|--------------------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5~11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12~14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 20~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25~29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 30~34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 35~39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 40~44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 45~49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 50~54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 55~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 60~64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 65~69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 70~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 75~79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 80~ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | - | - | - | - |
| 総数 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | | ファイザー社 小児用(5~11歳) | | ファイザー社 小児用(5~11歳) のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|----|---------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|-------------------------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0~4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5~11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12~14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 20~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25~29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 30~34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 35~39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 40~44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 45~49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 50~54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 55~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 60~64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 65~69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 70~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 75~79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 80~ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - |
| 総数 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|----|---------------------|----|-----------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | ファイザー社 のうち【BA.1】 | | ファイザー社 のうち【BA.4-5】 | |
|-----------|--------|----|---------------------|----|-----------------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | モデルナ社 | | モデルナ社 のうち【BA.1】 | | モデルナ社 のうち【BA.4-5】 | | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-------|----|--------------------|----|----------------------|----|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5～11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

7回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - |
| 5～11 | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 |

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | 武田社 (ノババックス) | |
|-----------|-----------------|----|
| | 男性 | 女性 |
| 0～4 | - | - |
| 5～11 | - | - |
| 12～14 | 0 | 0 |
| 15～19 | 0 | 0 |
| 20～24 | 0 | 0 |
| 25～29 | 0 | 0 |
| 30～34 | 0 | 0 |
| 35～39 | 0 | 0 |
| 40～44 | 0 | 0 |
| 45～49 | 0 | 0 |
| 50～54 | 0 | 0 |
| 55～59 | 0 | 0 |
| 60～64 | 0 | 0 |
| 65～69 | 0 | 0 |
| 70～74 | 0 | 0 |
| 75～79 | 0 | 0 |
| 80～ | 0 | 0 |
| 総数 | 0 | 0 |

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。