

■ 調査概要

■ 調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目
13. 接種5回目当日
14. 接種5回目1週目
15. 接種5回目2週目
16. 接種6回目当日
17. 接種6回目1週目
18. 接種6回目2週目
19. 接種7回目当日
20. 接種7回目1週目
21. 接種7回目2週目
22. 接種回数不明当日
23. 接種回数不明1週目
24. 接種回数不明2週目

II. 症状別


25-2.症状_性別（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


25-3.症状_性別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


25-4.症状_性別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 男性:7 女性:8 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 男性:8 女性:6 その他:0


25-5.症状_性別（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=411 男性:237 女性:174 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=386 男性:220 女性:166 その他:0


25-6.症状_性別（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=125 男性:80 女性:44 その他:1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=129 男性:84 女性:44 その他:1


25-7.症状_性別（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=218 男性:157 女性:61 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=212 男性:154 女性:58 その他:0

25-8.症状_性別（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-9.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-10.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-11.症状_性別：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-12.症状_性別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-13.症状_性別：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-14.症状_性別：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-15.症状_性別：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-16.症状_性別：10代（12～19歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-17.症状_性別：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-18.症状_性別：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-19.症状_性別：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=9 男性:5 女性:4 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=7 男性:5 女性:2 その他:0

25-20.症状_性別：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-21.症状_性別：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-22.症状_性別：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-23.症状_性別：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-24.症状_性別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


25-25.症状_性別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


25-26.症状_性別：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=22 男性:18 女性:4 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=20 男性:17 女性:3 その他:0

25-27.症状_性別：20代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-28.症状_性別：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0

25-29.症状_性別：20代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-30.症状_性別：30代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-31.症状_性別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0

25-32.症状_性別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-33.症状_性別：30代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=60 男性:31 女性:29 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=59 男性:30 女性:29 その他:0


25-34.症状_性別：30代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=6 男性:2 女性:3 その他:1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 男性:3 女性:3 その他:1


25-35.症状_性別：30代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:0 女性:5 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=4 男性:0 女性:4 その他:0

25-36.症状_性別：30代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-37.症状_性別：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-38.症状_性別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:0 女性:1 その他:0


25-39.症状_性別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:2 女性:2 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=5 男性:3 女性:2 その他:0


25-40.症状_性別：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=110 男性:62 女性:48 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=107 男性:60 女性:47 その他:0


25-41.症状_性別：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 男性:4 女性:9 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 男性:4 女性:10 その他:0


25-42.症状_性別：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 男性:17 女性:12 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=30 男性:17 女性:13 その他:0

25-43.症状_性別：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-44.症状_性別：50代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-45.症状_性別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


25-46.症状_性別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:1 女性:1 その他:0


25-47.症状_性別：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=184 男性:104 女性:80 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=166 男性:89 女性:77 その他:0


25-48.症状_性別：50代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 男性:16 女性:13 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=31 男性:17 女性:14 その他:0


25-49.症状_性別：50代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=49 男性:30 女性:19 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=54 男性:34 女性:20 その他:0

25-50.症状_性別：50代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-51.症状_性別：60代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


25-52.症状_性別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 男性:1 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-53.症状_性別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-54.症状_性別：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 男性:16 女性:9 その他:0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 男性:19 女性:8 その他:0


25-55.症状_性別：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=72 男性:54 女性:18 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=71 男性:55 女性:16 その他:0


25-56.症状_性別：60代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=81 男性:63 女性:18 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=80 男性:65 女性:15 その他:0

25-57.症状_性別：60代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-58.症状_性別：70代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-59.症状_性別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-60.症状_性別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-61.症状_性別：70代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-62.症状_性別：70代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 男性:4 女性:1 その他:0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=6 男性:5 女性:1 その他:0


25-63.症状_性別：70代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=46 男性:41 女性:5 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=37 男性:32 女性:5 その他:0

25-64.症状_性別：70代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-65.症状_性別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-66.症状_性別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 男性:0 女性:0 その他:0

25-67.症状_性別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-68.症状_性別：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-69.症状_性別：80代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-70.症状_性別：80代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 男性:3 女性:1 その他:0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=2 男性:2 女性:0 その他:0

25-71.症状_性別：80代（接種不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-72.症状_メーカー別①（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-73.症状_メーカー別②（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-74.症状_メーカー別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2


25-75.症状_メーカー別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):2


25-76.症状_メーカー別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):1


25-77.症状_メーカー別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=15 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):10 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):1


25-78.症状_メーカー別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=411 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 232 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 163 武田(ノババックス): 16


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=386 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 224 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 145 武田(ノババックス): 17


25-79.症状_メーカー別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=411 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 232 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 163 武田(ノババックス): 16


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=386 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5): 224 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5): 145 武田(ノババックス): 17


25-80.症状_メーカー別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=125 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):62 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=129 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):66 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1


25-81.症状_メーカー別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=125 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):62 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=129 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):66 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):62 武田(ノババックス):1


25-82.症状_メーカー別①（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=218 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):109 武田(ノババックス):1


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=212 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):103 武田(ノババックス):1


25-83.症状_メーカー別②（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=218 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):109 武田(ノババックス):1


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=212 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):108 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):103 武田(ノババックス):1


25-84.症状_メーカー別①（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-85.症状_メーカー別②（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-86.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	100%(2人)	50%(1人)	0%(0人)	100%(2人)	50%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-87.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)	50%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-88.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0% (0人)	50% (1人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)	0% (0人)

25-89.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-90.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	33.3%(1人)	66.7%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	66.7%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	100%(2人)	50%(1人)	0%(0人)	100%(2人)	100%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-91.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-92.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-93.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)	100%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-94.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	51	21.6%(11人)	45.1%(23人)	0%(0人)	64.7%(33人)	31.4%(16人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	84	19%(16人)	33.3%(28人)	0%(0人)	42.9%(36人)	20.2%(17人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	16%(4人)	40%(10人)	0%(0人)	56%(14人)	32%(8人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	25%(3人)	58.3%(7人)	16.7%(2人)	66.7%(8人)	50%(6人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	33.3%(1人)	33.3%(1人)	0%(0人)	66.7%(2人)	33.3%(1人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	8	12.5%(1人)	50%(4人)	0%(0人)	25%(2人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	45.5%(10人)	50%(11人)	0%(0人)	63.6%(14人)	50%(11人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	27	37%(10人)	40.7%(11人)	3.7%(1人)	51.9%(14人)	40.7%(11人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	44	47.7%(21人)	45.5%(20人)	0%(0人)	65.9%(29人)	34.1%(15人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	36.8%(7人)	52.6%(10人)	0%(0人)	73.7%(14人)	36.8%(7人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	69.2%(9人)	46.2%(6人)	0%(0人)	76.9%(10人)	38.5%(5人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	33.3%(1人)	0%(0人)	33.3%(1人)	33.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	100%(1人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-95.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	51	9.8%(5人)	33.3%(17人)	0%(0人)	5.9%(3人)	9.8%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	84	6%(5人)	15.5%(13人)	1.2%(1人)	7.1%(6人)	3.6%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	12%(3人)	0%(0人)	12%(3人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	33.3%(4人)	41.7%(5人)	0%(0人)	8.3%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	66.7%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	8	0%(0人)	12.5%(1人)	0%(0人)	25%(2人)	12.5%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	4.5%(1人)	22.7%(5人)	0%(0人)	9.1%(2人)	9.1%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	27	0%(0人)	22.2%(6人)	0%(0人)	11.1%(3人)	3.7%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	44	2.3%(1人)	31.8%(14人)	0%(0人)	2.3%(1人)	6.8%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	5.3%(1人)	31.6%(6人)	5.3%(1人)	5.3%(1人)	5.3%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	38.5%(5人)	0%(0人)	7.7%(1人)	23.1%(3人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)

25-96.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	51	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	9.8%(5人)	9.8%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	84	0%(0人)	2.4%(2人)	0%(0人)	6%(5人)	9.5%(8人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	0%(0人)	4%(1人)	12%(3人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	0%(0人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)	8.3%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	8	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.5%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	27	0%(0人)	0%(0人)	7.4%(2人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	44	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.5%(2人)	11.4%(5人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	10.5%(2人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	7.7%(1人)	7.7%(1人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-97.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種5回目）

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	51	0%(0人)	2%(1人)	2%(1人)	3.9%(2人)	5.9%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	84	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	10.7%(9人)	2.4%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	25	4%(1人)	4%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	4%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12	8.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	8.3%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	8	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	12.5%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	27	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(3人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	44	2.3%(1人)	2.3%(1人)	0%(0人)	2.3%(1人)	2.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	19	0%(0人)	5.3%(1人)	0%(0人)	15.8%(3人)	5.3%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	13	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	7.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-98.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	22.2%(2人)	11.1%(1人)	0%(0人)	33.3%(3人)	22.2%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	22.7%(5人)	45.5%(10人)	0%(0人)	22.7%(5人)	31.8%(7人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	33.3%(1人)	33.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	44.4%(4人)	33.3%(3人)	0%(0人)	55.6%(5人)	44.4%(4人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	16.7%(1人)	0%(0人)	50%(3人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	66.7%(4人)	50%(3人)	0%(0人)	83.3%(5人)	83.3%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	15	40%(6人)	33.3%(5人)	0%(0人)	46.7%(7人)	26.7%(4人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	33.3%(2人)	0%(0人)	83.3%(5人)	33.3%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	23.5%(4人)	47.1%(8人)	0%(0人)	58.8%(10人)	17.6%(3人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	42.9%(3人)	0%(0人)	42.9%(3人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-99.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	18.2%(4人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	22.2%(2人)	44.4%(4人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	33.3%(2人)	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	16.7%(1人)	66.7%(4人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	15	6.7%(1人)	26.7%(4人)	0%(0人)	6.7%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	33.3%(2人)	66.7%(4人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	17.6%(3人)	0%(0人)	17.6%(3人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-100.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	15	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)	16.7%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	5.9%(1人)	0%(0人)	17.6%(3人)	5.9%(1人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-101.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種6回目）

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	11.1%(1人)	11.1%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	22	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)	11.1%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	16.7%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	15	0%(0人)	6.7%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6	0%(0人)	16.7%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	17	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	5.9%(1人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-102.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	39.1%(9人)	0%(0人)	26.1%(6人)	26.1%(6人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	34.8%(8人)	0%(0人)	21.7%(5人)	13%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	14.3%(4人)	46.4%(13人)	0%(0人)	35.7%(10人)	10.7%(3人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	57.1%(4人)	57.1%(4人)	0%(0人)	57.1%(4人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	71.4%(5人)	0%(0人)	28.6%(2人)	28.6%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	42.9%(3人)	0%(0人)	42.9%(3人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	37.1%(23人)	48.4%(30人)	0%(0人)	41.9%(26人)	25.8%(16人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	100%(1人)	100%(1人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	50%(1人)	100%(2人)	0%(0人)	50%(1人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-103.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	8.7%(2人)	8.7%(2人)	0%(0人)	13%(3人)	13%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	8.7%(2人)	0%(0人)	8.7%(2人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	17.9%(5人)	0%(0人)	7.1%(2人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	28.6%(2人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	14.3%(1人)	14.3%(1人)	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	8.1%(5人)	29%(18人)	0%(0人)	6.5%(4人)	3.2%(2人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	50%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-104.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種7回目）

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	13%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	4.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	8.7%(2人)	8.7%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	3.6%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	7.1%(2人)	7.1%(2人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	0%(0人)	0%(0人)	1.6%(1人)	4.8%(3人)	8.1%(5人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	50%(1人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-105.症状_メーカーの組み合わせ別②（接種7回目）

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	4.3%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	23	0%(0人)	4.3%(1人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	28	0%(0人)	3.6%(1人)	0%(0人)	10.7%(3人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	14.3%(1人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	62	0%(0人)	1.6%(1人)	0%(0人)	8.1%(5人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-106.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-107.症状_メーカーの組み合わせ別② (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日～7日目まで)

前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-108.症状_メーカーの組み合わせ別①（接種回数不明）

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）

前回	今回	接種人数	37.5℃以上の発熱	注射部位の腫れ	じんましん	けん怠感	頭痛
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)


25-109.症状_メーカーの組み合わせ別② (接種回数不明)

接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


前回	今回	接種人数	リンパ節の腫れ	関節の痛み	おう吐	下痢	胸の痛み
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-110.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-111.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月～4歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-112.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-113.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-114.症状_メーカー別①：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-115.症状_メーカー別②：乳幼児（6ヶ月~4歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-116.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-117.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0

25-118.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-119.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-120.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-121.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-122.症状_メーカー別①：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-123.症状_メーカー別②：小児（5~11歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-124.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-125.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-126.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-127.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-128.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-129.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-130.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-131.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=9 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):5 武田(ノババックス):0


25-132.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-133.症状_メーカー別② : 10代 (12~19歳) (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-134.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-135.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-136.症状_メーカー別①：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-137.症状_メーカー別②：10代（12～19歳）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-138.症状_メーカー別①：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-139.症状_メーカー別②：20代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-140.症状_メーカー別① : 20代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-141.症状_メーカー別②：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-142.症状_メーカー別① : 20代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


25-143.症状_メーカー別② : 20代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


25-144.症状_メーカー別①：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=22 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):14 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=20 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


25-145.症状_メーカー別②：20代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体: N=22 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):14 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=20 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


25-146.症状_メーカー別① : 20代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-147.症状_メーカー別② : 20代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-148.症状_メーカー別①：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-149.症状_メーカー別②：20代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

25-150.症状_メーカー別① : 20代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-151.症状_メーカー別② : 20代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-152.症状_メーカー別① : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-153.症状_メーカー別② : 30代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-154.症状_メーカー別① : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1


接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1

25-155.症状_メーカー別② : 30代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-156.症状_メーカー別① : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-157.症状_メーカー別② : 30代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-158.症状_メーカー別①：30代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=60 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):28 武田(ノババックス):4


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=59 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):29 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):27 武田(ノババックス):3


25-159.症状_メーカー別② : 30代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=60 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):28 武田(ノババックス):4


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=59 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):29 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):27 武田(ノババックス):3


25-160.症状_メーカー別①：30代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


25-161.症状_メーカー別②：30代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=7 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


25-162.症状_メーカー別① : 30代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


25-163.症状_メーカー別②：30代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):3 武田(ノババックス):0


25-164.症状_メーカー別① : 30代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-165.症状_メーカー別② : 30代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-166.症状_メーカー別①：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-167.症状_メーカー別②：40代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-168.症状_メーカー別①：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-169.症状_メーカー別②：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-170.症状_メーカー別①：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


25-171.症状_メーカー別②：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):3 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):4 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


25-172.症状_メーカー別①：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=110 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):68 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):3


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=107 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):72 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):32 武田(ノババックス):3


25-173.症状_メーカー別②：40代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体：N=110 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：68 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：39 武田(ノババックス)：3


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体：N=107 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)：72 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)：32 武田(ノババックス)：3


25-174.症状_メーカー別①：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):5 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):6 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


25-175.症状_メーカー別②：40代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=13 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):5 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=14 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):6 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):8 武田(ノババックス):0


25-176.症状_メーカー別①：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):12 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=30 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0


25-177.症状_メーカー別②：40代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):12 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=30 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0


25-178.症状_メーカー別①：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-179.症状_メーカー別②：40代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-180.症状_メーカー別① : 50代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



25-181.症状_メーカー別② : 50代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-182.症状_メーカー別① : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-183.症状_メーカー別② : 50代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-184.症状_メーカー別① : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-185.症状_メーカー別② : 50代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0


25-186.症状_メーカー別①：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=184 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):106 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):70 武田(ノババックス):8


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=166 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):97 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):59 武田(ノババックス):10


25-187.症状_メーカー別②：50代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=184 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):106 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):70 武田(ノババックス):8


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=166 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):97 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):59 武田(ノババックス):10


25-188.症状_メーカー別① : 50代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):12 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=31 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):18 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0


25-189.症状_メーカー別② : 50代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体: N=29 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):12 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体: N=31 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):18 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):0


25-190.症状_メーカー別① : 50代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):23 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=54 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1


25-191.症状_メーカー別② : 50代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=49 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):23 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=54 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):28 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):25 武田(ノババックス):1


25-192.症状_メーカー別① : 50代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-193.症状_メーカー別② : 50代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-194.症状_メーカー別①：60代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



25-195.症状_メーカー別② : 60代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):1 武田(ノババックス):0

接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)


■ 全体 ■ ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5) ■ モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)
■ 武田(ノババックス)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-196.症状_メーカー別① : 60代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-197.症状_メーカー別② : 60代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-198.症状_メーカー別① : 60代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1


25-199.症状_メーカー別② : 60代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):1


25-200.症状_メーカー別①：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):11 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):14 武田(ノババックス):1


25-201.症状_メーカー別②：60代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=25 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):11 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):13 武田(ノババックス):1


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=27 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):12 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):14 武田(ノババックス):1


25-202.症状_メーカー別①：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=72 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):35 武田(ノババックス):1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=71 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):34 武田(ノババックス):1


25-203.症状_メーカー別②：60代（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=72 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):35 武田(ノババックス):1


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=71 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):36 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):34 武田(ノババックス):1


25-204.症状_メーカー別①：60代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=81 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):40 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=80 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):0


25-205.症状_メーカー別②：60代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=81 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):40 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=80 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):41 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):39 武田(ノババックス):0


25-206.症状_メーカー別① : 60代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-207.症状_メーカー別②：60代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-208.症状_メーカー別① : 70代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-209.症状_メーカー別② : 70代 (接種1・2回目)

接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-210.症状_メーカー別① : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-211.症状_メーカー別② : 70代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-212.症状_メーカー別① : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-213.症状_メーカー別② : 70代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-214.症状_メーカー別① : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-215.症状_メーカー別② : 70代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-216.症状_メーカー別① : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


25-217.症状_メーカー別② : 70代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=5 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=6 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):2 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


25-218.症状_メーカー別① : 70代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=46 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):22 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):24 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=37 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):20 武田(ノババックス):0


25-219.症状_メーカー別② : 70代 (接種7回目)

接種7回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=46 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):22 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):24 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=37 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):17 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):20 武田(ノババックス):0


25-220.症状_メーカー別① : 70代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-221.症状_メーカー別② : 70代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-222.症状_メーカー別①：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-223.症状_メーカー別② : 80代 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-224.症状_メーカー別① : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-225.症状_メーカー別② : 80代 (接種3回目)

接種3回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種3回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-226.症状_メーカー別①：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




25-227.症状_メーカー別② : 80代 (接種4回目)

接種4回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)




接種4回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




25-228.症状_メーカー別①：80代（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-229.症状_メーカー別② : 80代 (接種5回目)

接種5回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=1 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):1 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種5回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-230.症状_メーカー別① : 80代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-231.症状_メーカー別② : 80代 (接種6回目)

接種6回目1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種6回目2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


25-232.症状_メーカー別①：80代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0


25-233.症状_メーカー別②：80代（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体:N=4 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):4 武田(ノババックス):0


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体:N=2 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):2 武田(ノババックス):0


25-234.症状_メーカー別① : 80代 (接種回数不明)

接種回数不明1週間後 (接種日 ~ 7日目まで)



全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0


接種回数不明2週間後 (8日目 ~ 14日目まで)




全体:N=0 ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5):0 モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5):0 武田(ノババックス):0

25-235.症状_メーカー別②：80代（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）




接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




25-236.症状別：発症日①（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

25-237.症状別：発症日①（接種3回目）


接種3回目



接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=4

25-238.症状別：発症日①（接種4回目）


接種4回目



接種4回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=12

25-239.症状別：発症日①（接種5回目）


接種5回目



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=327

25-240.症状別：発症日①（接種6回目）


接種6回目



接種6回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=101

25-241.症状別：発症日①（接種7回目）


接種7回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

25-242.症状別：発症日①（接種回数不明）


接種回数不明




接種回数不明アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=0

25-243.症状別：発症日②（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

25-244.症状別：発症日②（接種3回目）


接種3回目



接種3回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=4

25-245.症状別：発症日②（接種4回目）


接種4回目



接種4回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=12

25-246.症状別：発症日②（接種5回目）


接種5回目



接種5回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=327

25-247.症状別：発症日②（接種6回目）


接種6回目



接種6回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=101

25-248.症状別：発症日②（接種7回目）


接種7回目



接種7回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=164

25-249.症状別：発症日②（接種回数不明）


接種回数不明



接種回数不明アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=0


25-250.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0


25-251.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4


25-252.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者: N=15


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者: N=14


25-253.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386


25-254.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129


25-255.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212


25-256.症状別：最も高い熱（37.5℃以上の発熱をした方のみ）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



接種回数不明1週間後アンケート回答者：N=0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）




接種回数不明2週間後アンケート回答者：N=0

25-257.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-258.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種3回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-259.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種4回目）




接種4回目アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=12

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-260.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種5回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-261.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種6回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-262.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種7回目）




* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-263.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種回数不明）

接種回数不明




接種回数不明アンケート回答者(1週目および2週目回答者):N=0

* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-264.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0


25-265.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4


25-266.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者:N=15


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者:N=14


25-267.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386


25-268.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129


25-269.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218


接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212


25-270.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



接種回数不明1週間後アンケート回答者:N=0


接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



接種回数不明2週間後アンケート回答者:N=0

25-271.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目1週間後アンケート回答者:N=2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者:N=0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者:N=2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者:N=0


25-272.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4

25-273.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者:N=15


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者:N=14


25-274.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386


25-275.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

25-276.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212


25-277.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



接種回数不明1週間後アンケート回答者: N=0

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



接種回数不明2週間後アンケート回答者: N=0


25-278.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目1週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種2回目1週間後アンケート回答者：N=0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0


25-279.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=5


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4

25-280.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者:N=15


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者:N=14


25-281.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411


接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386


25-282.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125


接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

25-283.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212

25-284.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）



接種回数不明1週間後アンケート回答者:N=0

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）



接種回数不明2週間後アンケート回答者:N=0

25-285.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）

該当者なし

該当者なし

接種1回目1週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目1週間後アンケート回答者：N=0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）

該当者なし

該当者なし

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-286.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）

該当者なし

接種3回目1週間後アンケート回答者：N=5

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

該当者なし

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-287.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）

該当者なし

接種4回目1週間後アンケート回答者：N=15

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）


該当者なし

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=14

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-288.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種5回目）

接種5回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411

接種5回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


25-289.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種6回目）

接種6回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125

接種6回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-290.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種7回目）

接種7回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218

接種7回目2週間後（8日目～14日目まで）

該当者なし

接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-291.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種回数不明）

接種回数不明1週間後（接種日～7日目まで）

該当者なし

接種回数不明1週間後アンケート回答者:N=0

接種回数不明2週間後（8日目～14日目まで）


該当者なし

接種回数不明2週間後アンケート回答者:N=0

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

25-292.症状別：受診状況（接種1・2回目）

接種1回目



接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	0人	0.0%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	2人	100.0%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2


接種2回目

該当者なし

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0

25-293.症状別：受診状況（接種3回目）

接種3回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	0人	0.0%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	4人	100.0%

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=4

25-294.症状別：受診状況（接種4回目）

接種4回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	0人	0.0%
13日目	1人	7.1%
14日目	0人	0.0%
未受診	13人	92.9%

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=14

25-295.症状別：受診状況（接種5回目）

接種5回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	1人	0.3%
9日目	1人	0.3%
10日目	1人	0.3%
11日目	1人	0.3%
12日目	1人	0.3%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	381人	98.7%

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386

25-296.症状別：受診状況（接種6回目）

接種6回目




接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	1人	0.8%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	1人	0.8%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	1人	0.8%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	126人	97.7%

接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

25-297.症状別：受診状況（接種7回目）

接種7回目



接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	1人	0.5%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	1人	0.5%
12日目	1人	0.5%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	209人	98.6%

接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212

25-298.症状別：受診状況（接種回数不明）

接種回数不明

該当者なし

接種回数不明2週間後アンケート回答者：N=0

25-299.症状別：診断結果（接種1回目）

診断結果

未受診	2人
-----	----

25-300.症状別：診断結果（接種2回目）

診断結果

未受診	0人
-----	----

25-301.症状別：診断結果（接種3回目）

診断結果

未受診	4人
-----	----

25-302.症状別：診断結果（接種4回目）

診断結果

インフルエンザA	1人
未受診	13人

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=14

25-303.症状別：診断結果（接種5回目）

診断結果

急性喉頭炎	1人
感染性胃腸炎	1人
胃腸炎	1人
インフルエンザ	1人
アレルギー性鼻炎	1人
未受診	381人

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386

25-304.症状別：診断結果（接種6回目）

診断結果

風邪	1人
带状疱疹	1人
新型コロナウイルス	1人
未受診	126人

25-305.症状別：診断結果（接種7回目）

診断結果

腱鞘炎	1人
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染症	1人
かぜ	1人
未受診	209人

25-306.症状別：診断結果（接種回数不明）

診断結果

未受診	0人
-----	----

接種回数不明2週間後アンケート回答者：N=0

25-307.症状別：入院日（接種1・2回目）

接種1回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=2

接種2回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	
接種翌日	0	
3日目	0	
4日目	0	
5日目	0	
6日目	0	
7日目	0	
8日目	0	
9日目	0	
10日目	0	
11日目	0	
12日目	0	
13日目	0	
14日目	0	

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=0

25-308.症状別：入院日（接種3回目）

接種3回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種3回目2週間後アンケート回答者:N=4

25-309.症状別：入院日（接種4回目）

接種4回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=14

25-310.症状別：入院日（接種5回目）

接種5回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種5回目2週間後アンケート回答者:N=386

25-311.症状別：入院日（接種6回目）

接種6回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

25-312.症状別：入院日（接種7回目）

接種7回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212

25-313.症状別：入院日（接種回数不明）

接種回数不明

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種回数不明2週間後アンケート回答者:N=0

25-314.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）

前回	今回	接種人数	楽だった	変わらない	つらかった
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
アストラゼネカ	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	2人	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-315.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）

前回	今回	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	2人	50%(1人)	0%(0人)	50%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3人	0%(0人)	0%(0人)	100%(3人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	2人	0%(0人)	100%(2人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-316.症状別：5回目の体調（4回目に比べて）

前回	今回	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	4人	75%(3人)	0%(0人)	25%(1人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	66人	31.8%(21人)	16.7%(11人)	51.5%(34人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	96人	43.8%(42人)	9.4%(9人)	46.9%(45人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	32人	53.1%(17人)	6.3%(2人)	40.6%(13人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	12人	25%(3人)	16.7%(2人)	58.3%(7人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	3人	0%(0人)	33.3%(1人)	66.7%(2人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10人	20%(2人)	10%(1人)	70%(7人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	100%(1人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	23人	13%(3人)	56.5%(13人)	30.4%(7人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	32人	18.8%(6人)	31.3%(10人)	50%(16人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	52人	23.1%(12人)	25%(13人)	51.9%(27人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	21人	19%(4人)	14.3%(3人)	66.7%(14人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	14人	0%(0人)	35.7%(5人)	64.3%(9人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	4人	100%(4人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	4人	75%(3人)	0%(0人)	25%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	2人	100%(2人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	4人	50%(2人)	0%(0人)	50%(2人)
その他	武田(ノババックス)	1人	100%(1人)	0%(0人)	0%(0人)

25-317.症状別：6回目の体調（5回目に比べて）

前回	今回	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10人	10%(1人)	10%(1人)	80%(8人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	33人	45.5%(15人)	3%(1人)	51.5%(17人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	4人	50%(2人)	0%(0人)	50%(2人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	9人	44.4%(4人)	22.2%(2人)	33.3%(3人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	10人	40%(4人)	20%(2人)	40%(4人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	8人	25%(2人)	50%(4人)	25%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	21人	14.3%(3人)	33.3%(7人)	52.4%(11人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	6人	16.7%(1人)	0%(0人)	83.3%(5人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	20人	20%(4人)	15%(3人)	65%(13人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	7人	0%(0人)	28.6%(2人)	71.4%(5人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-318.症状別：7回目の体調（6回目に比べて）


前回	今回	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	29人	13.8%(4人)	3.4%(1人)	82.8%(24人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	34人	32.4%(11人)	2.9%(1人)	64.7%(22人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	40人	45%(18人)	5%(2人)	50%(20人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	4人	0%(0人)	0%(0人)	100%(4人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	8人	0%(0人)	62.5%(5人)	37.5%(3人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	11人	9.1%(1人)	27.3%(3人)	63.6%(7人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	8人	12.5%(1人)	12.5%(1人)	75%(6人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	70人	10%(7人)	17.1%(12人)	72.9%(51人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	3人	0%(0人)	100%(3人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	3人	0%(0人)	33.3%(1人)	66.7%(2人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	1人	0%(0人)	0%(0人)	100%(1人)
その他	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-319.症状別：回数不明の体調（前回に比べて）

前回	今回	接種人数	楽だった	つらかった	変わらない
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(起源株)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
ファイザー社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.1)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社2価ワクチン(BA.4-5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
武田(ノババックス)	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)
その他	武田(ノババックス)	0人	0%(0人)	0%(0人)	0%(0人)

25-320.症状別：1回目のインフルエンザ同時接種状況


接種1回目



接種1回目当日アンケート回答者:N=6
接種1回目1週間後アンケート回答者:N=2
接種1回目2週間後アンケート回答者:N=2

25-321.症状別：2回目のインフルエンザ同時接種状況


接種2回目



接種2回目当日アンケート回答者:N=0
接種2回目1週間後アンケート回答者:N=0
接種2回目2週間後アンケート回答者:N=0

25-322.症状別：3回目のインフルエンザ同時接種状況


接種3回目



接種3回目当日アンケート回答者:N=10
接種3回目1週間後アンケート回答者:N=5
接種3回目2週間後アンケート回答者:N=4

25-323.症状別：4回目のインフルエンザ同時接種状況


接種4回目



接種4回目当日アンケート回答者: N=36
接種4回目1週間後アンケート回答者: N=15
接種4回目2週間後アンケート回答者: N=14

25-324.症状別：5回目のインフルエンザ同時接種状況

接種5回目




接種5回目当日アンケート回答者：N=906

接種5回目1週間後アンケート回答者：N=411

接種5回目2週間後アンケート回答者：N=386

25-325.症状別：6回目のインフルエンザ同時接種状況

接種6回目




接種6回目当日アンケート回答者：N=299

接種6回目1週間後アンケート回答者：N=125

接種6回目2週間後アンケート回答者：N=129

25-326.症状別：7回目のインフルエンザ同時接種状況

接種7回目




接種7回目当日アンケート回答者：N=503

接種7回目1週間後アンケート回答者：N=218

接種7回目2週間後アンケート回答者：N=212

25-327.症状別：回数不明のインフルエンザ同時接種状況

接種回数不明



接種回数不明当日アンケート回答者:N=0

接種回数不明1週間後アンケート回答者:N=0

接種回数不明2週間後アンケート回答者:N=0

令和5年度 厚生労働省委託事業
新型コロナウイルスワクチン接種後健康状況調査
第一三共社 1価ワクチン（XBB.1.5）について
中間報告（2023/09/20～2023/12/31）

第一三共社 1価ワクチン (XBB.1.5) について

- 接種日当日中エントリー・回答：4人（12/31データカット時点）
 - 接種5回目当日（内 有効回答者数：3人、無効回答者数：1人）
 - (1) 40代男性：1週間後、2週間後回答なし
 - (2) 40代男性：1週間後、2週間後回答なし
 - (3) 50代男性
 - 1週間後回答
 - 注射部位の腫れ：はい
 - 腫れた期間：接種当日～3日目
 - 最も強く腫れた日：接種翌日
 - 赤い腫れ：はい
 - 赤く晴れたサイズ：5cm～
 - 注射部位の硬化：はい
 - けんたい感：はい
 - けんたい感の期間：接種当日のみ
 - 2週間後回答
 - 症状なし
 - 接種5回目以外は回答なし