


小林製薬社製の紅麹を含む食品の事案に係る取組について (国立医薬品食品衛生研究所)

9月18日厚生労働省公表資料



原因物質に関する情報

①-2) プベルル酸以外に検出された2種類の「化合物」の特定

- 化合物Y: 単離完了→分子式 ($C_{28}H_{42}O_8$) 決定
- 化合物Z: 単離完了→分子式 ($C_{23}H_{34}O_7$) 決定

- いずれも、モナコリンKと基本骨格が類似しており、紅麹菌がモナコリンKを産生する過程で青カビの介在により生成されると推定
- いずれも、現時点でマスライブラリや文献情報には合致するものはなく、既知の天然化合物ではないと推定

② 発生機構の究明

A: 和歌山工場) 種菌培養室、乾燥室、チューブ、フィルター等
B: 和歌山工場) 培養タンクのフタ内面
C: 大阪工場) 種菌培養室等

I 混入段階の推定

- 培養ロットに化合物（プロペルル酸、化合物Y、Z）が含まれることを確認
- 原料ロットを構成する培養ロットのモナコリンK濃度により均一でないことを確認

- 培養段階での混入が推定される。

II 青カビによる直接産生能の検証

- 和歌山工場 (A) から青カビ採取 → 培養（米培地）により、プロペルル酸検出
- 和歌山工場 (B) から青カビ採取 → 培養（米培地）により、プロペルル酸検出
- 大阪工場 (C) から青カビ採取 → 培養（米培地）により、プロペルル酸検出

- 大阪工場および和歌山工場ともに青カビ (*Penicillium adametzoides*) が存在した。
- 青カビ単独でプロペルル酸を産生するが、化合物Y、Zは産生されない。

III 青カビによる間接産生能の検証

- 紅麹菌と青カビ (B) の共培養実験 → 共存可能
- モナコリンK存在下で青カビ (B) を培養し、化合物Y、Zの生成を確認


- 紅麹菌と青カビは共存することが可能。
- 化合物Y、Zは、青カビの介在によりモナコリンKが修飾された物質である。

③ 腎otoxic性（動物実験）の確認

● ラットの7日間反復投与試験

腎病理所見

- (i) プベルル酸単品
- (ii) 化合物Y単品
- (iii) 化合物Z単品



<代表的な所見例（速報）>

- (i) プベルル酸単品を投与した結果、近位尿細管の変性・壊死等の所見がみられたが、
- (ii) 化合物Y単品、(iii) 化合物Z単品を投与した結果では、腎臓の毒性所見は認められなかった。

健康被害が報告された製品に含まれる化合物の特性



判明した事実

原因究明において、以下を確認した。

- 工場内の青カビ(*Penicillium adametzioides*)が、培養段階で混入し、コメ培地を栄養源としてペベル酸を産生
 - 工場内の青カビ(*Penicillium adametzioides*)が、紅麹菌との共培養により、モナコリンKを修飾して化合物Y、Zが生成
 - ペベル酸については腎障害が確認されたが、化合物Y、Zについては腎障害は確認されなかった

今後の対応

ブルーベリーが腎障害を引き起こすことが確認されたことから、科学的な情報を引き続き収集しつつ、同一の事案の発生を防止するための食品衛生法上の措置（規格基準の策定や衛生管理措置の徹底）を検討する。