

記者発表資料

担当課：	生活衛生課
電話：	092-643-3280(内線3074)
担当：	対馬

次のとおり食中毒が発生したので発表します。

1 事件の探知

令和7年5月15日（木）、福岡市の住民から、糸島市内の飲食店を利用したところ食中毒様症状を呈し、医療機関を受診した旨、福岡市保健所に連絡があった。

同市保健所が調査したところ、複数の有症者がいることが判明したため、5月16日（金）に本県に対し、調査依頼があった。

2 概要

同市保健所が調査したところ、5月10日（土）19時頃に糸島市内の飲食店を利用した友人グループ4名中4名が、腹痛、下痢、発熱等の症状を呈していることが判明した。

当該飲食店を管轄する福岡県糸島保健福祉事務所は疫学調査及び有症者便の検査の結果から、本件を食中毒と断定した。

3 発生日時

令和7年5月13日（火）16時00分頃（初発）

4 摂食者数

4名

5 症状

腹痛、下痢、発熱等

6 有症者数

4名（20代男性）

うち1名が医療機関を受診しているが、入院はしておらず、重篤な症状は呈していない。

7 原因施設、原因食品、病因物質

（1）原因施設

屋号：〇〇〇

業種：飲食店営業（居酒屋）

営業者：〇〇〇

所在地：糸島市〇〇〇

（2）原因食品

当該施設が5月10日（土）に提供した食事

参考メニュー：鶏刺し3種盛り合わせ（レバー刺し、ずり刺し、ささみのたたき）、焼鳥串（味噌バラ、鳥皮、ねぎま、ぼんじり、ささみ、豚バラ、砂ずり、万能ねぎまき、大葉せせり）、チキン南蛮、鶏唐揚げ、エビマヨ、タコワサ、角切キヤベツ

（3）病因物質：カンピロバクター・ジェジュニ

8 検査

有症者便からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。

9 措置

営業停止処分：2日間（5月19日～20日）

10 その他

〈参考〉県下における食中毒の発生状況

(5月19日現在。調査中の事件(本件を含む。)を除く。)

区分	2025年		2024年(全体)	
	事件数	患者数	事件数	患者数
県域	6	38	18	146
北九州市	6	64	12	75
福岡市	15	212	37	278
久留米市	1	15	0	0
計	28	329	67	499

鶏肉は十分に加熱して提供しましょう

生や加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多発しています

カンピロバクター食中毒とは

- 細菌性食中毒事件発生数 **ワースト1位**
- 鶏刺し 鶏たたき 鶏わさ 焼き鳥(生焼け) 原因(疑い含む)が多数報告
- 消化器症状(腹痛・下痢など)、その後まれに **ギラン・バレー症候群** を発症することも
※ギラン・バレー症候群：手足・顔面神経の麻痺、呼吸困難等を起こす
- 食中毒事件と断定された場合、**営業禁止** 等の措置を受けることもあります

安全な鶏肉料理を提供するために知っておいてほしいこと



「新鮮だから安全」ではありません！

新鮮な鶏肉でもカンピロバクターが存在している可能性があります

食鳥処理後の鶏肉のカンピロバクター汚染率 **67.4%**
(厚生労働科学研究報告「食品製造の高度衛生管理に関する研究」)




加熱用や用途不明の鶏肉を生食用※に使用してはいけません！

※独自に生食用食鳥肉の衛生基準を定めている自治体もあります

取り扱う鶏肉が加熱用でないか、製品包装の表示や商品規格書の情報を見て確認しましょう

表示例：「加熱用」「中心部まで加熱してお召し上がりください」「生食には使用しないでください」など



鶏の唐揚げを調理した時の画像
(出典：食品安全委員会)

カンピロバクター食中毒の予防方法

- ◆ 中心部の色が変わるまで加熱しましょう！(中心部を75℃で1分間以上)
- ◆ 食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて、処理・保管しましょう！
- ◆ 食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱しましょう！
- ◆ 食肉に触れた調理器具などは使用後に消毒・殺菌をしましょう！

カンピロバクター食中毒予防について(Q&A) (厚生労働省ウェブサイト)

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html>



飲食店従事者の不正解率
なんと**40%!!**

食品衛生 テスト

0点

問：正しい方に○を付けよ

- a. 新鮮なとり肉なら生または加熱不十分で食べても安全である。
- b. 新鮮なとり肉でも、カンピロバクターが付着しているおそれが高いので、必ず加熱（中心部を75℃・1分間以上）する。

新鮮

ならば安全は間違い!!



ココ大事!
復唱して!!

**生や生焼けの
とり肉を
提供しない!!**

飲食店での
外食時
にも要注意

生・半生・加熱不足の鶏肉料理による カンピロバクター食中毒が 多発しています!!



「新鮮だから安全」ではありません!

鶏肉

市販鶏肉から、カンピロバクターが高い割合で見つかっています!

20%~100%
(※)

(※) 過去の厚生労働科学研究の結果より

カンピロバクターって?

特徴：ニワトリやウシなどの腸管内にいる細菌で、少量の菌数でも食中毒を発生。熱に弱い。


食中毒の症状（食べてから1~7日で発症）
：下痢、腹痛、発熱

対策：十分な加熱（中心が白くなるまで焼く）
サラダなど生で食べるものとは別に調理
鶏肉を調理した器具は熱湯で消毒




楽しい外食にするために

よく加熱された鶏肉料理を選んで
楽しい食事にしましょう!



鶏肉は食生活に欠かせない食材です!
おいしく安全に食べましょう。



厚生労働省ホームページ「カンピロバクター食中毒予防について (Q&A)」もご覧ください。

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html>