

麻しん（はしか）患者の発生について
（4月9日発表・第2報）

令和8年4月8日（水）、県内において今年19例目の麻しん患者の発生を確認しました。麻しん患者が周囲に感染させる可能性のある期間内に不特定多数の人と接触した可能性が否定できないため、万全を期す観点から、4月9日（木）に広く情報提供いたしました。調査の結果判明した情報について、下記のとおり第2報として公表いたします。

利用した公共交通機関等は下記のとおりです。特にワクチン未接種の人については、下記の利用時間帯から21日以内に、発熱、発疹等、麻しんを疑う症状が現れた場合には、速やかな医療機関の受診をお願いします。

医療機関を受診する際は、医療機関への事前連絡（麻しん患者と同一空間にいた時間があること等）及びマスクの着用を徹底いただくとともに、周囲の方へ感染を拡げないよう、公共交通機関等の利用を避けてください。

麻しんウイルスの空気中での生存期間は2時間以下とされています。現時点において麻しん患者が利用した施設等を利用しては心配はありません。

記

【施設・公共交通機関の利用状況】

※アンダーラインは4月10日加筆部分

利用日	利用時間帯	利用施設
4月3日（金） ～4月5日（日）	6時30分頃～6時50分頃	東武スカイツリーライン 獨協大学前駅～新越谷駅
	6時50分頃～7時30分頃	JR 武蔵野線 南越谷駅～新八柱駅
	7時30分頃～7時40分頃	京成電鉄松戸線 八柱駅～常盤平駅
	<u>7時40分頃～7時45分頃</u>	<u>ローソン松戸常盤平一丁目</u>
	<u>9時00分頃～19時00分頃</u>	<u>オートアベール緑の森 21SS</u> <u>田中燃料(株)</u>
19時30分頃～19時40分頃	京成電鉄松戸線 常盤平駅～八柱駅	

	19時40分頃～20時20分頃 20時20分頃～20時40分頃	JR 武蔵野線 新八柱駅～南越谷駅 東武スカイツリーライン 新越谷駅～獨協大学前駅
4月6日(月)	6時30分頃～6時50分頃 6時50分頃～7時30分頃 7時30分頃～7時40分頃 7時40分頃～7時45分頃 9時00分頃～17時30分頃 17時50分頃～18時00分頃 17時30分頃～17時40分頃 18時00分頃～18時40分頃 17時40分頃～18時20分頃 18時40分頃～19時00分頃 18時20分頃～18時40分頃	東武スカイツリーライン 獨協大学前駅～新越谷駅 JR 武蔵野線 南越谷駅～新八柱駅 京成電鉄松戸線 八柱駅～常盤平駅 ローソン松戸常盤平一丁目 オートアベール緑の森 21SS 田中燃料(株) 京成電鉄松戸線 常盤平駅～八柱駅 JR 武蔵野線 新八柱駅～南越谷駅 東武スカイツリーライン 新越谷駅～獨協大学前駅

※1 上記公共交通機関等への直接のお問い合わせはくれぐれもお控え願います。

※2 保健所にて疫学調査を実施し、特定された接触者については個別の対応を実施しています。

【患者の概要】

50歳代 男性

発症年月日：令和8年4月4日(土) 発熱、鼻汁、咳嗽

主な症状：発熱、鼻汁、咳嗽、発疹

麻しん予防接種歴：不明

【県民のみなさまへ】

- 麻しんは、感染力が極めて強い感染症で、免疫のない人が感染すると、年齢を問わずほとんどが発病します。
- 感染すると10日から12日の潜伏期間(症状のない期間)を経て、38℃程度の発熱、風邪のような症状(咳や鼻水など)が現れ、2～3日間続きます。
その後、39℃以上の高熱となり、体中に赤い発疹が出現します。
- 麻しん患者と接触した場合は、発病までの期間を考慮し、接触後最大21日間の

健康観察が必要です。

- 症状や経過から「麻しん」が疑われる場合は、事前に医療機関に「麻しんかもしれない」ことを連絡し、必ずマスクを着用して速やかに受診してください。
- 麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる病気であり、空気感染、飛沫感染、接触感染でヒトからヒトに感染が伝播するため、換気の徹底が重要です。
- また、有効な予防方法はワクチン接種です。2回接種による免疫獲得率は97～99%以上と報告されており、発症リスクを最小限に抑えることが期待できます。麻しんの定期予防接種（第1期：1歳児、第2期：小学校就学前の1年間）をまだ受けていない方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。
- 心配なこと等がありましたら、最寄りの保健所にご連絡ください。

【報道機関の皆様へ】

- 本情報提供は、感染症の拡大防止のために行うものですので、報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

<参考>

1 麻しんの発生状況について

(単位：人)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
埼玉県	0	1	0	0	8	13	17*
全国	10	6	6	28	45	265	197**

* 感染症発生動向調査による。令和8年の値は14週(3月30日～4月5日)の累積速報値です。

** 感染症発生動向調査による。令和8年の値は13週(3月23日～3月29日)の累積速報値です。

2 その他参考情報

- ・ 埼玉県ホームページ「麻しん及び風しん流行情報」
<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/masinn.html>
- ・ 厚生労働省ホームページ「麻しん」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/
- ・ 国立健康危機管理研究機構ホームページ「麻しん」
<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ma/measles/index.html>